Editora chefe
Prof" Dr" Antonella Carvalho de Oliveir
Editora executiva
Natalia Oliveira
Assistente editorial
FlÆvia Roberta Barªc
BibliotecÆria
JanainaRamos
Projeto grÆfico
Camila Alves de Cremc
Daphynny Pamplona
Gabriel Motomu Teshima
Luiza Alves Batista
NatÆlia Sandrini de Azeved
Imagens da capa
iStock
Ediçªo de arte
Luiza Alves Batista

2022 by Atena Editora
Copyright' Atena Editora
Copyright do texto ' 202 2 Os autores
Copyright da ediçªo ' 202 2 Atena Editora
Direitos para esta ediçªo cedidos à Atena Editora pelos autores.
Open access publication by Atena Editora

Todo o conteœdo deste livro estÆ licenciado sob uma Licença de Atribui Creative Commons Atribuiçªo -Nªo-Comercial-NªoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

O conteœdo dos artigos e seus dados em sua forma, correçªo e confiabilidade sªo de responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive nªo representam necessariamente a posiçªo oficial da Atena Editora. Permitido odownloadda obra e o compartilhamento desdequ sejam atribuídos crØditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterÆ de nenhuma forma ou utilizÆ para fins comerciais.

Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliaçªo cega pelos pares, membros do Conselho Editorial desta Edit ra, tendo sido aprovados para a publicaçªo com base em critØrios de neutralidade e imparcialidade acadŒmica.

A Atena Editora Ø comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do processo de publicaçªo, evitando plÆgio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que interesses financeiros comprometam os padrıes Øticos da publicaçªo. Situaœes suspeitas de mÆ conduta científica serªo investigadas sob o mais alto padrªo de rigor acadŒmico e Øtico.

Conselho Editorial
CiŒncias Biológicas e da Saœde
Prof" Dr" Aline Silva da Fonte Santa Rosa de Oliveir Hospital Federal de Bonsucesso
Prof" Dr" Ana Beatriz Duarte Vieir Universidade de Brasília
Prof" Dr" Ana Paula Peron Universidade Tecnológica Federal do ParanÆ
Prof. Dr. AndrØ Ribeiro da Silva Universidade de Brasília
Prof" Dr" Anelise Levay Muran Universidade Federal de Pelotas
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Net Universidade Federal de GoiÆs

Prof. Dr. CirCenio de Almeida Barbosa - Universidade Federal de Ouro Preto
Prof" Dr" Daniela Reis Joaquim de Freitas - Universidade Federal do Piauí
Prof" Dr" DØbora Luana Ribeiro Pessoa - Universidade Federal do Maranhão
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Prof. Dr. Edson da Silva - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Prof" Dr" Elizabeth Cordeiro Fernandes - Faculdade Integrada Medicina
Prof" Dr" Eleuza Rodrigues Machado - Faculdade Anhanguera de Brasília
Prof" Dr" Elane Schwinden Prudêncio - Universidade Federal de Santa Catarina
Prof" Dr" Eysler Gonçalves Maia Brasil - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Prof" Dr" Fernanda Miguel de Andrade - Universidade Federal de Pernambuco
Prof. Dr. Fernando Mendes - Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Saúde de Coimbra
Prof" Dr" Gabriela Vieira do Amaral - Universidade de Vassouras
Prof. Dr. GianfÆbio Pimentel Franco - Universidade Federal de Santa Maria
Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida - Universidade Federal de Rondônia
Prof" Dr" Iara Lúcia Tescarollo - Universidade São Francisco
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos - Universidade Federal de Campina Grande
Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza - Universidade Estadual do CearÆ
Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos - Universidade Federal do Piauí
Prof. Dr. Jônatas de França Barros - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Prof. Dr. JosØ Adervan Aragão - Universidade Federal de Sergipe
Prof. Dr. JosØ Max Barbosa de Oliveira Junior - Universidade Federal do Oeste do ParÆ
Prof" Dr" Juliana Santana de Curcio - Universidade Federal de GoiÆs
Prof" Dr" Lívia do Carmo Silva - Universidade Federal de GoiÆs
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza - Universidade Federal do Amazonas
Prof" Dr" Magnólia de Araújo Campos - Universidade Federal de Campina Grande
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Prof" Dr" Maria Tatiane Gonçalves Sá - Universidade do Estado do ParÆ
Prof. Dr. Maurilio Antonio Varavallo - Universidade Federal do Tocantins
Prof" Dr" Mylena Andréa Oliveira Torres - Universidade Ceuma
Prof" Dr" Natália Piovesan - Instituto Federacl do Rio Grande do Norte
Prof. Dr. Paulo Inada - Universidade Estadual de MaringÆ
Prof. Dr. Rafael Henrique Silva - Hospital UniversitÆrio da Universidade Federal da Grande Dourados
Prof" Dr" Regiane Luz Carvalho - Centro UniversitÆrio das Faculdades Associadas de Ensino
Prof" Dr" Renata Mendes de Freitas - Universidade Federal de Juiz de Fora
Prof" Dr" Sheyla Mara Silva de Oliveira - Universidade do Estado do ParÆ
Prof" Dr" Suely Lopes de Azevedo - Universidade Federal Fluminense
Prof" Dr" Vanessa da Fontoura Custódio Monteiro - Universidade do Vale do Sapucaí
Prof" Dr" Vanessa Lima Gonçalves - Universidade Estadual de Ponta Grossa
Prof" Dr" Vanessa Bordin Viera - Universidade Federal de Campina Grande
Prof" Dr" Welma Emidio da Silva - Universidade Federal Rural de Pernambuco

CiŒncias da saœde: pluralidade dos aspectos que interferem na saœde humana 10

DiagramaçªoÇo: Camila Alves de Cremo
CorreçªoÇo: Yaiddy Paola Martinez
IndexaçªoÇo: Amanda Kelly da Costa Veiga
RevisªoÇo: Os autores
Organizador JosØ Aderval AragªÇo

Dados Internacionais de CatalogaçªoÇo na PublicaçªoÇo (CIP)

C569 CiŒncias da saœde: pluralidade dos aspectos que interfer
na saœde humana 10 / Organizador JosØ Aderval
AragªÇo. †Ponta Grossa - PR: Atena, 2022.

Formato: PDF
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia
ISBN 978-65-5983-942-1
DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed. 421221402

1. Saœde. I. AragªÇo, JosØ Aderval (Organizador). II.
Título.

CDD 613

Elaborado por BibliotecÆria Janaina Ramos – CRB-8/9166

Atena Editora
Ponta Grossa †Paran Æ†Brasil
Telefone: +55 (42) 3323-5493
www.atenaeditora.com.br
contato@atenaeditora.com.br

DECLARA˙ˆO DOS AUTORES

Os autores desta obra: 1. Atestam nª o possuir qualquer interesse comercial que constitua um conflito de interesses em relaçª o ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram ativamente da construçª o dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepçª o do estudo, e/ou aquisiçª o de dados, e/ou anÆlise e interpretaçª o de dados; b) Elaboraçª o do artigo ou revisª o com vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovaçª o final do manuscrito para submissª o.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estª o completamente isentos de dados e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citaçª o e a referŒncia correta de todos os dados e de interpretaçes de dados de outras pesquisas; 5. Reconhecem terem informado todas as fontes de financiamento recebidas para a consecuçª o da pesquisa; 6. Autorizam a ediçª o da obra, que incluem os registros de ficha catalogrÆfica, ISBN, DOI e demais indexadores, projeto visual e criaçª o de capa, diagramaçª o de miolo, assim como lançamento e divulgaçª o da mesma conforme critØrios da Atena Editora.

DECLARA˙ˆO DA EDITORA

A Atena Editora declara, para os devidos fins de direito, que: 1. A presente publicação constitui apenas transferência temporária dos direitos autorais, direito sobre a publicação, inclusive não constitui responsabilidade solidária na criação dos manuscritos publicados, nos termos previstos na Lei sobre direitos autorais (Lei 9610/98), no art. 184 do Código Penal e no art. 927 do Código Civil; 2. Autoriza e incentiva os autores a assinarem contratos com repositórios institucionais, com fins exclusivos de divulgação da obra, desde que com o devido reconhecimento de autoria e edição e sem qualquer finalidade comercial; 3. Todos os e-book são open access, desta forma não os comercializa em seu site, sites parceiros, plataformas de e-commerce, ou qualquer outro meio virtual ou físico, portanto, está isenta de repasses de direitos autorais aos autores; 4. Todos os membros do conselho editorial são doutores e vinculados a instituições de ensino superior públicas, conforme recomendação da CAPES para obtenção do Qualis livro; 5. Não cede, comercializa ou autoriza a utilização dos nomes e e-mails dos autores, bem como nenhum outro dado dos mesmos, para qualquer finalidade que não o escopo da divulgação desta obra.

APRESENTA˙ˆO

$ LQFHVVDQWH EXVFD GH FRQKHFLPHQWRV FLHQWtÀFR necessidade da interligaçªo de diversas Æreas da ciŒncia, especialmente na Ærea mØdica, VHQGR WDO GLOLJrQFLD XP SLODU IXQGDPHQWDO QD IRUP

$ SUiWLFD FOtQLFD EDVHDGD QDV PHOKRUHV HYLGrQ FRP RXWURV SURÀVVLRQDLV GD iUHD GD VD~GH DWUDYpV conhecimentos, pressupıe melhor racionalizaçªo nas tomadas de decisıes e intervençes quando necessÆrio, alØm do entendimento da magnitude do processo saœde-doença, H[WUDSRODQGR DVVLP R FDPSR XQLFDPHQWH ELROyJLFR mostra-se cada vez mais necessÆrio, àmedida que fundamenta e molda o processo de tomada de decisªo, trazendo, por conseguinte, maiores benefícios àsaœde da populaçªo, H FRP PHQRV FXVWRV HFRQ{PLFRV H VRFLDLV

Diante disso, Ø com enorme satisfaçªo que apresentamos esta obra, intitulada CiŒncias da saœde: pluralidade dos aspectos que interferem na saœde humana , volumes 9 e 10, elaborados em sua maioria por pesquisadores brasileiros, com capítulos abrangendo diversas Æreas do conhecimento, tais como: epidemiologia social, gastroenterologia, LQIHFWROJLD JHULDWULD (VSHUDPRV TXH HVWD R DSUHQGL]DJHP GH HVWXGDQWHV SURIHVVRUHV H GHPDLV

A ciŒncia nªo Ø acumulaçªo de fatos, mas resoluçªo de mistØrios (Matt Ridley)

JosØ Aderval Aragªo

SUM`RIO

CAP´TULO 1 1

Luany Lazara Melo de Oliveira
Giovanna Masson Conde Lemos Caramaschi
Rafael da Silva Affonso
Larissa Leite Barbosa
Joselita Brandªo de Sant Anna
Eleuza Rodrigues Machado

CAP´TULO 2 11

Rogerio JosØ Veloso Da Silva Filho
FlÆvia Christiane de Azevedo Machado
Suelen Ferreira de Oliveira

CAP´TULO 3 26

Yasmim Victória Loureiro Alvares de Oliveira Sosa Diaz
Amanda Dayse e Silva
Ana Carolina Paiva Ferreira
Ashley Beatriz de Arroxelas Tenório
Bianca Ulrich de Mello
Cinthia Silveira Lino Cintra
Cintia Araujo de Sousa Souto
- B ÓT - J T C P B # P N m N - F B M
Marcela Oliveira Silva
Milagres Araœjo Nascimento
Naila Barroso Brasileiro Freire
Natalia Luiz da Silva Teixeira Bastos

CAP´TULO 4 37

Renata Ferreira Pereira
Emília Carolle Azevedo de Oliveira
Maria Luiza Ferreira Imburana da Silva
Gabriela da Silveira Gaspar

CAP˝TULO 5 48

Carlos Alberto Ocon
Renata Miniaci
Andressa Viveiros de Castro
Dannielly Gomes Cabral
JosØ Almir Alves da Silva
Letícia Medeiros de Castro (IC)
Amanda Cabral David
Rayssa Rayane Alves de Macedo
Marcelo Marreira

CAP˝TULO 6 66

Afonso Pedro Guimarªes Pinheiro
Emilly Gabriele Prata de Abreu
Naeli Gomes Correa
Tatiana do Socorro dos Santos Calandrini
Camila Rodrigues Barbosa Nemer
Giovanni Paulo Ventura Costa
Vencelau Jackson da Conceicao Pantoja
Rubens Alex de Oliveira Menezes

CAP˝TULO 7 75

Clemilene Maia de Souza
Fabiane Araœjo de Azevedo da Cunha
Jhenniffer Thelka Rodrigues Vilhena
Keila Maria da Silva e Silva
Kesley Aparecida da Silva e Silva
Loren Rebeca Anselmo
Monike Emyline Andrade Rodrigues
Silvana Nunes Figueiredo
Leslie Bezerra Monteiro
Andreia Silvana Silva Costa
Camila Soares Santos

CAP˝TULO 8 88

Adriele do Socorro Santos Brabo

Camila Brito de Almeida
Fernando Conceiçªo de Lima
Vitória Regina Silva Teixeira
Aline Santos Brabo
Rodrigo Silva Gomes
Isabelle Souza Machado
Jessica Priscilla da Silva Anselmo
Domingas Teixeira de Carvalho Neta
Maria de NazarØ da Silva Cruz

CAP´TULO 9 98

Eleuza Rodrigues Machado
GardŒnia Barbosa de Sousa
Stenia Tarte Pereira Canuto
Vania Freitas de Aquino
Raianna Rosa Campos
Breno Piovezana Rinco
Gabriela Cristina Souza Virginio
Joselita Brandªo de Sant Anna
Larissa Leite Barbosa
Giovanna Masson Conde Lemos Caramaschi
Rafael da Silva Affonso

CAP´TULO 10 113

Raianna Rosa Campos
Breno Piovezana Rinco
Gabriela Cristina Souza Virgílio
Joselita Brandªo de Sant Anna
Larissa Leite Barbosa
Rafael da Silva Affonso
Eleuza Rodrigues Machado

CAP´TULO 11 127

Viviane da Conceiçªo Carius Comym
Janaína Mengal Gomes Fabri
Eliane Ramos Pereira

Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva
Adriana Matos Pereira
Regina da Cruz Garofalo
Joice Cesar de Aguiar Barbosa
Daniele de Amorim Pires Moreth
Anna Cristina de Freitas
Paula de Rezende Galino Alves do Amaral

CAP˝TULO 12 138

Jaciara Pinheiro de Souza
Murilo de Jesus Porto
AndrØ Lacerda Braga Teles
Ana FlÆvia Souto Figueiredo Nepomuceno
Liz Oliveira dos Santos
Allan Jhony Almeida dos Santos
Maria de FÆtima Santana de Souza Guerra

CAP˝TULO 13 156

Meriele Soares Chaves
Elizabeth Cristina Arantes
Virginia Vilhena
Giovanna Masson Conde Lemos Caramaschi
Breno Piovezana Rinco
Gabriela Cristina Souza Virgílio
Rafael da Silva Affonso
Larissa Leite Barbosa
Eleuza Rodrigues Machado

CAP˝TULO 14 170

Raquel Dantas Costa
Clara Luísa Bezerra de Rubim Costa
Thaíla Gomes Moreira
Kaline Melo de Souto Viana
Amanda Melissa Damiªo Leite

CAP˝TULO 15 177

Luís Eduardo da Cunha Ferro
Gil Fernandes da Cunha Brito
Marcos Henrique Garamvölgyi e Silva

CAPÍTULO 16 199

Luís Carlos de Paula e Silva
Bruna dos Anjos Azevedo
Eduardo Federighi Baisi Chagas
Patrícia Regina de Souza Sales

CAPÍTULO 17 215

Paulo Feliciano da Silva
Priscila de Souza Rezende
Gislane Borges Pereira
Isabella Alves Milfont Parente
Ana Luiza de Lima Seabra
Lara Fernanda Alves de Souza
Antônio Alexander Leite Simão
Audice Barros Alencar
Danielly Correia de Araújo

CAPÍTULO 18 222

Fabiano Maluf
Rejane Nunes Pereira
Brunna Bernadina Gonçalves
Priscila Araújo Silva
Regina Valéria Figueiredo Matos
Verônica Silva Teixeira
Ingrid Aquino Amorim
Luísa Andrade Valle

CAPÍTULO 19 234

Paulo André da Costa Vinholte
Maria Beatriz Cardoso Magalhães Damasceno

Jœlia Karine Rodrigues Gentil
Daniely Leal da Costa
Rafaela Pereira Cunha
Carlos Eduardo Amaral Paiva
Byanca Soares da Silva
Vivian Luíza de Souza Teodoro
Jennifer Maia Pessoa
Elmmer Santos de Sousa

CAP˝TULO 20 239

Leila Cristina Severiano `gape
Elis Sales Muniz Lima
Adriano Mato Cunha

CAP˝TULO 21 246

Larissa da Silva
Nayra Thaislene Pereira Gomes
Lucas Yure Santos da Silva
Cicera Alane Coelho Gonçalves
Renata Torres Pessoa
Suieny Rodrigues Bezerra
Paulo Ricardo Batista
Maria Naiane Martins de Carvalho
Antonio Henrique Bezerra
Sara Tavares de Sousa Machado
Ana Karoline de Almeida Lima
Nair Silva MacŒdo

SOBRE O ORGANIZADOR 260

˝NDICE REMISSIVO 261

CAP´TULO 1

S´NDROME DE KLINEFELTER: UMA REVIS^O BIBLIOGR`FICA

Luany Lazara Melo de Oliveira
CiŒncias Biológicas da Faculdade Anhanguera de Brasília Unidade de Taguatinga
Taguatinga, Distrito Federal, Brasil

Giovanna Masson Conde Lemos Caramaschi
CiŒncias Biológicas e Farmacia da Faculdade Anhanguera de Brasília Unidade de Taguatinga
Taguatinga, Distrito Federal, Brasil

Rafael da Silva Affonso
Farmacia da Faculdade Anhanguera de Brasília Unidade de Taguatinga
Taguatinga, Distrito Federal, Brasil

Larissa Leite Barbosa
Farmacia da Faculdade Anhanguera de Brasília Unidade de Taguatinga
Taguatinga, Distrito Federal, Brasil

-RVHOLWD %UDQGmR GH 6DQW¶$QD'
Biomedicina da Faculdade Anhanguera de Brasília Unidade de Taguatinga
Taguatinga, Distrito Federal, Brasil

Eleuza Rodrigues Machado
CiŒncias Biológicas, Biomedicina, Enfermagem, Farmacia da Faculdade Anhanguera de Brasília Unidade de Taguatinga
Taguatinga, Distrito Federal, Brasil

RESUMO: Síndrome de Klinefelter Ø uma anomalia genØtica que acomete somente LQGLYtGXRV GR VH[R PDVFXOLQR 7UDWD VH GH uma aneuploidia dos cromossomos sexuais, resultando em diversas complicaçes clínicas como: a infertilidade, pouco desenvolvimento dos órgªos sexuais, comprometimento mental em alguns casos, disfunçªo metabólicas, câncer de PDPD HQWUH RXWUDV $ PDLRU síndrome de Klinefelter apresenta o cariótipo 47, ;;< PDV H[LVWHP RXWUDV YDUL esses pacientes sªo altos, possuem pouca quantidade de massa muscular, aparŒncia com padrıes femininos e produzem elevados níveis GH /+ H) 6tndrome de Klinefelter ocorre devido a um erro na separaçªo de pares de cromossomos na meiose I ou erro na separaçªo GDV FURPiWLGHV LUPmV QD PHL
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Klinefelter; câncer de mama masculino; infertilidade; FDULyWLSR

ABSTRACT: Klinefelter syndrome is a genetic DQRPDO\ WKDW DIIHFWV RQO\ P of the sexual chromosomes, resulting in clinical complications such as: infertility, poor development of sexual organs, mental impairment in some cases, metabolic dysfunction, breast cancer, DPRQJ RWKHUV 0RVW SDWLHQ syndrome have karyotype 47, XXY, but other YDULDQWV *HQHUDOO\ WKHVH ORZ DPRXQWV RI PXVFOH PDVV feminine patterns and produce high levels of LH DQG)6+ .OLQHIHOWHU V\QGURP error in the separation of pairs of chromosomes in meiosis I or error in the separation of the sister
KEYWORDS: Klinefelter Syndrome, Men, Breast FDQFHU ,QIHUWLOLW\ .DU\RW\S

INTRODUÇÃO

Síndrome de Klinefelter (SK) é a síndrome comum, e exclusiva de homens, sendo que a maioria dos indivíduos com esta síndrome apresenta o cariótipo 47, XXY, também as variações 48, XXXY, 48, XXYY e 49, XXXXY esses casos são mais raros, além desses, existem indivíduos mosaicos, sendo mais frequente o cariótipo 46, XY/47, XXY (SILVA; MACHADO-SOUZA, 2004). A síndrome foi descrita pela primeira vez em 1942 por Harry Klinefelter, Fuller Albright e Churchill Bradford, eles perceberam que o paciente liberava grandes quantidades de hormônios femininos, da glândula hipófise anterior (ARAÚJO et al., 2007).

Pessoas com esta síndrome apresentam pouco desenvolvimento dos órgãos sexuais, os testículos são menores, produzem pouca testosterona e possuem altos níveis de hormônios sexuais femininos (estrogênio) e baixos níveis de hormônios sexuais masculinos (testosterona). Também apresentam deficiência mental, sendo que a maioria dos casos são de deficiência mental leve, porém, com o avançar da idade materna as chances de ocorrerem erros na meiose I e II materna aumentam consideravelmente.

O câncer de mama masculino é semelhante ao feminino, porém é uma doença rara, sendo que dos cânceres que acometem homens, o câncer de mama corresponde menos de 1% dos cânceres que acometem o homem (SILVA et al., 2007). Como o paciente descobre a doença em estágio avançado, isso acontece porque a doença é indolor e o paciente pensa que não se trata de câncer (PAULINELLI et al., 2003).

Considerando as diversas áreas que a síndrome pode afetar na vida de um paciente, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologias necessárias que proporcionem ao indivíduo com essa anomalia maior qualidade de vida e possível prevenção para ele não desenvolva o câncer de mama.

O objetivo desse trabalho é descrever, por meio de revisão bibliográfica, as características da síndrome de Klinefelter, bem como suas causas, diagnóstico, tratamento e prevenção.

METODOLOGIA

2 REMHWR GHVVD SHVTXLVD IRL YHULÀFDU VH H[LVWH
da 6tQGURPH GH .OLQHIHOWHU H FkQFHU GH PDPD $V LQ
OLYURV H DUWLJRV FLHQWtÀFRV REWLGRV HP IRQWHV GH
americana e do Caribe em CiŒncias da Saœde (LILACS), Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MEDLINE), Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos
38%0(' %LEOLRWHFD &RFKUDQH 6FL(/2 H *RRJOH DFDGr
1R WRWDO IRUDP HQFRQWUDGRV DUWLJRV GHVVHV
2V DUWLJRV VHOHFLRQDGRV IRUDP DTXHOHV TXH PHOKRU
D UHYLVmR

DISCUSSˆO

6tQGURPH GH .OLQHIHOWHU GH GLVWULEXLomR PXQGL
YH] SHOR 'U +DUU\ 5 .OLQHIHOWHU HP TXDQGR HOH
GHVHQYROYLDP XP SURMHWR VREUH R FRQVXPR GH R[LJr
UHFHEHUDP XP SDFLHQWH FRP XP LQFRPXP FDVR GH JLQI
ele percebeu que o paciente apresentava outros sintomas alØm da ginecomastia como:
altas quantidades de hormônios femininos, testículos pouco desenvolvidos e infertilidade

9,&(17(%(5*/81' 672&++2/0 *5$9+2/7

1HVVH PHVPR DQR 'U +DUU\ ) .OLQHIHOWHU H VHXV
e Fuller Allbrigth, publicou um estudo com nove pacientes do gŒnero masculino que
apresentavam as mesmas características clinicas que o primeiro paciente e desse período
para frente essa doença foi denominada de Síndrome de Klinefelter (MANNING; HOYME,
$QRV PDLV WDUGH RV FLHQWLVWDV -DFREV H 6WUR
gonadal e perceberam que a presença de cromossomo sexual extra era responsÆvel pelas
características femininas (ginecomastia, cromossomos femininos, corpœsculo de Bar,
HWF QRV KRPHQV FRPR GHVFULWD QD 6. -$&2%6 67521
%$55 26

Síndrome de Klinefelter Ø uma anomalia genØtica que ocorre nos cromossomos
sexuais, acometendo somente indivíduos do gŒnero masculino, essa condiçªo resulta
em diversas complicaçes clínicas comprometendo diversas Æreas como: a fertilidade,
características comportamentais, em alguns casos retardo mental, disfunçªo metabólica,
HQWUH RXWUDV .5*g= HW DO 628=$ HW DO (
SK apresentam o cariótipo 47, XXY, mas existem tambØm os indivíduos com cariótipo: 48,
XXXY, 48, XXYY, 49, XXXXY, indivíduos mosaicos 46, XY/ 47 XXY, sendo esses casos
UDURV 3,(5&(1$866%$80 HW DO 6,48(,5$ HW DO

Geralmente os pacientes com SK sªo altos, se comparado aos outros homens com
cariótipo normal, apresentam baixo índice de massa muscular, produzem baixo nível de

androgŒnio, aparŒncia com padrıes femininos (quadris mais largos que os ombros, pouca GLVWULEXLomR GH SHORV DR ORQJR GR FRUSR JLQHFRPD /+ H)6+ $6=3,6 6É*29É HW DO 2XWUD FDUDFW p D LQHÀFLrQFLD QD SURGXomR GH HVSHUPDWR]RLGHV LV VHPLQtIHUR ID]HQGR FRP TXH JUDQGH SDUWH GRV DFRPH espermatozoides no OtTXLGR VHPLQDO)5$1d$ HW DO

A taxa elevada dos hormônios de ICSH e FSH hiperestimula a produçªo de estradiol QDV J{QDGDV PDVFXOLQDV HVVH IDWR HP FRQMXQWR FRP sanguíneo faz com que o paciente venha a desenvolver a ginecomastia, que basicamente Ø R GHVHQYROYLPHQWR PDPiULR DQRUPDO HP KRPHQV 2 PR taxa de testosterona ainda nªo Ø muito claro, mas sabe-se que estÆ relacionado com uma possível disfunçªo nas cØlulas de Leydig (MAIA; COELHO; ANDRADE; ARAÚJO, 2002; 6É*29É HW DO

SK Ø a anormalidade cromossômica mais comum entre os homens com algum grau de comprometimento na fertilidade, podendo variar de 7 a 13% dos pacientes incapazes de produzir espermatozoides, sendo que o nível de comprometimento na espermatogŒnese GLIHUH GH XP SDFLHQWH SDUD RXWUR &RQVLGHUDQGR principais causas de infertilidade em homens e como muitas vezes o diagnóstico nªo Ø feito durante a infância e adolescŒncia, Ø importante que se faça exames CitogenØticos SDUD FRQÀUPDU VH R SDFLHQWH WHP D VtQGURPH FDVR D outras características que possam levantar suspeitas (LOPES, 2015; PASQUALOTTO, 6É*29É HW DO

AlØm das complicaçes citadas, o paciente com SK pode apresentar doenças PXVFXODUHV H HVVDV GRUHV ID]HP FRP TXH R P~VFXOR SU H HVVH TXDGUR GHVHQFDGHLD D PLRSDWLD LQ`DPDWyUL clínicos que podem se vincular àsíndrome como: tireoidite de Hashimoto, diabetes mellitus, doenças em vasos sanguíneos que irrigam o cØrebro, podendo levar a um AVC, linfoma, FkQFHU GH PDPD HQWUH RXWUDV 3,5(6 HW DO 6$/=$ DO

Idade materna avançada

Considera-se que a idade materna Ø avançada quando a concepçªo ocorre aos 35 DQRV RX PDLV &RP RV PpWRGRV FRQWUDFHSWLYRV DV PX QDVFLPHQWR GR SULPHLUR ÀOKR SDUD VH GHGLFDUHP DRV os 35 anos, as possibilidades de ter complicaçes durante a gestaçªo aumentam, sendo TXH SUREOHPDV FRPR KLSHUWHQomR H GLDEHWHV VmR IUH

Conforme a mulher vai envelhecendo seus ovócitos tambØm envelhecem, pois a ovulogŒnese se inicia na fase embrionÆria, e interrompe antes do nascimento e volta a RFRUUHU QD SXEHUGDGH HP FDGD SHUtRGR RYXODWyULR

dos cromossomos ou o centrômero sªo destruídos, com isso os cromossomos nªo se VHSDUDP GXUDQWH D GLYLVmR FHOXODU JHUDQGR FpOX 62$5(6

Aneuplodia Ø uma alteraçªo no nœmero de cromossomos, podendo ser a ausŒncia RX R DFUpVFLPR GHOH $V DQHXSORGLDV PDLV FRPXQV V FURPRVVRPR RX XPD WULVVRPLD DFUpVFLPR GH XP FUR DV DOWHUDo}HV FURPRVV{PLFDV QXPpULFDV RFRUUHP VmI WUDQVORFDo}HV VHQGR TXH D FDXVD PDLV REVHUYDGD p GLVMXQomR RFRUUH JUDoDV D XP HUUR QD VHSDUDomR GH erro na separaçªo das cromÆtides-irmªs na meiose II ou na mitose, sendo essa œltima à FDXVD GH LQGLYtGXRV PRVDLFRV 0$6&(1$

A SK Ø um tipo de trissomia que ocorre nos cromossomos sexuais, na maioria dos casos os erros sªo de origem materna, no caso de indivíduos mosaicos, os erros acontecem após a fertilizaçªo e acomete cerca de 1 a cada 600 crianças do sexo masculino 526(1%/$77 HW DO 0$11,1* +2<0(/$0Ñ1,&$

Diagnóstico

Por nªo apresentar tantas características marcantes como ocorre nas demais síndromes, a SK Ø pouco diagnosticada e a maioria dos pacientes sªo diagnosticados DSHQDV TXDQGR SURFXUDP DMXGD SURÀVVLRQDO FRP LQW que apenas 10% dos pacientes sªo diagnosticados durante a puberdade, dentro dos 90% TXH VREUDP DSHQDV VmR GLDJQRVWLFDGRV TXDQGR D

Quando a síndrome Ø descoberta após a adolescŒncia, a possibilidade de XVDU WHUDSLDV SDUD WUDWDU R KLSRJRQDGLVPR SURE GLDJQyVWLFR WDUGLR SURSRUFLRQD D GLPLQXLomR GR VX detectadas inicialmente sªo melhormente tratadas, assim Ø necessÆrio realizar exames que mostrem os níveis hormonais nos pacientes com alguma alteraçªo correspondente j VtQGURPH VH DV WD[DV HVWLYHUHP DQRUPDLV R GLD &LWRJHQpWLFRV TXH SHUPLWHP D FRQWDJHP GRV FURPRV diagnostico quando apresentar um ou mais cromossomos X extras em seu cariótipo, sendo mais comum o FDULyWLSR ;;< 7(,;(,5$ $/0(,'$ 027$ 6É*

Com o avanço da tecnologia na Ærea mØdica, atualmente Ø possível detectar quando XP IHWR SRVVXL ULVFR DXPHQWDGR GH GRHQoDV FDXVDG LGHQWLÀFDomR p IHLWD SRU WHVWHV UHDOL]DGRV GXUDQ GR IHWR H DVVLP JHUD R GLDJQyVWLFR (VWXGRV PRVWUD espontâneos nos trŒs primeiros meses de gestaçªo estªo associadas a anomalias genØticas e que cerca de 45% dessas anomalias sªo mutaçes numØricas do tipo trissomia (JÚNIOR, &5$:)25' '($5081

Tratamento

2 WUDWDPHQWR SDUD RV SDFLHQWHV FRP 6. GHYH VH VD~GH FRPR HQGRFULQRORJLVWDV XURORJLVWDV JHQHW SVLFyORJRV H SURÀVVLRQDLV TXH IRUQHoDP HGXFDomR H HÀFD] p QHFHVViULR TXH R SDFLHQWH FRPHFH R PDLV FHG pacientes começassem o tratamento antes da puberdade, mas muitos pacientes sªo diagnosticados tardiamente, isso diminui as possibilidades de terem um tratamento bem-VXFHGLGR)5$1d$ HW DO /—3(=

O tratamento Ø feito por reposiçªo androgŒnica que Ø ministrada via intramuscular HP IRUPD GH HQDQWDWR RX FLSLRQDWR 2 PpGLFR GHYHU GH DFRUGR FRP DV QHFHVVLGDGHV GR SDFLHQWH 4XDQGR existe uma maior possibilidade do paciente desenvolver suas características sexuais, DXPHQWDU VXD PDVVD PXVFXODU HOHYDQGR VXD DXWRHVW da infertilidade deve ser feito com um especialista, sendo que muitos pacientes com SK conseguiram deixar descentes (MAIA; COELHO; ANDRADE; ARAÚJO, 2002; RADICIONI; %$57,//, &$33$)$%%5,

Câncer de mama masculino

Câncer de mama Ø uma neoplasia maligna que se desenvolve na regiªo peitoral, Ø uma das neoplasias que mais acometem mulheres brasileiras, estima-se que o índice de mortalidade causada por este tipo de patologia aumentou em 69% somente entre os anos de 1979 e 1999, porØm houve uma diminuiçªo na faixa etÆria das mulheres acometidas 6&/2:,7= 0(1(=(6 *,*$17(7(66$52 %8’1< HW DO essa realidade Ø diferente, enquanto em mulheres essa patologia Ø comum, nos homens o câncer de mama Ø raro, representando 1% de todas neoplasias malignas que acometem KRPHQV)5(,7$6 6,/9$ 726&$1, *5$8’(1= 6$17,$*2 HW

Existem poucas informaçes sobre o câncer de mama masculino, esse fato se deve D UDULGDGH GD GRHQoD LVVR FRQWULEXL SDUD TXH R GL p IHLWR D GRHQoD HVWi HP HVWiJLRV DYDQoDGRV $ IDOW que a populaçªo nªo tenha as informaçes necessÆrias sobre essa patologia, com isso RV VLQWRPDV SRGHP VHU SHUFHSWtYHLV HP DOJXQV KRPH SURÀVVLRQDLV TXDOLÀFDGRV SHOD IDOWD GH FRQVFLrQFL doença grave, tambØm podemos considerar que existem muitos mØdicos desinformados sobre o FkQFHU GH PDPD PDVFXOLQR R TXH GLÀFXOWD DLQGD

Após o diagnóstico clínico, onde Ø considerada a sintomatologia do paciente, JHUDOPHQWH R H[DPH ODERUDWRULDO D VHU IHLWR p D PDPiULD SDUD FRPSOHPHQWDU R GLDJQyVWLFR 6H HQFRQ

H HFRJUDÀD R PpGLFR GHYHUi SHGLU D ELRSVLD FRP R LQV
RX PDOLJQR $ GHWHUPLQDomR GR HVWiJLR GD GRHQoD VI
TNM desenvolvido pela American Joint Committee on Cancer, onde Ø analisado o tamanho do tumor, possível ligaçªo com gânglios linfÆticos, se hÆ metÆstases e qual a distância que HOD SHUFRUUHX SHOR FRUSR 027$

O tratamento do FkQFHU GH PDPD PDVFXOLQR p VHPHOKDQWH Ø indicada para os pacientes com tumores de grande porte, nesse caso existem dois procedimentos a serem tomados: mastectomia radical e pesquisa do gânglio sentinela VRPHQWH SDUD WXPRU PHQRU TXH FP $ UDGLRWHUD homens, pois hÆ comprometimento do mamilo e pele, a hormonioterapia eleva a chance GH VREUHYLYrQFLD SRUpP SRGH FDXVDU GLYHUVRV HIHLWV que a quimioterapia pode proporcionar no tratamento dos homens ainda nªo foi totalmente esclarecida, mas sabe-se que frequentemente causa toxicidade devido a elevada idade em grande parte dos pacientes (LIMA; BARBOSA; ROCHA, 2015; MOTA, 2010; DE SANTANA 5Ô2

A etiologia nªo estÆ bem esclarecida, mas sabe-se que alguns fatores podem LQ`XHQFLDU QR DSDUHFLPHQWR GD QHRSODVLD PDPiULD V familiar envolvendo parentes de primeiro grau, fatores ambientais, como a exposiçªo a compostos químicos, fatores hormonais, como o consumo de estrogŒnio, obesidade, síndrome de Klinefelter, sendo que nos pacientes com essa síndrome o risco aumenta cerca de 20 a 50 vezes, provavelmente isso se deve as alteraçes hormonais (baixos QtYHLV GH WHVWRVWHURQD H HOHYDomR GH HVWURJrQLRV fator de risco, mas se o paciente que tem este tipo de alteraçªo perceber que hÆ sintomas p QHFHVViULR EXVFDU DMXGD SURÀVVLRQDO 6$/2021 HW D

CONCLUSÕES

A síndrome de Klinefelter (SK) Ø uma anomalia genØtica que afeta somente indivíduos do gŒnero masculino, e eles apresentam diversas complicaçes clínicas, podendo leva-los DR yELWR

O tratamento minimiza as características da síndrome, proporcionando ao paciente PDLRU TXDOLGDGH GH YLGD

6. p XP IDWRU GH ULVFR SDUD R VXUJLPHQWR GH FkQF FRP 6. WrP FHUFD GH D YH]HV PDLRU SRVVLELOLGDGH

Como acontece na SK, o diagnóstico do câncer de mama Ø feito tardiamente, e tal IDWR GLPLQXL D SRVVLELOLGDGH GH XP WUDWDPHQWR HÀ SK tŒm maiores chances de desenvolver câncer mama ainda nªo foi esclarecido, sendo portanto necessÆrio a realizaçªo de pesquisas no sentido de esclarecer as causas, pois conhecendo a origem do câncer de mama nesses pacientes, serÆ possível estabelecer

REFERÊNCIAS

5Ô2 0 3 0 3DUD DOpP GR ELROyJLFR R VXMHLWR FRP D VtQGURP
GR (VStULWR 6DQWR S

$6=3,6 6 HW DO 6tQGURPH GH .OLQHIHOWHU 9LHMRV \ QXHYRV F
(QGRFULQRORJLD 0HWDEyOLFD Y Q S

%($5(//< 3 2$7(6 5 5HFHQW DGYDQFHV LQ PDQDJLQJ DQG XQGHUV
) 5HV Y))DFXOW\ 5HY

%(5*/81' $ 672&++2/0 . *5$9+2/7 & + 7KH HSLGHPLRORJ\ RI VH[F
DEQRUPDOLWLHV *HQHW & 6HPLQ 0HG *HQHW Y Q S

%2120, 0 HW DO .OLQHIHOWHU V\QGURPH .6 JHQHWLFV FOLQLF
(QGRFULQRO ,QYHVW Y Q S

%8'1< $ HW DO (SLGHPLRORJ\ DQG GLDJQRVLV RI EUHDVW FDQFH
195-204, 2019

&$/'(,5$ - 5) HW DO &DUFLQRPD LQWUDGXFWXDO ELODWHUDO HP
JLQHFRPDVWLD UHODWR GH FDVR 5HYLVWD %UDVLOHLUD GH 0DVW

&$55$648,1+2 - (HW DO 6tQGURPH GH .OLQHIHOWHU &DVR &OtQL
8UROyJLFD Y Q S

&5$:)25' ' '($5081.SLQHIHOWHU V\QGURPH 1XUV &KLOG <RXQJ 3HI

'(6$17$1$, % $ HW DO &kQFHU GH PDPD HP KRPHQV 5HYLVWD GH
S

)5$1d$ $ $ 3 HW DO 'HIHLWRV FRQJrQLWRV SRU IDWRUHV JHQpWLF
S

)5(,7$6 $ 0 6 6,/9$ / / 0 726&$1, 1 9 *5$8'(1= 0 6 3HUÀO LPXQR
FDUFLQRPDV PDPiULRV LQYDVRUHV HP KRPHQV -RUQDO %UDVLOHLU
Q S

*$0(,52 &)257(3 %$5526) 6tQGURPH GH .OLQHIHOWHU QR DGX
$FWD 8UROyJLFD Y S

*5$9+2/ & + Klinefelter Syndrome: Integrating Genetics, Neuropsychology, and Endocrinology. (QGRFU 9HU Y Q S

-$&2%6 3 $ 67521* - $ $ FDVH RI KXPDQ LQWHUVH[XDOLW\ KDYLQ

PHFKDQLVP 1DWXUH 3XEOLVKLQJ *URXS Y S

-Ô1,25 *8, 7 0 $YDOLDomR XOWUDVVRQRJUiÀFD GR RVVR QDVDO IHW
8QLYHUVLGDGH)HGHUDO GH 0LQDV *HUDLV S

.1.,6 * $ 1,(6&+/$ 7LQ IHIOWHU V\QGURPH PRUHWDOLGDG LXS RYRQD

.5*g= $ HW DO 6LQXV QRGH GLVIXQFWLRQ UHTXHULQJ SHUPDQH
DGXOW ZLWK .OLQHIHOWHU 6\QGURPH $PHULFDQ -RXUQDO 2I &DVH

/$0Ñ1,&$ ' $ & HW DO .OLQHIHOWHU V\QGURPH D VSHFFK ODQJXD
DVVHVVPHQW 5HYLVWD &()$& Y Q S

/,0$ $ 3 %$5%26$ / $ 52&+$ $ & &kQFHU GH PDPD HP KRPHP MRV
UHODWR GH FDVR 5HYLVWD %UDVLOHLUD GH 0DVWRORJLD Y Q

/,0$ / & ,GDGH PDWHUQD H PRUWDOLGDGH LQIDQWLO 5HYLVWD EU
S

/23(6 5 ' $VSHFWRV JHQpWLFRV GD LQIHUWLOLGDGH PDVFXOLQD &
S

/—3(= 0 $ 6tQGURPH GH .OLQHIHOWHU $VRFLDFLyQ (VSDxROD GH 3

0$,$)) 5 &2(/+2 $ = $1'5$'(& * 5Ô2 / 5 'LDJQyVWLFR 7DUG
.OLQHIHOWHU † 5HODWR GH FDVR $UTXLYRV %UDVLOHLURV GH (QG

0$11,1* 0 $ +2<0(+ ('LDJQyVWLFR \ PDQHMR GH OD GHO FLQHIHOWHU
$GROHVF 0HG Y Q S

0$6&(1$ - 5 (VWXGRV FLWRJHQpWLFRV UHDOL]DGRV QR KRVSLWDO
D 8QLYHUVLGDGH GH 6DQWD &DWDULQD

027$ 0 & &DQFUR GD PDPD QR KRPHP ,QVWLWXWR GH FLrQFLDV EL
GR 3RUWR S

1$.$'21$5, (. 62$5(6 $ $ 6tQGURPH GH 'RZQ FRQVLGHUDo}HV JHU
LGDGH PDWHUQD DYDQoDGD $UTXLYRV GR 0XVHX GLQkPLFR LQWHU

12*8(,5$ 6 3 0(1'21d$ - 9 3$648$/(77(+ $ 3 &kQFHU GH PDPD HP
%UDVLOHLUD GH 0DVWRORJLD Y Q S

1866%$80 5 / HW DO *HQpWLFD 0pGLFD HG (G *XDQDEDUD .RR

3$648$/2772)) ,QYHVWLJDomR H UHSURGXomR DVVLVWLGD QR WUD
5HYLVWD %UDVLOHLUD GH *LQHFRORJLD H 2EVWHWUtFLD Y Q

3,(5&(% $ *HQpWLFD 8P (QIRTXH &RQFHLWXDO (GLWRUD *XDQDED

3,5(6 5 0 (HW DO 3ROLPLRVLWH H VtQGURPH GH .OLQHIHOWHU X
0pGLFDV Y Q S

5$',&,21, $ %$578/, $ &33 0)$%%5, $ 6tQGURPH GL .OLQHIH
23%* (G 2VSHGDOH ·6 (XJHQLRµ

52'5,*8(6 9) 6 7HQGrQFLD WHPSRUDO GDV LQWHUQDo}HV H yELWRV
%UDVLO HQWUH H 8QLYHUVLGDGH)HGHUDO GH 6DQWD &DW

526(1%/$77 & HW DO ,QIHUWLOLGDGH 0DVFXOLQD † 1RYRV &RQFH

6$/2021 0) % HW DO &kQFHU GH PDPD QR KRPHP 5HYLVWD %UDV

6$/=$12 $ HW DO .OLQHIHOWHU V\QGURPH FDUGLRYDVFXODU V\V
RI OLWHUDWXUH DQG FOLQLFDO SHUVSHFWLYHV (XU - (QGRFULQRO

6$17,$*2 3 5,9(5$ - 7 9 *,/ 9$/'(6 ' $ & &DUFLQRPD GH PDPD PDV
&LXGDG GH OD +DEDQD Y Q S

6&/2:,7= 0 / 0(1(=(6 $ 0 % *,*$17(' 3 7(66$52 6 &RQGXWDV QD
VHFXQGiULD GR FkQFHU GH PDPD H IDWRUHV DVVRFLDGRV 5HYLVWD

6,48(,5$ 7 ' $ *$/9fi2 ' 6 6,/9$ (3 0$548(6 -81,25 1 5 3 & FRPSU
sintomas da 6tQGURPH GH .OLQHIHOWHU 5HYLVWD GH *HURQWRORJLD H

6É*29É , HW DO 7KH FRPELQDWLRQ RI DFURPHJDO\ DQG .OLQHIHO
Q S

6286$ $) 0$57,16 5 3)5(,7$6 5 6 2 FRQKHFLPHQWR GH KRPHQV
prevenção do FkQFHU GH PDPD PDVFXOLQR

628=$ - & 0 HW DO 6tQGURPHV FURPRVV{PLFDV XPD UHYLVmR &D

7(,;(,5$ 3 $/0(,'$) 027$ 9 ,PSOLFDo}HV GD VtQGURPH GH .OLQH
SURSyVLWR GH XP FDVR FOtQLFR 5HSRVLWyULR &LHQWtÀFR GR ,60$

9,&(17(& 0 & (VWUDWpJLDV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GH FRPSH
com VtQGURPH GH .OLQHIHOWHU (VFROD VXSHULRU GD HGXFDomR $O

7,1&$1, % - HW DO .OLQHIHOWHU V\QGURPH DQ XQXVXDO GLDJQ
SHGLDWULD Y Q S

CAP´TULO 2

CAPACIDADE REPRODUTIVA DO L´QUIDO PRÉEJACULATÓRIO HUMANO: UMA REVISˆO INTEGRATIVA

Data de submissªo: 07/12/2021

Rogerio JosØ Veloso Da Silva Filho
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Medicina
Natal - RN
RUFLG RUJ

FlÆvia Christiane de Azevedo Machado
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Saœde Coletiva
Natal - RN
RUFLG RUJ

Suelen Ferreira de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Enfermagem
Natal - RN
RUFLG RUJ

RESUMO: Introduçªo: O conhecimento da existŒncia ou nªo de espermatozoides e as características dos mesmos no líquido prØ-VHPLQDO p YDOLRVR GR SRQWR GH YLVWD UHSURGXWLYR 2EMHWLYR LQYHVWLJDU VH R OtTXLGR SUp HMDFXODWyULR WHP FDSDFLGDGH GH IHUWLOL]DU H SURYRFDU D JUDYLGH] 0HWRGRORJLD 7UDWD VH GH XP HVWXGR GH revisªo integrativa nas bases PUBMED, SCIELO, LILACS, Portal de Periódicos da CAPES/MEC e MEDLINE, utilizando os descritores Fertilidade , ·)OXLGRµ ·3Up VHPLQDOµ H Aplicaram-se os critØrios de inclusªo (publicaçes em portuguŒs, inglŒs e espanhol sem restriçªo de período de tempo; de livre acesso; que mencionassem no resumo sobre quantidade de espermatozoides ou capacidade/possibilidade de fertilizaçªo do OtTXLGR SUp HMDFXOD a presença de HVSHUPDWR]RLGHV QR VHPLQDO RX OtTXLGR SUp HMDF se nove artigos, que após leitura na íntegra, foram LQFOXtGRV QD UHYLVmR $V LQ captados foram comparadas com um parâmetro de nªo haver gravidez com concentraçªo inicial de espermatozoides for < 2 x 10^6 / mL, ou quando a contagem de espermatozoides móveis total SyV SURFHVVDPHQWR IRU 2V DUWLJRV GLYHUJHP HP VXD DUWLJRV DÀUPDP TXH HVSHUPDWR]RLGHV VW HQFRQWUDGRV QR `XLGR SUp VHULD VLJQLÀFDWLYR HP DO FROHWDGDV HQTXDQWR DUW terem as amostras quantia de espermatozoides PyYHLV FDSD]HV GH IHUWLOL]D IRL SRVVtYHO DÀUPDU FRP FO se o OtTXLGR SUp HMDFXODWyULR IHUWLOL]DomR 2V HVWXGRV H PHWRGRORJLDV FRP IUDJLOL pergunta desta pesquisa tem uma resposta, por KRUD LQFRQFOXVLYD

PALAVRAS-CHAVE: 3Up HMDFXODWyU HMDFXODGR (VSHUPDWR]RLGH VHPLQDO *UDYLGH]

REPRODUCTIVE CAPACITY OF HUMAN PRE-EJACULATORY FLUID: A INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT: ,QWURGXFWLRQ 7KH of the existence of spermatozoa and their FKDUDFWHULVWLFV LQ WKH SUH

IURP D UHSURGXFWLYH SRLQW RI YLHZ 2EMHFWLYH ,QYHV
KDV WKH DELOLW\ WR IHUWLOL]H DQG SURYRNH SUHJQDQF\
study based on PUBMED, SCIELO, LILACS, CAPES / MEC and MEDLINE Journal Portal,
XVLQJ WKH GHVFULSWRUV ·)HUWLOLW\µ ·)OXLGµ ·3UH VHPL
ZHUH DSSOLHG SXEOLFDWLRQV LQ 3RUWXJXHVH (QJOLVK D
access; mentioning in the summary about the amount of sperm or the capacity / possibility
RI IHUWLOL]DWLRQ RI WKH SUH HMDFXODWRU\ `XLG RU WKH
SUH HMDFXODWRU\ `XLG OHDGLQJ WR ÀQG QLQH DUWLFOHV
LQ WKH UHYLHZ 7KH LQIRUPDWLRQ IURP WKH FDSWXUHG DU
SUHJQDQF\ ZLWK LQLWLDO VSHUPPFRQFHQWUDWLRQ DWWULEXWHG WR W
PRELOH VSHUP FRXQW LV [5HVXOWV 7KH DUWLFOHV
DUWLFOHV VWDWHG WKDW WKHUH ZHUH VSHUP IRXQG LQ
VLJQLÀFDQW LQ VRPH VDPSOHV FROOHFWHG ZKLOH DUWLF
DPRXQW RI PRELOH VSHUPDWR]RD DEOH WR IHUWLOL]H &RQ
FODULW\ DQG SUHFLVLRQ LI WKH SUH HMDFXODWRU\ `XLG K
SUHVHQW PHWKRGRORJLHV ZLWK ZHDNQHVVHV 7KXV WKH
LQFRQFOXVLYH DQVZHU
KEYWORDS 3UH HMDFXODWRU\ 3UH HMDFXODWH 6SHUP 3UHV

1 | INTRODU˙ˆO

O conhecimento em si da existŒncia ou nªo de espermatozoides e as características
GRV PHVPRV QR OtTXLGR SUp VHPLQDO p YDOLRVR GR SRQV
VmR RV HVWXGRV SXEOLFDGRV DFHUFD GHVVD SUREOHPiV
contraditórios no tocante a quantidade de espermatozoides presentes (V`SQUEZ; et al,

$ UHOHYkQFLD GH GHÀQLU D YLDELOLGDGH UHSURGXV
SUHYHQomR j JHVWDomR SUHFRFH DGROHVFrQFLD LQGH
familiar favorÆvel ao crescimento e desenvolvimento da criança) ou nªo recomendada
(risco àvida da mulher ou do feto); bem como no aumento das taxas de sucesso nos
procedimentos de coleta de material para fertilizaªo assistida (possibilidade de aumentar
D TXDQWLGDGH GH HVSHUPDWR]RLGH YLiYHO SDUD UHSUR
SDUD LVVR %(/2 6,/9$

$ SUHYHQomR j JHVWDomR SUHFRFH RX LQGHVHMDGD H
interrompido e, portanto, do nªo uso de preservativo masculino ou feminino durante a
SUiWLFD VH[XDO VHQGR WDQWR D JHVWDomR SUHFRFH T
pelas maiores chances de desenvolvimento de doenças psiquiÆtricas e genØticas (BALE;
HW DO .+$6+$1 HW DO $OpP GLVWR D IDOWD GH
aumenta o risco de contaminaªo por infecções sexualmente transmissíveis como o HIV
,/$5,$ 38'1(< H VtÀOLV %5$6,/ 0$&(/ HW D
Em relaªo ao HIV/AIDS, entre os anos de 2000 e 2014/15, houve aumento nos

FRHÀFLHQWHV GH PRUWDOLGDGH SDUD D PDLRULD GRV HVW
e no país como um todo no tocante a prevalŒncia de HIV (DARTORA; ´NFLOR; SILVEIRA,
4XDQWR j VtÀOLV RV FDVRV YrP FUHVFHQGR QRV ~O
H %5$6,/ 0$&,(/ HW DO 1mR REVWDQWH
investido esforços em campanhas veiculadas nas mídias sociais para incentivar o uso de
preservativos, divulgando a morbimortalidade relacionada a essas Infecções Sexualmente
7UDQVPLVVtYHLV ,67
5HVVDOWH VH TXH R DXPHQWR QD LQFLGrQFLD WHP R
TXDQWR LGRVD 1R FDVR GD SRSXODomR LGRVD PHGLFDPH
HUHomR WrP DXPHQWDGR R WHPSR GH YLGD VH[XDO DWLYD
$OpP GDV ,67 RXWUD JUDYH SUREOHPiWLFD p D SUiV
OHJDOL]DGR QR %UDVLO VDOYR HP VLWXDo}HV HVSHFtÀF
para a vida da mulher, de acordo com o Código Penal Brasileiro no seu artigo 128, do
'HFUHWR /HL Q GH '(/0$172 'HVWD IRU
em ambientes insalubres e clandestinos mediante uma JUDYLGH] LQGHVHMDGD
nœmeros de tentativas de abortos no Brasil considerÆveis (BRASIL, 2009; MILANEZ; et
DO ([LVWHP UHJLVWURV QDV ~OWLPDV GpFDGDV VRE
entre o uso inadequado de mØtodos anticoncepcionais e a JUDYLGH] LQGHVHMDGD
carŒncia de conhecimentos da população sobre os mØtodos (desconhecimento de detalhes
das tØcnicas, como as do coito interrompido) ou por apresentar resistŒncia ao uso (como Ø
o caso da camisinha), devido a fraca sensibilização da população quanto a relevância da
VXD XWLOL]DomR %5$6,/ 0,/$1(= HW DO

No tocante a carŒncia de conhecimentos, pesquisa indica o não reconhecimento do
WHUPR ·&RLWR ,QWHUURPSLGR µ FRPR PpWRGR FRQWUDFHS
No caso, as adolescentes não associam o termo a prÆtica da retirada do pŒnis previamente
D HMDFXODomR QR DWR VH[XDO ,VWR MXVWLÀFD D GLVFUH
a frequŒncia do uso do coito interrompido, uma vez que ao realizar a pesquisa com a
QRPHQFODWXUD SRSXODU HTXLYDOHQWH RV Q~PHURV GH
O coito interrompido tem seu uso relatado desde os tempos bíblicos e sua efetividade
relaciona-se ao pressuposto da não existŒncia de HVSHUPDWR]RLGHV HP Q~PHU
para provocar uma gravidez no OtTXLGR SUp HMDFXODWyULR 2 FRLWR L
um dos mØtodos temporÆrios mais utilizados em todo o mundo (ROGOW; HOROWITZ,

Deste modo, informações vÆlidas acerca da viabilidade reprodutiva do líquido prØ-
HMDFXODWyULR VHULDP LPSDFWDQWHV DRV GLIHUHQWHV F
idoso) no tocante a uma redução de doenças, agravos e situações de vulnerabilidade social
que estão ligadas a doenças psiquiÆtricas fruto de contextos familiares não favorÆveis
UHVXOWDQWHV GD IDOWD GH SODQHMDPHQWR IDPLOLDU
A crença popular acerca da efetividade do coito interrompido pode levar a redução no

uso de preservativo, uma vez que as pessoas, aparentemente, temem mais uma gravidez LQGHVHMDGD HP GHWULPHQWR D FRQWUDLU XPD LQIHFomR

Nªo obstante, este estudo busca, mediante uma revisªo integrativa de literatura, investigar se o OtTXLGR SUp HMDFXODWyULR WHP FDSDFLGDGH GH

2 | METODOLOGIA

A revisªo integrativa Ø um resumo do que hÆ nas bases de dados para compreender uma problemÆtica ou questªo, tema, sintetizando pesquisas anteriores (BOTELHO; &81+$ 0$&('2 $ ·LQWHJUDomRµ GHVWD UHYLVmR FR teorias e sua abordagem possibilita a inclusªo de estudos com diferentes metodologias %27(/+2 &81+$ 0$&('2 $ IRUPD GH DERUGDJHP GD SU LQWHJUDWLYD SHUPLWH WUDoDU XP SDQRUDPD VREUH D SHUFHEHU D HYROXomR GH XP WHPD HVSHFtÀFR QRV DQRV DV SRVVtYHLV LQWHUSUHWDo}HV DFHUFD GD KLSyWHVH GH RUJDQL]DGD %27(/+2 &81+$ 0$&('2

Uma revisªo integrativa completa se constitui de seis etapas para sua realizaçªo, VHQGR HODV LGHQWLÀFDomR GR WHPD H VHOHomR GD TX GRV FULWpULRV GH LQFOXVmR H H[FOXVmR LGHQWLÀFD selecionados; categorizaçªo dos estudos selecionados; anÆlise e interpretaçªo dos resultados; e apresentaçªo da revisªo/síntese do conhecimento adquirido (BOTELHO; &81+$ 0$&('2 YLGH ÀJXUD

,GHQWLÀFDGDV DV FDUDFWHUtVWLFDV GD UHYLVmR L de pesquisa que norteou este estudo: O OtTXLGR SUp HMDFXODWyULR DSU

UHSURGXWLYD" 2 REMHWLYR GDV HVWUDWpJLDV GH EXVFD
quantitativo de espermatozoides, ou pelo menos, a presença ou ausŒncia de espermatozoides dentro do líquido prØ-seminal, para entªo comparar os valores encontrados nos estudos com valores de um artigo parâmetro que apresenta as chances de engravidar a cada ciclo de inseminaçªo para as menores concentraçes de espermatozoides viÆveis utilizados na LQVHPLQDomR DUWLÀFLDO 2 DUWLJR XWLOL]DGR SDUD SU
RI WKH VSHUP TXDOLW\ QHFHVVDU\ IRU VXFFHVVIXO LQWU
2UJDQL]DWLRQ WKUHVKROG YDOXHV IRU QRUPDO VSHUP
chance de gravidez Ø demonstrada por ciclos de acordo com variÆveis de quantidade e TXDOLGDGH HVSHUPiWLFD GHVFULWRV QD WDEHOD

VariÆvel espermÆtica	N" de ciclos	N" de gravidezes	Taxas de gravidez por ciclo (%)	Valor de P*
Concentraçªo de espermatozoides (x10 ^{6}/ml)				
<5	121	3		
5 10	221	19		
10 20	434	38		
20 40	794	83		
>= 40		306		
Contagem total de espermatozoides (x10 ^{6})				
<10	102	1		
10 - 20	183	15		
20 40	352	29		
40 80	647	55		
>=80		349		
Motilidade espermÆtica (%)				
<20	80	1		
20 - 30	194	7		
30 40	555	54		
40 50	955	123		
>=50		264		
Porcentagem de espermatozoides com formas normais				
<5	11	0		
5 - 10	34	3		
10 20	127	16		NS
20 30	248	29		
60		209		
>=60		175		

Contagem total de espermatozoides móveis (x10 ^{6})		
<5	175	4
5 - 10	193	16
10 20	402	33
20 40	658	59
>=40		337

1 R W D 1 6 Q m R V L J Q L À F D Q W H
* Grupo de limite versus menor que o grupo de limite.
Nível limite.

Desta forma, os parâmetros de referŒncia deste artigo Ø que nªo hÆ gravidez quando a concentraçªo inicial de espermatozoides for < 2 x 10 ^{6} / mL, ou quando a contagem de HVSHUPDWR]RLGHV PyYHLV WRWDO Sy^{6}V S,U&R(F<H VHVWD PDHQQWR I Esses parâmetros foram utilizados para analisar a chance de o líquido seminal provocar a gravidez ao contrapor os dados dos artigos selecionados para compor esta revisªo LQWHJUDWLYD FRP RV UHIHULGRV SDUkPHWURV

Para a pesquisa dos artigos existentes acerca da caracterizaçªo fØrtil do líquido prØ VHPLQDO HIHWXDUDP VH EXVFDV QDV VHJXLQWHV EDVHV Online Literatura Latino-Americana (SCIELO) e do Caribe em CiŒncias da Saœde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline) e no Portal de Pesquisa GR 3HUL\GLFR GD &$3(6 0(& H QR 38%0('

As estratØgias adotadas para localizaçªo dos artigos nas bases e plataformas VXSUDFLWDGDV IRUDP IRUPXODGDV GH DFRUGR FRP D DMX &LrQFLDV GD 6D~GH 'H&6 FRP D DSOLFDomR GD SHUJXQ de encontrar os artigos e trechos de periódicos que se enquadrassem nos critØrios HVWDEHOHFLGRV (QWmR IRUDP GHWHUPLQDGRV RV GHVF língua portuguesa quanto na língua inglesa e língua espanhola, em diferentes combinaçes, VHQGR HOHV ·)HUWLOLGDGHµ ·)OXLGRµ ·3Up VHPLQDOµ H HP JUXSR FRP H[FHomR GH ·`XLGRµ H GH ·IHUWLOLGDGHµ T PtQLPR D ·SUp VHPLQDOµ RX H ·SUp HMDFXODWyULRµ

7HQGR HP YLVWD RV REMHWLYRV GH DFRUGR FRP R Carvalho (2010), a presente revisªo integrativa foi realizada buscando explorar da forma mais rigorosa possível os artigos e trechos selecionados mediante os critØrios escolhidos de todos anos de publicaçªo, uma vez constatado haver poucos estudos e revisıes acerca GHVWH HVWXGR)RUDP HVWDEHOHFLGRV FRPR FULWpULRV

1- Artigos publicados em portuguŒs, inglŒs e espanhol;

2 - Artigos e trechos de periódicos publicados e indexados nos referidos bancos de

dados que sªo de livre acesso para acadŒmicos da UFRN;

3 - Possuir alguma menção em seu resumo sobre quantidade de espermatozoides ou capacidade/possibilidade de fertilizaªo do OtTXLGR SUp HMDFXODWyUL presença de HVSHUPDWR]RLGHV QR `XLGR SUp VHPLQDO

4 - Mencionar informaçes de artigos sobre a presença ou nªo de espermatozoides QR OtTXLGR SUp HMDFXODWyULR

$UWLJRV GH WRGRV RV DQRV GH SXEOLFDomR

Os critØrios de exclusªo escolhidos para a revisªo integrativa foram:

1mR JXDUGDU UHODomR FRP R REMHWLYR SULQFLS IHUWLOL]DomR GR OtTXLGR SUp HMDFXODWyULR

2 - Nªo expressar a quantidade, características dos espermatozoides presentes no líquido prØ-seminal e seu volume, ou nªo expressar a presença ou ausŒncia de HVSHUPDWR]RLGHV QR UHIHULGR OtTXLGR

3 - O estudo ser relativo a espermatozoides de qualquer outra espØcie que nªo a KXPDQD

3 | RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir utilizaªo da estratØgia de buscas, foi possível construir a tabela 2 em que sªo evidenciados, atravØs da utilizaªo de termos vinculados à temÆtica, os resultados obtidos nas bases de dados e àqueles que realmente eram compatíveis com os critØrios de LQFOXVmR SUHVHQWHV QHVWH HVWXGR

Base de dados	Termo utilizado	Resultados obtidos	Compatível com os critØrios de inclusªo
SciELo	·IHUWLOLW\ `XLG SUH HMDFXODWRU\µ	0	0
	·)OXLG SUH HMDFXODWRU\µ	1	0
	·SUH HMDFXODWRU\µ	4	0
	pre-seminal	36	0
Lilacs	·SUH HMDFXODWRU\ `XLGµ	1	0
	·SUH HMDFXODWRU\µ	12	0
	Pre-seminal	102	0
PubMed	·SUH HMDFXODWRU\ `XLGµ	32	5
	·IHUWLOLW\ `XLG SUH HMDFXODWRU\µ	5	1
Medline	·`XLG $1' SUH VHPLQDOµ	0	0
	pre-seminal	0	0
	·IHUWLOLW\ $1' `XLG $1' SUH $1' HMDFXODWRU\µ	9	2*
	·`XLG $1' ·SUH HMDFXODWRU\µ	13	5*

Capes/MEC	·IHUWLOLW\ `XLG SUH HM71DFXODWRU\µ		
	Fluid pre-seminal	143	3
	3Up HMDFXODWyULR HV29DQKRO		0
	3Up HMDFXODWyULR SRU4WXJXrV		0
	·IHUWLOLW\ `XLG SUH \56PLQDOµ		0
* JÆ haviam sido localizados anteriormente na base de dados da PubMed			

Todas as demais combinaçes e usos nos diferentes idiomas nestes operadores de EXVFD QmR SURGX]LUDP UHVXOWDGRV FRPSDWtYHLV FRP RV VHOHFLRQDGRV SDUD DQiOLVH IRUDP LQFOXtGRV DSyV VXD OH GH DUWLJRV IRUDP VHOHFLRQDGRV SDUD FRPSRU HVWD UHY

Panorama dos artigos estudados

Organizando as informaçes dos artigos encontrados nas bases pesquisadas, produziu-se a tabela 4 com a sistematizaçªo das informaçes: quantidades de amostras, participantes, metodologias, tempo de estudo, concentraçes de espermatozoides no prØ-HMDFXODGR H RV SRVVtYHLV YLHVHV

As informaçes extraídas foram analisadas e as consideraçes sobre a possibilidade GH HQJUDYLGDU FRP R `XLGR SUp HMDFXODWyULR VmR UHD

$ DQiOLVH JHUDO GRV DUWLJRV QRV OHYD D FUHU TXH
SUp HMDFXODWyULR 1R HQWDQWR DSHQDV D H[LVWrQFLD
pertinente dimensionar a probabilidade de JUDYLGH] 1HVWH VHQWLGR p SU
D SRVVLELOLGDGH GR `XLGR SuprLGHZGDFXODWyULR QR WUDWR UHSURGXWLYR JHUDU X
D WpFQLFD GR PpWRGR FRQWUDFHSWLYR GR FRQGRP tQWH
SUp HMDFXODWyULR QR WUDWR UHSURGXWLYR QR FR
+252:,7= 7HQGR VH HVVD FRPSUHHQVmR p UHOHYDQW
LQWHUURPSLGR 2 PpWRGR GH FRQWUDFHSomR GH UHWLU
de interrupçªo ou coito interrompido, Ø uma forma de controle de natalidade em que um
parceiro remove seu pŒnis da vagina da parceira e se distancia dos órgªos genitais dela
DQWHV GH HMDFXODU $ HMDFXODomR JHUDOPHQWH DFRQ
LQGLYtGXRV VDXGiYHLV R `XLGR HMDFXODWyULR FRQWpP
HQJUDYLGDU DOJXpP 2 HVSHUPD p R `XtGR RUJkQLFR TXH V
ao se retirar o pŒnis, o espermatozoide, veiculado pelo esperma, nªo atingirÆ o óvulo da
parceira, nªo ocorrendo a fertilizaçªo e a gravidez nªo Ø possível (ROGOW; HOROWITZ,

'LDQWH GLVWR p GHYH VH LQIHULU VREUH D HÀFiFLD
anticonceptivo?

2 PpWRGR GH FRLWR LQWHUURPSLGR JHUDOPHQWH Q
GH FRQWUROH GH QDWDOLGDGH 75866(// 'H FDGD
apenas a retirada do pŒnis como controle de natalidade, estima-se que houve gravidez
HP SHVVRDV GHQWUR GH XP DQR 75866(// 'LVFXW
LQWHUURPSLGR HP VL Ki D GLÀFXOGDGH HOHYDGD HP UH
PHLR D VHQVDomR GR JR]R QR DWR VH[XDO 75866(//
Coito Interrompido em tempo oportuno seria, em teoria, uma tØcnica anticoncepti va de
ERD HÀFiFLD ,VWR DR FRQVLGHUDU D SUHPLVVD GD DXVr
FDQDO YDJLQDO HP TXDQWLGDGHV VLJQLÀFDQWHV UHODFL
&RP LVWR SRGH VH LQIHULU TXH VHULD R `XLGR SU
HÀFiFLD UHGX]LGD GR FRLWR LQWHUURPSLGR FRPR PpWRG
retirada do pŒnis antes do gozo? Em outras palavras, o líquido prØ-seminal teria viabilidade
para ocasionar uma gravidez?

2 PpWRGR GH UHWLUDGD p GLItFLO SDUD DOJXQV XVD
UHWLUDU QR PRPHQWR RX DOJXpP SRGH QmR SHUFHEHU T
PXLWR WDUGH 9É648(= HW DO 5HWLUDU VH FRUUHW
D FDGD YH] UHTXHU XP DOWR JUDX GH FRQWUROH H DXWR
GHVWH PpWRGR p PXLWR GHSHQGHQWH GR LQGLYtGXR HP T
6H R `XLGR SUp HMDFXODWyULR HQWUDU QD YDJLQD HVSHUPDWR]RLGH SRGH
UHDOPHQWH HQJUDYLGDU DOJXpP p XP SRQWR DQWHV GH T
Neste ínterim, os resultados entre os estudos sªo divergentes (ILARIA, 1992; KILLICK,

/$03,$2 =8.(50$1 HW DO 7RGDYLD DOJXQV
IRUPD FRQFUHWD TXH R OtTXLGR SUp VHPLQDO SRGH OLE
FRPR XPD TXHVWmR QmR JHQHUDOL]iYHO D WRGRV RV KRPH

Em relaçªo a presença de espermatozoides no líquido prØ-seminal, existem
SRXFRV HVWXGRV DERUGDQGR D TXHVWmR GD IHUWLOL
FRQWH[WR R HVWXGR YLJHQWH LQFOXLX XP WRWDO GH Q
REMHWLYDP DQDOLVDU R FRQWH~GR GH HVSHUPDWR]RLG
cinco, dois estudos indicaram que nenhum participante tinha espermatozoides em seu
SUp HMDFXODWR 3X8'1(6 =8.(50$1 HW DO 1RV RXWURV W
16-41% dos participantes tinham espermatozoides na secreçªo prØ-seminal (KILLICK,
.29$9,6$5$&+ /257+$1$:$1,&+ 08$1*6$05$1 38'1(<
PorØm, nesses estudos, a quantidade de espermatozoides tende a ser baixa demais e
dessa forma os HVSHUPDWR]RLGHV GLÀFLOPHQWH SRGHULDP IH
2010; KOVAVISARACH; LORTHANAWANICH; MUANGSAMRAN, 2016; 38'1(<
Todavia, o risco de JUDYLGH] QmR SRGHU VHU FRPSOHWDPHQWH GH

7RGDYLD D HVWLPDWLYD GD SUREDELOLGDGH QmR p
nem sequer mencionam as concentraçes exatas de espermatozoides encontrados, e
os que referem, por vezes, tŒm concentraçes abaixo de < 2 x 10^6 / mL, ou quantidade
de HVSHUPDWR]RLGHV PyYHLV 'E[EARIA, R19G2, HGUIMARˆES; et al,
2017; KOVAVISARACH; LORTHANAWANICH; MUANGSAMRAN, 2016; PUDNEY, 1992;
=8.(50$1 HW DO 7RGDYLD XP ~QLFR HVWXGR PHQ
HVSHUPDWR]RLGHV H GHPRQVWURX XP `XLGR SUp VHPLQDO
altas de HVSHUPDWR]RLGHV FRP PRWLOLGDGH FRQÀUPDGD .,//

De modo geral, os estudos focar em mensurar a quantidade de espermatozoides
QRV SDUWLFLSDQWHV SDUD FKHFDU VXD IHUWLOLGDGH FR
SURSULDPHQWH GLWR 3RU FRQVHJXLQWH, QmR FRQVLGHUDP
XQLFDPHQWH SHOR `XLGR SUp VHPLQDO GHQWUR GD XW
LQWHUURPSLGR TXH p TXDQGR QmR VH HMDFXOD GHQWUR
Ainda, os estudos tŒm divergŒncias quanto a presença ou nªo de espermatozoides no
`XLGR DV SHVTXLVDV FRP SUHVHQoD GH TXDQWLGDGH SH
TXH WRUQDP LQYLiYHO DÀUPDU FRP SUHFLVmR R TXmR EDL
gravidez, independente da peculiaridade de cada homem em controlar a retirada do
SrQLV D SDUWLU GR `XLGR SUp HMDFXODWyULR ,/$5,$
/257+1:$1,&+ 08$1*6$05$1 38'1(< =8.(50$1 HW

$OpP GLVWR FRP D WHFQRORJLD DWXDO XWLOL]DGD Q
Ki FRPR LGHQWLÀFDU VH D FROHWD IRL DGHTXDGD GLÀFX
OtTXLGR SUp HMDFXODWyULR SRGH SRU IDOWD GH SHUtFLD
VL 9É648(= HW DO 2XWUR SRQWR FRPXPHQWH DSRQ
SUHVHQWH QR `XLGR SUp HMDFXODWyULR HP VXD SURGXom

p OLEHUDGR DQWHV GR VrPHQ FRPR OXEULÀFDomR SDUD R V
na uretra, uma vez que a uretra masculina Ø usada tanto para urinar quanto para transmitir
HVSHUPDWR]RLGHV .,//,&.

$ WDEHOD DR LGHQWLÀFDU RV SRVVtYHLV YLHVHV G
VREUH DV GLVFRUGkQFLDV 3RU H[HPSOR XP HUUR HP PXL
consideram que por acharem espermatozoides em uma œnica amostragem de alguns
participantes (sem repetir esses exames), estes participantes entªo teriam sempre
HVSHUPDWR]RLGHV HP VHXV `XLGRV SUp VHPLQDLV DVVLP
tiveram espermatozoides na primeira amostragem, portanto nunca teriam espermatozoides
HP VXD VHFUHomR SUp VHPLQDO Espermatozoides em uma amostra de um
QmR VLJQLÀFD WHU QHFHVVDULDPHQWH GHSRLV VHQGR
forma, necessita-se de estudo prospectivo de longa duraçªo que analisasse a presença
GH HVSHUPDWR]RLGH HP YiULRV PRPHQWRV H WHPSRV G
razªo refere-se aos pequenos tamanhos de amostra (todos os estudos incluídos na
UHYLVmR WLQKDP PHQRV GH SDUWLFLSDQWHV $OpP G
ferramentas de laboratório usadas pelos estudos diferem, de tal forma que Ø possível que
R HVSHUPDWR]RLGH VHMD GHVWUXtGR HP DOJXQV FDVRV H
VHMD SHOR WHPSR HQWUH D SUp HMDFXODomR H D DQiOLV
9É648(= HW DO

TambØm hÆ uma ideia comumente relatada que espermatozoides em secreções
DQWHULRUHV D HMDFXODomR VHMDP HVSHUPDWR]RLGHV
anteriores e que, se uma pessoa urinar antes do sexo, nªo haverÆ espermatozoides
QHVVDV VHFUHo}HV 1R HQWDQWR LVVR QmR p FRPSURYD
que 41% dos participantes tinham espermatozoides em suas amostras, os pesquisadores
declararam que todos os participantes teriam urinado antes de dar sua amostra de prØ-
HMDFXODGR .,//,&. &RP LVWR R HVSHUPD SUHVHQ
novo , com HVSHUPDWR]RLGHV RULJLQDLV GHVWD VHFUHomR &
D PLFomR QmR IRL FDSD] GH HOLPLQDU WRWDOPHQWH GD
GR SDUWLFLSDQWH GR HVWXGR

3RU ÀP p LPSRUWDQWH GLVFXWLU D TXHVWmR GD YLDE
em ocasionar uma JUDYLGH] VRE D yWLFD GD VD~GH S~EOLFD

Éimportante ressaltar, por razıes de saœde pœblica, que a gravidez nªo Ø o œnico
IDWRU UHOHYDQWH QD GLVFXVVmR GR FRLWR LQWHUURPS
espermatozoides em seu OtTXLGR SUp HMDFXODWyULR HVWH SRGH
GD LPXQRGHÀFLrQFLD KXPDQD +,9 FRPR WDPEpP IRL GH
encontrados ,/$5,$ =8.(50$1 HW DO $OpP GR +,9
VH[XDOPHQWH WUDQVPLVVtYHLV ,67 FRPR D VtÀOLV ID]HP
QmR LQGLFDGD SDUD D VD~GH S~EOLFD 'HVWD IRUPD H
YHULÀFDU D YLDELOLGDGH GR OtTXLGR gravidez também Gista HP S

TXH WDO PpWRGR p PXLWR XWLOL]DGR SHOD SRSXODomR P

Assim, esta prÆtica pode ocasionar diversas problemÆticas como aumento na LQFLGrQFLD GH ,67 WUDQVPLVVmR YHUWLFDO GH +,9 H 6tÀO e composiçªo de nœcleos familiares com vínculos frÆgeis (gestaçes advindas de relaçes VH[XDLV IRUWXLWDV VHP HVWDELOLGDGH DIHWLYD 7DLV mesmo tendo a tØcnica do coito interrompido respaldo teórico como mØtodo anticonceptivo, hÆ variÆveis importantes relacionadas ao indivíduo que contraindicam a tØcnica de forma FRHWLYD 3DUD DOpP GD TXHVWmR GH RFDVLRQDU XPD JU GH ,QIHFomR 6H[XDOPHQWH 7UDQVPLVVtYHO HP VL FRQWUD

O mØtodo indicado para evitar a concepçªo e proteger contra as IST Ø o uso do preservativo (camisinha), sendo a feminina ainda mais importante por proteger toda a UHJLmR GD YXOYD &RQWXGR D XWLOL]DomR GH SUHVHUY Vy QD SRSXODomR MRYHP p LQ`XHQFLDGD SRU TXHVW}HV patriarcal onde o sexo protegido Ø aceitÆvel em relaçes sem vínculos afetivos estÆveis, mas pouco frequente nas relaçes estÆveis[25] $LQGD H[LVWHP DV SUHFRQFH XVR GR SUHVHUYDWLYR UHGX] R SUD]HU QD UHODomR VH[X

AlØm das questıes culturais, infere-se que o acesso ao tratamento de doençcas como D 6tQGURPH GD ,PXQRGHÀFLrQFLD $GTXLULGD $,'6 H SRVV GH YLGD SDUD LQGLYtGXRV FRP +,9 SDUHFH LQ`XHQFLDU nªo adotar o sexo com preservativo no seu cotidiano, levando ao aumento de IST como XP WRGR

Por conseguinte, Ø importante destacar que a escolha de mØtodos anticonceptivos GHYH OHYDU HP FRQVLGHUDomR R FRQWH[WR VRFLRFXOWX das relaçes sexuais praticadas [25] (QWUH SDUFHLURV HVWiYHLV D SHU H[DPHV GH URWLQD SDUD GHWHFomR GH ,67 ID]HU XP SOD IRUPD SDUD R FDVDO GH YLYHQFLDU VXD YLGD VH[XDO 1 parceiros mais esporÆdicos ou sem um vínculo de estabilidade afetiva, Ø igualmente relevante a realizaçªo de exames de rotina para detecçªo das IST, mas essencial o uso de PpWRGR DQWLFRQFHSWLYR TXH SURSLFLH SURWHomR DV ,6

O uso do preservativo Ø estratØgia de primeira linha na prevençªo das IST, no plano LQGLYLGXDO $V LQIHFo}HV VH[XDOPHQWH WUDQVPLVVtYH VH[XDO PHVPR HP LQGLYtGXRV DVVLQWRPiWLFRV RX TX ,QIHFo}HV SRU +,9 VtÀOLV H KHSDWLWHV % H & SRGHP VH

CONCLUSÕES

1mR IRL SRVVtYHO DÀUPDU FRP FODUH]D H SUHFLVmR SRWHQFLDO GH IHUWLOL]DomR 2V HVWXGRV H[LVWHQWHV $VVLP D SHUJXQWD GHVWD SHVTXLVD WHP XPD UHVSRVW

vÆlido ressaltar que a chance deJ U D Y L G H] G R ` X L G R SUp V H P L Q D O Q R F
estar relacionada àinabilidade de autocontrole de cada indivíduo em retirar o pŒnis ao sinal
G H T X H V H X F R U S O H V W i SUy[L P R G D H M D F X O D omR

REFERˆNCIAS

%(/2 0 $ 9 6,/9$ - / 3 &RQKHFLPHQWR DWLWXGH H SUiWLFD VR
HQWUH DGROHVFHQWHV JHVWDQWHV 5HYLVWD GH 6D~GH3REOLFD
)DS81,)(63 6FL(/2 KWWS G[GRL RUJ V

%$/(7 / HW DO (DUO\ /LIH 3URJUDPPLQJ DQG 1HXURGHYHORSPHQ
>6 / @ Y Q S DJR (OVHYLHU %9 'LVSRQtYHO HP
ELRSV\FK

%5$6,/ $ERUWR H VD~GH S~EOLFD QR %UDVLO DQRV 6HFUHWDUL
(VWUDWpJLFRV 'HSDUWDPHQWR GH &LrQFLD H 7HFQRORJLD %UDVtO

%5$6,/ %ROHWLP (SLGHPLROyJLFR 6HFUHWDULD GH 9LJLOkQFLD HP
%UDVtOLD 0LQLVWpULR GD 6D~GH

%27(/+2 / / 5 &81+$ & & GH $ 0$&('2 0 2 PpWRGR GD UHYLVm
RUJDQL]DFLRQDLV *HVWmR H 6RFLHGDGH >6 O @ Y Q S
Y L 'LVSRQtYHO HP KWWSV ZZZ JHVWDRHVRFLHGDGH RUJ JH
$FHVVR HP QRY

%5,72 1 0 , HW DO (OGHUO\ VH[XDOO\ WUDQVPLWWHG LQIHFWLP
$%&6 +HDOWK 6FLHQFHV Y Q 'HF

'5725 : - ˙1)/25 e 3 6,/9(,5$ / 5 3 3UHYDOrQFLD GR +,9 QR
GR VLVWHPD ~QLFR GH VD~GH 5HYLVWD &XLGDUWH >6 / @ Y Q
6DQWDQGHU 8'(6 KWWS G[GRL RUJ FXLGDUWH Y L

'(/0$172 (' (GLWRUD ,' 'HOPDQWR /$ &yGLJR SHQDO FRPHQWDGR

',&.(< 5 3 HW DO &RPSDULVRQ RI WKH VSHUP TXDOLW\ QHFHVVDU
ZLWK :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ WKUHVKROG YDOXHV IRU QRUP
S DEU (OVHYLHU %9 KWWS G[GRL RUJ V

*8,0$5ƒ(6 0 ' & HW DO 0RUWDOLGDGH SRU +,9 $LDV QR %UDVLO
SUHRFXSDomR" 5HYLVWD %UDVLOHLUD GH (SLGHPLRORJLD >6 / @
)DS81,)(63 6FL(/2 KWWS G[GRL RUJ

,/$5,$ * 'HWHFWLRQ RI +,9 '1$ VHTXHQFHV LQ SUH HMDFXODWRU\
S GH] (OVHYLHU %9 KWWS G[GRL RUJ

.+$6+$1 $ 6 HW DO +LJKHU 5LVN RI 2IIVSULQJ 6FKL]RSKUHQLD)R
WR 6HYHUH $GYHUVH /LIH (YHQWV $UFKLYHV 2I *HQHUDO 3V\FKLDW
$PHULFDQ 0HGLFDO $VVRFLDWLRQ 0 KWWS G[GRL RUJ D

.,//,&. 6 5 HW DO 6SHUP FRQWHQW RI SUH >HMDFXODWRU\ `XLG
GH] ,QIRUPD 8. /LPLWHG KWWS G[GRL RUJ

.29$9,6$5$&+ (/257+$1$:$1,&+ 6 08$1*6$05$1 3 3UHVHQFH RI 6S
(MDFXODWRU\ )OXLG RI +HDOWK\ 0DOHV -RXUQDO RI WKH 0HGLFDO
0DU @ YRO Q S †)HY 'LWWSV[RQYFHLQFH LQWWSMRXZ
-0$7 SGI

/$03,$2) ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI 0HGLFLQH DQG %LRPHGLFD
0HGLFLQH $QG %LRPHGLFDO 5HVHDUFK >6 / @ Y Q S P
KWWS G[GRL RUJ LMPEU

0$&,(/ 5 HW DO 3HUÀO HSLGHPLROyJLFR GH VHURWLSRV GH 6 3 VGÀHLV QD
5HYLVWD GH (SLGHPLRORJLD H &RQWUROH GH ,QIHFomR >6$/3@
$VVRFLDFDR 3UR (QVLQR HP 6DQWD &UX] GR 6XO KWWS G[GRL RU

0,/$1(= 1 HW DO *UDYLGH] ,QGHVHMDGD H 7HQWDWLYD GH $ERUW
\ 6RFLHGDG 5LR GH -DQHLUR >6 / @ Q S DEU)DS
RUJ VHVV D

38'1(< - 3UH HMDFXODWRU\ `XLG DV SRWHQWLDO YHFWRU IRU VH[X
Y Q S GH] (OVHYLHU %9 KWWS G[GRL RUJ

52*2: ' +252:,7= 6 :LWKGUDZDO D UHYLHZ RI WKH OLWHUDWXUH
6WXGLHV ,Q)DPLO\ 3ODQQLQJ >6 / @ Y Q S PDLR
RUJ

628=$ 0 7 6,/9$ 0 ' &59/+2 5 ,QWHJUDWLYH UHYLHZ ZKDW L
3DXOR >6 / @ Y Q S PDU)DS81,)(63 6FL(/2 KW
UZ

75866(// - &RQWUDFHSWLYH IDLOXUH LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV &R
PDLR (OVHYLHU %9 KWWS G[GRL RUJ M FRQWUDFHSWLF

9É648(=) HW DO 3UHVHQFLD R DXVHQFLD GH HVSHUPDWR]RLGHV
5HYLVWD ,QWHUQDFLRQDO GH $QGURORJtD >6 / @ Y Q S
RUJ M DQGURO

=8.(50$1 = HW DO 'RV SUH HMDFXODWRU\ SHQLVHV GH
VSHUPDWR]RD" +XPDQ 5HSURGXFWLRQ >6 / @ Y Q S
283 KWWS G[GRL RUJ KXPUHS VXSSOB D

CAP´TULO 3

A RELA˙ˆO ENTRE HPV E C´NCER DE COLO DE ÚTERO: UM PANORAMA A PARTIR DA REVISˆO INTEGRATIVA

Milagres Araœjo Nascimento
Centro UniversitÆrio de Brasília
Brasília- DF

Yasmim Victória Loureiro Alvares de Oliveira
Sosa Diaz
Universidade Nilton Lins
Manaus- AM

Naila Barroso Brasileiro Freire
Universidade Federal de Roraima
Boa Vista- RR

Amanda Dayse e Silva
Escola Superior de CiŒncia da Saœde
Brasília- DF

Natalia Luiz da Silva Teixeira Bastos
UniFTC
Salvador- BA

Ana Carolina Paiva Ferreira
Centro UniversitÆrio Maurício de Nassau (UNINASSAU)
Recife- PE

Ashley Beatriz de Arroxelas Tenório
Centro UniversitÆrio Cesmac
Maceió- AL

Bianca Ulrich de Mello
Universidade Franciscana (UFN)
Santa Maria - RS

Cinthia Silveira Lino Cintra
Universidade Católica de Brasília
Brasília- DF

Cintia Araujo de Sousa Souto
Universidad TØcnica Privada Cosmos UNITEPC
Bolívia

Laís Lisboa Bomfim Leal
Faculdade Ages de Medicina
Jacobina- BA

Marcela Oliveira Silva
Centro UniversitÆrio UniFG
Guanambi- BA

RESUMO: Revisªo integrativa da literatura FRP R REMHWLYR GHVWH HVWX YHUL ÀFDomR GD FRUUHVSRQGrQ por HPV e o desenvolvimento do câncer de colo GH ~WHUR KDMD YLVWD TXH G podem originar carcinomas e lesıes intraepiteliais HVFDPRVDV 6DEH VH TXH R YtU pelas cØlulas do epitØlio escamoso do trato JHQLWDO H WHQGH D IRUPDU OH Assim, a principal via de diagnóstico Ø a FLWRSDWROJLD DWUDYpV GR F tratamentos das verrugas anogenitais pelo HPV, WHP FRPR ÀQV HOLPLQDU RV FR HOLPLQDQGR DV LQIHFo}HV FD As condutas podem ser clínicas ou cirœrgicas GH DFRUGR FRP DV SHFXOLDU Atualmente existem duas metodologias que REMHWLYDP D UHGXomR GD LQI GR FkQFHU GR FROR GR ~WHUR contra o HPV e a prevençªo secundÆria baseada no rastreio da presença do HPV em amostras cervicais, dessa forma o rastreio das lesıes prØ-cancerígenas no colo do œtero representa uma prevençªo secundÆria a realizaçªo do exame

FLWRSDWROyJLFR 3RU ÀP HVSHUD VH TXH R HVWXGR FRQ
do Vírus do Papiloma Humano e o desenvolvimento do câncer de colo de œtero, alØm de
FRQWULEXLU SDUD D SUiWLFD GHVVD DVVLVWrQFLD
PALAVRAS-CHAVE: Alphapapillomavirus, displasia do colo de œtero, neoplasia intraepitelial
cervical grau III, DSOLFDo}HV GD HSLGHPLROJLD

THE RELATIONSHIP BETWEEN HPV AND CERVICAL CANCER: AN OVERVIEW FROM AN INTEGRATIVE REVIEW

ABSTRACT: ,QWHJUDWLYH OLWHUDWXUH UHYLHZ ZLWK WKH SXU
WKH YHULÀFDWLRQ RI WKH FRUUHVSRQGHQFH EHWZHHQ +3
cervical cancer, considering that several types of HPV can cause carcinomas and squamous
LQWUDHSLWKHOLDO OHVLRQV ,W LV NQRZQ WKDW WKH YLUX
RI WKH JHQLWDO WUDFW DQG WHQGV WR IRUP FXWDQHRPXF
LV F\WRSDWKRORJ\ XVLQJ WKH 3DSDQLFRODX PHWKRG 7KH
DW HOLPLQDWLQJ WKH FRQG\ORPDV EXW QRW HOLPLQDWL
FRQGXFWV FDQ EH FOLQLFDO RU VXUJLFDO DFFRUGLQJ WR
WKHUH DUH WZR PHWKRGRORJLHV WKDW DLP WR UHGXFH WK
the prophylactic vaccines against HPV and secondary prevention based on screening for
HPV presence in cervical samples, so the screening of precancerous lesions in the cervix
UHSUHVHQWV D VHFRQGDU\ SUHYHQWLRQ WR WKH F\WRSDWH
WKDW WKH VWXG\ ZLOO FRQWULEXWH WR VWLPXODWH WKH N
GHYHORSPHQW RI FHUYLFDO FDQFHU DV ZHOO DV FRQWULE
KEYWORDS: Alphapapillomavirus, cervical dysplasia, cervical intraepithelial neoplasia grade
,,, DSSOLFDWLRQV RI HSLGHPLROJ\

INTRODU˙ˆO

As Infecçes sexualmente transmissíveis (IST), como a causada pelo Vírus do
3DSLORPD +XPDQR +39 p GHPDVLDGDPHQWH SUHYDOHQW
VH[XDOPHQWH DWLYRV H HVWi HQWUH DV PDLV FRPXQV H
IST apresentam um imenso impacto social e na saœde pœblica da populaçªo brasileira e
mundial, podendo causar problemas irreversíveis e doenças como: câncer de colo de œtero,
secreçªo vaginal, verrugas nos genitais masculino e feminino e pode levar a esterilidade
IHPLQLQDæ

O HPV Ø caracterizado por ser um vírus de cadeia dupla, nªo encapsulado, membro
da família Papillomaviridae. O HPV acomete o epitØlio escamoso causando lesıes
FXWDQHRPXFRVDV QD UHJLmR DQRJHQLWDO)RUDP LGHQ
os tipos que pertencem ao grupo de baixo risco (6, 11, 40, 42,43, 44, 54, 61, 70, 72 e 81)
ocorrem, frequentemente, em lesıes benignas e lesıes intraepiteliais escamosas de baixo
JUDX 2V WLSRV GH +39 GR JUXSR GH DOWR ULVFR
59, 68, 73 e 82) ou oncogŒnicos estªo frequentemente associados a lesıes intraepiteliais

HVFDPRVDV GH DOWR JUDX H DRV FDUFLQRPDVò

Geralmente, a transmissªo do HPV ocorre durante a atividade sexual de qualquer tipo, podendo ocorrer, inclusive, a deposiçªo do vírus nos dedos por contato genital e a auto inoculaçªo, por contato e pode ocorrer a transmissªo durante a gravidez, intra e periparto, pois pode ocorrer a formaçªo de lesıes cutaneomucosas em recØm-nascidos RX SDSLORPDWRVH UHFRUUHQWH GD ODULQJH 3RUWDQWR ao ter o diagnóstico da infecçªo: (i) fatores como estado imunológico, (ii) tabagismo, (iii) herança genØtica, (iv) hÆbitos sexuais e (v) uso prolongado do contraceptivo oral, visto que FRQWULEXHP SDUD D SHUVLVWrQFLD GD LQIHFomR H D SUR

Nesse contexto, estima-se que entre 75 a 80% da populaçªo serÆ acometida por pelo menos um dos tipos do HPV ao longo da vida, sendo uma mØdia de 9 a 10 milhıes GH LQIHFWDGRV SRU HVVH YtUXV H TXH D FDGD DQR H PDLV GH PLOK}HV GH KRPHQV H PXOKHUHV HVWmR LQIH realidade, o câncer do colo do útero corresponde ao terceiro tipo de câncer feminino mais frequente e com maior mortalidade, excluindo o câncer de pele nªo melanoma, com uma LQFLGrQFLD HVWLPDGD GH FDVRV SRU PXOKHUHV HP

Considerando a complexidade do HPV, destaca-se que algumas pessoas podem RSWDU SRU XP SHUtRGR GH HVSHUD DQWHV GH LQLFLDU a incerteza quanto à frequŒncia da resoluçªo espontânea das lesıes, com relatos de SURSRUo}HV GH GHSXUDomR VHP WUDWDPHQWR HP DWp DXPHQWDU R ULVFR GH WUDQVPLVVmR VXEVHTXHQWH æ ò

2 HVWXGR FRQVWDWRX VH TXH H U H HVH jHP SUHVHQ adenocarcinomas in situ µ H HP QRV LQYDVLYRV (QWUH RV WLSRV observamos que o HPV 18 estÆ intimamente relacionado ao adenocarcinoma, porØm VHPSUH DVVRFLDGR D DOJXP RXWUR WLSR Vacina Brasil, a Vacina GH X HPV quadrivalente foi a primeira a ser aprovada para uso em adolescentes e mulheres MRYHQV GH D DQRV SDUD D SUHYHQomR GR FkQFHU F genitais (HPV 6 e 11), foi incorporada no Programa Nacional de Imunizaçªo (PNI) em 2014 GH IRUPD JUDWXLWD

No tocante a vacinaçªo, a inclusªo das populaçes-alvo no calendÆrio de vacinaçªo RFRUUHX GH IRUPD JUDGXDO 9DOH UHVVDOWDU TXH D YD anos de idade em 2014, foi ampliada para a faixa etÆria de nove a 11 anos em 2015 e foi H[SDQGLGD SDUD PHQLQDV FRP DQRV GH LGDGH HP p DWLQJLU FREHUWXUD YDFLQDO GD SULPHLUD H GD VHJXQ

'LDQWH GR H[SRVWR R REMHWLYR GR SUHVHQWH HV entre o Vírus do Papiloma Humano e o desenvolvimento do câncer de colo de útero, FDUDFWHUL]DQGR VXDV SRVVtYHLV FRQVHTXrQFLDV LGH ÀVLROyJLFRV H HYLGHQFLDU RV DSHFWRV UHODFLRQDGRV

Fisiopatologia

Papilomavírus Humano (HPV) pertencente à família Papillomaviridae, possui '1$ GH ÀWD GXSOD H PDLV GH WLSRV GLIHUHQWHV GH DFXPLQDGR WDPEpP FRQKHFLGR SRSXODUPHQWH FRPR FU
HPV Ø um organismo intracelular obrigatório que afeta as cØlulas mitoticamente para se estabelecer no epitØlio, principalmente o cutâneo e mucoso[4]. Após a exposiçªo ao vírus, FRPHoDP RV HYHQWRV GR FLFOR YLUDO 6HX FLFOR LQLFLD QDV FpOXODV GD FDPDGD SURIXQGD DV TXDLV DLQGD WrP VH DV FpOXODV EDVDLV PLJUDP HP GLUHomR D VXSHUItFL YLUDO p GLVWULEXtGR HQWUH DV GXDV FpOXODV ÀOKDV maturar, enquanto a segunda permanece como um reservatório do DNA viral na camada EDVDO ò

Ao infectar o epitØlio escamoso, o HPV pode induzir a formaçªo de uma grande YDULHGDGH GH OHV}HV FXWDQHRPXFRVDV SULQFLSDOPHQ GRV WLSRV LGHQWLÀFDGRV YmR DFRPHWHU R WUDWR alto risco para malignidade[1,3] 2 FDUFLQRPD GH FpOXODV HVFDPRVDV G MXQomR HVFDPRFROXQDU -(& D SDUWLU GH OHVmR GLVSO p DFRPSDQKDGD GD LQIHFomR SRU +39 $ SURJUHVVmR GH G vÆrios anos, mas nªo Ø algo ambíguo atØ porque as alteraçes moleculares envolvidas na FDUFLQRJrQHVH FHUYLFDO VmR FRPSOH[DV H QmR IRUDP F

Cerca de 80% das pessoas, tanto homens quanto mulheres sexualmente ativos, terªo uma infecçªo por HPV em algum momento de suas vidas [4] $SHVDU GH TXH D P das mulheres infectadas pelo HPV vªo ter resoluçªo espontânea em torno de 24 meses, principalmente em adolescentes, pelo sistema imunológico, mas se caso a infecçªo persista SRGH OHYDU D DOWHUDo}HV FDQFHURVDV $OpP GLVVR H mulheres com menos de 30 anos e que diminui ao decorrer da idade, contudo, nos homens a proporçªo segue a mesma no decorrer da vida [3]

Outrossim, Ø importante ressaltar que o HPV Ø transmitido principalmente pela relaçªo sexual, logo que as pessoas sªo contaminadas por esse vírus após o início da atividade sexual, mas as pessoas podem ser infectadas pelo contato pele a pele tambØm[4]

Epidemiologia e incidŒncia

O HPV Ø a doença sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo, e foi estimado que a maioria das mulheres sexualmente ativas adquire pelo menos um tipo GH +39 GXUDQWH D YLGD (P SDUWLFXODU D LQIHFomR SR FDXVD GH OHV}HV SUp FDQFHURVDV GR FROR XWHULQR H G

O câncer cervical permanece entre os trŒs tipos de câncer mais comuns em

PXOKHUHV HP WRGR R PXQGR H DLQGD p R FkQFHU IHPLQLQ
Na AmØrica Latina, o colo do œtero Ø o câncer mais comum entre as mulheres na Bolívia
e no Peru e o segundo mais frequente no Brasil, Colômbia, Equador, MØxico, Paraguai,
*XLDQDV 6XULQDPH H 9HQH]XHOD 'HYLGR j VXD LGDGH GH
estÆ entre os trŒs tipos de câncer mais frequentes em mulheres com menos de 45 anos em
GH WRGRV RV SDtVHV GR PXQGR LQGHSHQGHQWHPHQWH
A carga anual atual de doenças relacionadas ao papilomavírus humano (HPV) foi
HVWLPDGD HP FDVRV GH FkQFHU H PLOK}HV GH FD
WRGR R PXQGR HP DPERV RV VH[RV 'HVWHV FDVRV G
$PpULFDV &HQWUDO H GR 6XO H RXWURV QD $PpULFD
A chance de contaminação pelos vírus HPV ao longo da vida chega em torno de
D FRQVLGHUDQGR VXD ORFDOL]DomR JHRJUiÀFD VXD
WmR TXDQWR D LGDGH (VWLPD VH TXH D SUHYDOrQFLD QH
entre 21% a 48% independente da citologia, sendo que na `frica e de 22,12%, AmØrica do
Sul 13,2%, AmØrica do Norte 12, 95%, na Europa 8,08%, `sia 7,95% e no Brasil 14,1%,
VHQGR TXH D VmR FRQVLGHUDGRV FDVRV RQFRJrQLF
1R %UDVLO DV WD[DV GH PRUWDOLGDGHV DSUHVHQW
países subdesenvolvidos, o Brasil apresenta valores intermediÆrios em comparação aos
SDtVHV HP GHVHQYROYLPHQWR 3DtVHV VXEGHVHQYROYLGR
SUHFRFH GR FkQFHU FRP PDLRU HVWUXWXUDomR IUHQWH D

Diagnóstico

Classicamente, a infecção pelo HPV pode ser dividida em trŒs formas distintas:
FOtQLFD VXEFOtQLFD H ODWHQWH $ LQIHFomR FOtQLFD p
FRPR XPD YHUUXJD $ IRUPD VXEFOtQLFD p D PDLV IUHTXHQ
a 80% dos casos, Ø diagnosticada com o uso do colposcópio, após o uso de Ácido acØtico
D $ IRUPD ODWHQWH p LGHQWLÀFDGD DSHQDV DWUDYpV
2 GLDJQyVWLFR GDV YHUUXJDV DQRJHQLWDLV p FOtQLFD
deve se realizar quando hÆ dœvida diagnóstica (suspeita de neoplasias ou outras doenças),
na presença de lesıes atípicas ou que nªo respondem adequadamente aos tratamentos, e
HP OHV}HV VXVSHLWDV RX PXLWR YROXPRVDV HP SHVVRDV
mulheres com verrugas anogenitais, Ø necessÆria a realização de um exame ginecológico
que inclua a citologia cervical para rastreamento do câncer de colo uterino e, na presença
GH DOWHUDo}HV FLWROyJLFDV FROSRVFRSLD H ELySVLD V
A Citopatologia Ø a primeira forma de detecção de alteraçes compatíveis com a
infecção pelo HPV foi a coloração feita pelo mØtodo de Papanicolaou, introduzida no ano de
DQWHV PHVPR GD FDXVD GR FkQFHU FHUYLFDO VHU FR
no rastreamento das lesıes provocadas pelo HPV nos programas de triagem, tendo em
YLVWD D VXD JUDQGH DEUDQJrQFLD R EDL[R FXVWR H D ID

HVIUHJDoRV FHOXODUHV TXH VmR À[DGRV HP OkPLQD H SRV
alteraçes celulares típicas como presença de coilócitos, disceratose, anomalias celulares,
HWF FRPSDWtYHLV FRP D LQIHFomR SHOR +39 p GHÀQLGD H
GRV UHVXOWDGRV GR 3DSDQLFRODX VRIUHUDP DOJXPDV
PpWRGR $WXDOPHQWH D FODVVLÀFDomR VHJXLQWH p D GR

O exame de colposcopia consiste na visualizaçªo da vagina e do colo do œtero de 10 a 40 vezes do tamanho normal, sendo necessÆria tambØm a biópsia do local (retirada de um pequeno pedaço de material para anÆlise), ressalta-se que o procedimento nªo Ø realizado na presença de lesıes na vagina ou na vulva, por serem diagnosticados por LQIHFomR YLUDO DVVLP VRPHQWH OHV}HV QR FROR GR ~V teste de hibridizaçªo Ø considerado o mais sensível para detecçªo do HPV, assim, o teste FRQVLVWH QR UHFRQKHFLPHQWR GDV VHTXrQFLDV HVSHFt sequŒncia complementar de Ækidos nuclØicos (sonda) marcada radioativa ou quimicamente, FRQVHTXHQWH R Q~PHUR GH FLWROORJLDV IDOVR QHJDWL

Enquanto, que a tØcnica de Southern Blot consiste na transferŒncia de DNA desnaturado de um gel de agarose para uma membrana (em geral de nylon ou material semelhante), onde ele poderÆ ser analisado com o uso de uma sonda de DNA ou de RNA, considerado como o padrªo ouro na detecçªo do HPV, porØm a sua execuçªo rotineira Ø ODERULRVD

Atualmente, sªo os testes de hibridizaçªo os mØtodos de escolha para detecçªo GR ’1$ GR +39 HP HVIUHJDoRV H DPRVWUDV GH WHFLGR 2 por diferentes tØcnicas de hibridizaçªo incluindo o dot blot, Southern blot e a hibridizaçªo in situ, assim como a reaçªo em cadeia de polimerase (PCR), sendo esta œltima a mais VHQVtYHO

A tØcnica de hibridizaçªo in situ (HIS) passou a estimular o interesse de SHVTXLVDGRUHV VRPHQWH D SDUWLU GD GpFDGD GH GH XP JHQH HVSHFtÀFR RX VHXV WUDQVFULWRV 8WLOL]DQ (sequŒncias de nucleotídeos), desenvolvidas a partir de fragmentos conhecidos do DNA ou 51$ YLUDO TXH VH GHVHMD LGHQWLÀFDU (VVH HPSDUHOKD modo que cada sequŒncia de nucleotídeos complementar (sonda) Ø capaz de hibridizar 7,9 .E GH SDUHV GH EDVHV GH ’1$

Vale ressaltar que a hibridizaçªo reversa com utilizaçªo de primers frequentemente HVWi HP XVR SHOD FRPXQLGDGH FLHQWÀFD QD EXVFD SH HVWD WpFQLFD SHUPLWH LGHQWLÀFDU R JHQyWLSR GH Yi LGHQWLÀFDomR GR WLSR YLUDO H VXD TXDOLÀFDomR TXDQV

Tratamento

2 WUDWDPHQWR GDV YHUUXJDV DQRJHQLWDLV FDXVDG eliminar os condilomas, porØm ele nªo elimina a infecçªo pelo vírus e nªo hÆ evidŒncia

GH TXH TXH HOH DOWHUH D HYROXomR GD LQIHFomR ,VWR SRVVtYHO TXH DV OHV}HV GHVDSDUHoDP QmR VRIUDP QH HP YROXPH H TXDQWLGDGH %5$6,/ 2XWURVVLP p F ocorra a recorrŒncia dos condilomas, onde cerca de metade dos casos desenvolvem novas verrugas em um período de um ano (BRASIL, 2021), por isso fazer o acompanhamento de URWLQD p IXQGDPHQWDO GHYLGR DR ULVFR GH UHFLGLYDV

Nesse sentido, a conduta para esse tipo de lesªo pode ser clínica ou cirœrgica, onde deve-se individualizar cada caso, ponderando as peculiaridades das lesıes, bem FRPR RV UHFXUVRV GLVSRQtYHLV RV HIHLWRV DGYHUVRV que, por estar diante de uma doença autolimitada, tratamentos que propiciem cicatrizes GHVÀJXUDQWHV QmR GHYHP VHU DSOLFDGRVææ

Desse modo, dentre as medicaçes de uso tópico utilizadas no tratamento dos condilomas, podemos destacar o Ækido tricloroacØtico de 60% a 80%, o creme imiquimode D R FUHPH GH SRGRÀORWR[LQD D D VROXomR GH S VROXomR GH SRGRÀORWR[LQD D RQGH RV WUrV SULPHL OHV}HV FRP FDUDFWHUtVWLFDV PDFLDV ~PLGDV H QmR TX ODGR OHV}HV TXHUDWLQL]DGDV UHVSRQGHP PHOKRU DRV de pacientes imunocomprometidos, a terapŒutica permanece a mesma, apenas deve-se atentar para maior chance de recidivas e resposta inadequada ao tratamento, necessitando GH DWHQomR QR TXH GL] UHVSHLWR jV FRPSOLFDo}HVæò

JÆ em relaçªo àabordagem das lesıes intraepiteliais ou neoplasias intraepiteliais FHUYLFDLV 1,& GHYH VHU DMXVWDGD GH DFRUGR FRP uma elevada taxa de regressªo, deve-se adotar um acompanhamento regular no lugar GH WHUDSLD LQYDVLYD Mi HP SDFLHQWHV FRP JUDX ,, H H[FLVmR HOpWURFLU~UJLFD FRP DOoD ODVHU RX FULRWHU que a crioterapia diminui o risco de sangramento leve nas primeiras 24h pós-procedimento, mas apresenta um elevado risco de recidiva da doença e infecçes, alØm de estudos demonstrarem que essa recorrŒncia Ø maior após mØtodos de tratamentos destrutivos em UHODomR D PpWRGRV H[FLVLRQDLVæó

Associado a isso, estudos mostram que em casos de NIC II e III que tenha sido feito tratamento excisional, o acompanhamento rotineiro com o exame pØlvico, citologia e a colposcopia com 3, 6 e 12 meses e após isso retorno anual depois do tratamento inicial demonstram uma taxa muito baixa de recidiva, alØm de quase nenhum risco de evoluçªo SDUD FkQFHU FHUYLFDO 3RU ÀP VHJXQGR /LOL HW DO devem ser seguidos os fundamentos oncológicos, onde o tratamento pode ser cirœrgico, TXLPLRWHUiSLFR UDGLRWHUiSLFR HQWUH RXWUDV WHUDS

Prevençªo:

O Papilomavírus Humano estÆ comprovadamente associado ao surgimento de

lesıes benignas e malignas, incluindo o câncer do colo do œtero[6] $ WXDOPHQWH H[LVW
IHUUDPHQWDV TXH REMHWLYDP D UHGXomR GD LQIHFomR
œtero, a prevençªo primÆria atravØs da imunizaçªo contra um grupo selecionado de tipos de HPV, e a prevençªo secundÆria baseada no rastreio da presença do HPV em amostras cervicais[1 5]

$V YDFLQDV SURÀOiWLFDV FRQWUD R +39 VmR FRPSRV
YtUXV 9/3V GD SURWHtQD / TXH p D SULQFLSDO SURWHtQ
VmR GHVWLWXtGDV GH ’1$ YLUDO H SRUWDQWR VmR LQF
LQMHomR LQWUDPXVFXODU GH YDFLQDV GH +39 EDVHDGDV
HVSHFtÀFRV GR YtUXV QR VRUR TXH H[VXGDP SDUD R HSL
+39 LPSHGHP QRYD LQIHFomRæ

1R PRPHQWR WUrV YDFLQDV SURÀOiWLFDV EDVHDGD
VHPHOKDQWHV D YtUXV 9/3 HVSHFtÀFRV GR WLSR GH +39
UHFRPELQDQWH *DUGDVLO 6LOJDUG 0HUFN &R :KLWH
MSD, LyonFrance), contendo antígenos para HPV 6, 11, 16 e 18; a bivalente (Cervarix - GlaxoSmithKline, LondonUK) contendo antígenos de HPV 16 e 18; e a recentemente
DSURYDGD QRQDYDOHQWH *DUGDVLO 0HUFN &R :KL
antígenos para HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58[5] $ YDFLQD WHP PDLRU H
adolescentes vacinados antes do primeiro contato sexual, com produçªo de anticorpos dez vezes maior que a encontrada na infecçªo naturalmente adquirida no período de dois
DQRVò

No Brasil, o MinistØrio da Saœde utilizando da vacina quadrivalente adotou um esquema vacinal dividido em duas doses com intervalos de tempo de 0-6 meses para meninas de 9 a 13 anos de idade e meninos de 11 a 14 anos de idade, alØm do esquema de trŒs doses com intervalos de tempo 0,2 e 6 meses para populaçªo feminina de 9 a 45
DQRV YLYHQGR FRP +,9 9tUXV GD ,PXQRGHÀFLrQFLD +XPD
de 9 a 26 anos de idade vivendo com HIV; para indivíduos transplantados de órgªos sólidos ou de cØlulas-tronco hematopoØticas, pacientes oncológicos ou em uso de terapia imunossupressora Em 2014, 87% dos municípios brasileiros atingiram a meta prevista na primeira dose, entretanto apenas 32% deles atingiram a meta preconizada na segunda dose[4]

Dessa forma, o rastreio das lesıes prØ-cancerígenas no colo do œtero representa uma estratØgia de prevençªo secundÆria àrealizaçªo do exame citopatológico atravØs do
PpWRGR 3DSDQLFRODX 2 0LQLVWpULR GD 6D~GH GR %UDV
SDUWLU GRV DQRV DWp RV DQRV GH LGDGH SDUD PXO
VH[XDO D FDGD WUrV DQRV DSyV GXDV FLWRORJLDV FRQV

Visto que a infecçªo persistente com tipos de HPV de alto risco Ø uma condiçªo necessÆria para a carcinogŒnese cervical, nos œltimos anos a detecçªo do HPV tornou-se gradativamente o mØtodo de rastreamento primÆrio para o câncer cervical, em substituiçªo

da citologia cervical[6] 1R ÀQDO GD GpFDGD GH SHOD SULPHLUD
DSUHVHQWDGR FRPR XPD WHFQRORJLD GH WULDJHP SULPiU

Os resultados de ensaios clínicos randomizados e estudos de coorte demonstraram consistentemente que, em comparaçªo com a citologia, os testes de HPV podem alcançar XP JDQKR GH D QD VHQVLELOLGDGH D XP FXVWR GH SDUD GHWHFWDU DV OHV}HV SUHFXUVRUDV WDQWR 1,& T benefícios superiores na sensibilidade em desfechos de câncer cervical [5]

Em decorrŒncia dos programas de rastreamento de câncer e programas de vacinaçªo contra o HPV, ocorreu uma reduçªo progressiva nas taxas de incidŒncia de câncer cervical e mortes em países desenvolvidos [6] 3RUWDQWR DV HVWUDWpJL primÆria e secundÆria devem ser prioridade para a saœde pœblica, considerando seus EHQHItFLRV UHODFLRQDGRV j LPXQRJHQLFLGDGH HÀFiFLD

CONSIDERA˙ÕES FINAIS

Como mencionado, o HPV, por se tratar de uma doença sexualmente transmissível JUDYH H SUHYDOHQWH QD SRSXODomR MRYHP VH[XDOPHQ principais causas de morte de mulheres vítimas de câncer de colo de œtero, principalmente as PXOKHUHV GH EDL[R QtYHO VRFLRHFRQ{PLFR H TXH WrP DF

AlØm disso, para o rastreio de câncer cervical, o Brasil adota mØtodos como a citologia, colposcopia e biópsia cervical, que sªo oferecidos no serviço pœblico de saœde às mulheres que possuem vida sexual ativa e nªo ativa, como tambØm mulheres na PHQRSDXVD jTXHODV VXEPHWLGDV j KLVWHUHFWRPLD H J SURÀOiWLFD WDQWR SDUD D SURWHomR LQGLYLGXDO FRP SUHYHQomR GD LQIHFomR SHOR +39

Deste modo, a revisªo integrativa da literatura permitiu inferir a importância da ampliaçªo de medidas educativas que estimulem o rastreamento precoce do câncer de colo GH ~WHUR DOLDGR D XPD FDPSDQKD HÀFD] GH YDFLQDomR como uma prioridade dos programas governamentais de planeamento em saœde, uma vez TXH HVVD DERUGDJHP UHGX] VLJQLÀFDWLYDPHQWH D PRUW que o estudo contribua para estimular o conhecimento do Vírus do Papiloma Humano e o desenvolvimento do câncer de colo de œtero, alØm de contribuir para a prÆtica dessa DVVLVWrQFLD

REFER˚NCIAS

&RVWD /DULVVD $SDUHFLGD H *ROGHQEHUJ 3DXOHWH3DSLORPDY
GH DOHUWD 6D~GH H 6RFLHGDGH >RQOLQH@ Y Q >$FHVV
'LVSRQtYHO HP KWWSV GRL RUJ 6 ! (SXE
KWWSV GRL RUJ 6

&DUYDOKR 1HZWRQ 6HUJLR GH HW DO 3URWRFRORR7UDWDPLHQWR%UDVLOHLUR
LQIHFomR SHOR SDSLORPDYtUXV KXPDQR +39 (SLGHPLRORJLD
Y Q VSH >$FHVVDGR 6HWHPEUR @ H 'LVSRQtYHO H
6 HVS ! (SXE 0DU ,661 KWWSV GRL RU
HVS

0RXUD /tYLD GH /LPD &RGHoR &ODXGLD 7RUUHV H /X] 3DXOD 0H
SDSLORPDYtUXV KXPDQR +39 QR %UDVLO KHWHURJHQHLGDGH HVS
%UDVLOHLUD GH (SLGHPLRORJLD >RQOLQH@ Y >$FHVVDGR
HP KWWSV GRL RUJ ! (SXE 'H] ,661
RUJ

&RVWD 7HOOD 0DULD /XEDPER HW DO +XPDQ SDSLOORPDYLUXV D
DGHQRFDUFLQRPD LQ WKH VWDWH RI 3HUQDPEXFR %UD]LO 5HYLVW
>RQOLQH@ Y Q >$FFHVVHG 6HSWHPEHU @ SS
GRL RUJ ! (SXE 6HSW ,661 KWW
RUJ

&59/+2 1HZWRQ 6HUJLR GH HW DO 3URWRFROR %UDVLOHLUR S
7UDQVPLVVtYHLV LQIHFomR SHOR SDSLORPDYtUXV KXPDQR +39
YRO Q HVS H (SXE)HY ,661 KWWS G[
HVS

/LOL (&KDW]LVWDPDWLRX . .DOSDNWVLGRX 9DNLDQL $ 0R\V
recurrence rate of high-grade cervical intraepithelial neoplasia after successful excision and routine
FROSRVFRS\ GXULQJ IROORZ XS 0HGLFLQH H KWWSV GR

+XUWDGR 5RFD <DPLOpH %HFHUUD &KDXFD 1D\VKD \ 0DOFD 0DJ
cold cone or thermocoagulation compared to LEEP as a therapy for cervical intraepithelial neoplasia:
6\VWHPDWLF UHYLHZ 5HYLVWD GH 6D~GH 3~EOLFD >RQOLQH@
'LVSRQLEOH HQ KWWSV GRL RUJ V ! (SXE
KWWSV GRL RUJ V

1WDQDVLV 6WDWKRSRXORV , .\ULD]RJORX $ /LRQWRV 0 $ 'L
&XUUHQW WUHQGV LQ WKH PDQDJHPHQW DQG SUHYHQWLRQ R
-RXUQDO RI % 8 21 RIÀFLDO MRXUQDO RI WKH %UDONDQ 8QLRQ RI 2

%2*$1, *LRUJLR HW DO 5HWURVSHFWLYH VWXG\ RI WKH LQ`XHQF
ZRPHQ ZLWK KLJKEULVN +39 LQIHFWLRQV DQG QHJDWLYH F\WRORJ\
2EVWHWULFV Y Q S 'LVSRQtYHO HP KWWSV SXE

%26&+) ;DYLHU (UDGLFDWLRQ RI FHUYLFDO FDQFHU LQ /DWLQ

3DSLORPD 9tUXV +XPDQR +39 H VXDV SUHYDOrQFLD HP SDFLHQ
%UDVLO XPD UHYLVmR VLVWrPLFD %HDWUL] &RVWD)UHLWDV >
VV HG

(VWXGR (SLGHPLROyJLFR VREUH D 3UHYDOrQFLD 1DFLRQDO GH ,
$VVRFLDomR +RVSLWDODU 0RQKRV GH 9HQWR https://UWR $OHJU
KRVSLWDLV SURGGL VXV RUJ EU XSORDGV LQGLFDGRUHV (VWXGR 32

$UE\Q 0 ;X / 6LPRHQV & 0DUWLQ +LUVFK 33/ 3URSK\ODFWLF YD
SDSLOORPDYLUXVHV WR SUHYHQW FHUYLFDO FkQFHU DQG LWV SUHI
5HYLHZV ,VVXH $UW 1R &' '2, &' SXE
GH VHWHPEUR @ 'LVSRQtYHO HP KWWSV ZZZ FRFKUDQHOLE
&' SXE IXOO !

&DUYDOKR 1HZWRQ 6HUJLR GH HW DO 3URWRFROR GH %UDVLOLD VREUH
LQIHFomR SHOR SDSLORPDYtUXV KXPDQR +39 (SLGHPLRORJLD
Y Q VSH >$FHVVDGR 6HWHPEUR @ H 'LVSRQtYHO H
6 HVS ! (SXE 0DU ,661 KWWSV GRL RU
HVS

6RXVD 'HLVH 0DULD 'R 1DVFLPHQWR HW DO 'HVHORSPHQW RI D
FDQFHU SUHFXUVRU OHVLRQV 5HYLVWD /DWLQR $PHULFDQD GH (QI
6HWHPEUR @ H 'LVSRQtYHO HP KWWSV GRL RUJ
0DLR ,661 KWWSV GRL RUJ

0RXUD /tYLD GH /LPD &RGHoR &OiXGLD 7RUUHV H /X] 3DXOD 0
SDSLORPDYtUXV KXPDQR +39 QR %UDVLO KHWHURJHQHLGDGH HVS
%UDVLOHLUD GH (SLGHPLRORJLD >RQOLQH@ Y >$FHVVDGR

%26&+) ;DYLHU (UDGLFDWLRQ RI FHUYLFDO FDQFHU LQ /DWLQ $
Y Q S DEU 'LVSRQtYHO HP KWWS ZZZ VFLHOR
DUWWH[W SLG 6 OQJ HV QUP LVR! >$FHVVDGR GH

+X = 0D ' 7KH SUHFLVLRQ SUHYHQWLRQ DQG WKHUDS\ RI +39 UH
DQG FOLQLFDO LPSOLFDWLRQV &DQFHU 0HG 2FW C
6HS 30,' 30&,' 30& >$FHVVDGR 6HWHPEUR @

0LQLVWpULR GD 6D~GH 6HFUHWDULD GH 9LJLOkQFLD HP 6D~GH
7UDQVPLVVtYHLV &RRUGHQDomR JHUDO GR 3URJUDPD 1DFLRQDO GH
ampliação da oferta das vacinas papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) vacina HPV
TXDGULYDOHQWH H PHQLQJRFyFLFD & FRQMXJDGD 0DUoR † %
@

CAPÍTULO 4

RELAÇÃO DAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL E AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS RECÉM-NASCIDOS NO BRASIL NO PERÍODO DE 2013 A 2017

Data de submissão: 15/12/2021

Renata Ferreira Pereira
Universidade Federal de Pernambuco
Centro Acadêmico de Vitória
Vitória de Santo Antão, PE
http://lattes.cnpq.br/

Emília Carolle Azevedo de Oliveira
Instituto Aggeu Magalhães
Cruz
Recife, PE
http://lattes.cnpq.br/

Maria Luiza Ferreira Imburana da Silva
Secretaria de Saúde do Recife
Recife, Pernambuco
http://lattes.cnpq.br/

Gabriela da Silveira Gaspar
Universidade Federal de Pernambuco
Centro Acadêmico de Vitória
Vitória de Santo Antão, PE
http://lattes.cnpq.br/

RESUMO: Introdução: Nos últimos anos, a atenção à saúde da mulher no Brasil tem ampliado as ações e serviços de promoção da saúde e prevenção de agravos, favorecendo essa proposição e redução de indicadores sociais, como a mortalidade materna e mortalidade neonatal. Objetivo: Analisar a relação das consultas de pré-natal e as características do recém-nascido no Brasil, no período de 2013 a 2017. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, transversal de caráter quantitativo realizado com dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, entre 2013 a 2017. Resultados: A maioria das gestações teve duração de 37 a 41 semanas. Notou-se que, nas gestantes que realizaram de 4 a 6 consultas ocorreu a duração da gestação entre 28 a 31 semanas (45,4%); daquelas que só realizaram de 1 a 3 consultas, 32,5% tiveram a duração de 22 a 27 semanas; para as gestantes que não realizaram nenhuma consulta 13,9% tiveram partos entre 22 a 27 semanas. Segundo os dados encontrados, observou-se que as gestantes que frequentaram 7 ou mais consultas de pré-natal obtiveram seus partos no período de 37 a 41 semanas. Conclusão: Neste estudo, observou-se que há uma relação entre as condições de saúde do recém-nascido com a quantidade de consultas de pré-natal, indicando que a relação direta com possíveis problemas de saúde da criança, entretanto, é evidente que além da quantidade do pré-natal deve-se observar a sua qualidade. Desse modo, nota-se que nas realizadas 7 consultas ou mais de pré-natal é possível evitar danos à saúde do recém-nascido, o que torna indispensável o fortalecimento da atenção primária para as buscas ativas das gestantes no território.

PALAVRAS-CHAVE: Recém-Nascido; Cuidado Pré-Natal; Fatores de Risco.

LIST OF PRENATAL CONSULTATIONS AND THE HEALTH CONDITIONS OF NEWBORN IN BRAZIL IN THE PERIOD FROM 2013 TO 2017

ABSTRACT: Introduction , Q U H F H Q W \ H D U V Z R P H Q • V K H D O W K F D U H L S U R P R W L R Q D Q G G L V H D V H S U H Y H Q W L R Q D F W L R Q V D Q G V H U U H G X F L Q J V R F L D O L Q H T X D O L W L H V V X F K D V P D W H U Q D O P R U Objective: 7R D Q D O \ ] H W K H U H O D W L R Q V K L S E H W Z H H Q S U H Q D W D O R I Q H Z E R U Q V L Q % U D] L O Methodology: This is a descriptive, cross-sectional, T X D Q W L W D W L Y H V W X G \ F D U U L H G R X W Z L W K G D W D I U R P W K H W R Results 0 R V W S U H J Q D Q F L H V O D V W H G I U R P W R Z H W K D W L Q S U H J Q D Q W Z R P H Q Z K R K D G W R F R Q V X O W D W L R Q D W Z H H N V R I W K R V H Z K R Q O \ K D G W R F R Q V X Z H H N V I R U S U H J Q D Q W Z R P H Q Z K R G L G Q R W D W W H Q G D Q \ Z H H N V $ F F R U G L Q J W R W K H G D W D I R X Q G L W Z D V R E V H U Y R U P R U H S U H Q D W D O F R Q V X O W D W L R Q V G H O L Y H U L Q J Conclusion: Z L W K L ,Q W K L V V W X G \ L W Z D V R E V H U Y H G W K D W W K H U H L V D U H O W K H Q H Z E R U Q D Q G W K H Q X P E H U R I S U H Q D W D O F R Q V X O W D W D E V H Q F H R I S U H Q D W D O F D U H L V G L U H F W O \ U H O D W H G W R S R L W L V H Y L G H Q W W K D W L Q D G G L W L R Q W R W K H T X D Q W L W \ R I L W Z D V Q R W H G W K D W Z K H Q R U P R U H S U H Q D W D O F R Q V X O W G D P D J H W R W K H K H D O W K R I W K H Q H Z E R U Q Z K L F K P D N H V L W W K H D F W L Y H V H D U F K H V R I S U H J Q D Q W Z R P H Q L Q W K H W H U U L
KEYWORDS: 1 H Z E R U Q 3 U H Q D W D O F D U H + H D O W K S U R P R W L R Q

1 | INTRODU˙ˆO

Nos œltimos anos a atençª o à saœde da mulher no Brasil tem ampliado as aœes e serviœos de promoçª o da saœde e prevençª o de agravos, favorecendo essa populaçª o H V S H F t À F D H U H G X] L Q G R L Q L T X L G D G H V V R F L D L V F R P R D Q H R Q D W D O Q R S D t V & R P H V W U D W p J L D V S U L P i U L D V S D U mulheres no ciclo gravídico-puerperal, por causas preveníeis, foram criados o Programa de Humanizaçª o do PrØ-Natal e Nascimento (PHPN) e mais tarde o Programa Rede Cegonha, T X H G H Q W U H R X W U R V H Q I R T X H V H V W D E H O H F H U D P D T X D O L T X D O L G D G H G D D W H Q o m R D R S U p Q D W D O Q R % U D V L O & 5 8 =

A Rede Cegonha, Ø um programa criado pelo MinistØrio da Saœde que visa reduzir a taxa de morbimortalidade materno-infantil no Brasil e ampliar o acesso das gestantes aos serviœos de saœde, garantindo acolhimento e resolutividade como foco no direito à U H S U R G X o m R H Q D D W H Q o m R L Q W H J U D O T X D O L À F D G D H K X S X H U S p U L R H j F U L D Q o D D À P G H J D U D Q W L U P S D U W R V H P H V H V G H Y L G D % 5 $ 6 , / & 2 5 (1 * 2 3 $ & + (& 2 H W D

No Brasil, embora a mortalidade materna tenha sofrido reduçª o, nas œltimas dØcadas, o nœmero de Øbitos neonatais continua insatisfatório, pois ainda ocorrem por

FDXVDV HYLWiYHLV 0HVPR FRP D DPSOLDomR GD FREHUWX
país, esses agravos podem ser acompanhados e minimizados durante um bom cuidado no
SUp QDWDO %5$6,/ 2/,9(,5$ HW DO

O acompanhamento no prØ-natal, que Ø o período anterior ao nascimento da criança,
p FRQVWLWXtGR SRU XP FRQMXQWR GH SURFHGLPHQWRV P
monitorar a evoluçªo da gravidez, bem como, orientar e esclarecer a mulher e sua família
sobre a gestaçªo, o parto e os cuidados com o UHFpP QDVFLGR %XVFD DLQ
detectar precocemente e tratar as intercorrŒncias mais frequentes nesse período (SANTOS
HW DO

Nas consultas de prØ-natal a gestante Ø examinada e encaminhada para realizaçªo
GH H[DPHV YDFLQDV H HFRJUDÀDV 6mR UHFRPHQGDGDV Q
durante toda a gravidez e o ideal Ø que estas se iniciem nos primeiros trŒs meses de
JHVWDomR %5$6,/

6HJXQGR RV DXWRUHV /X] HW DO HVWXGRV WrP
prØ-natal com a prevençªo de riscos na gestaçªo, reduçªo de complicaçes no parto e
puerpØrio e de complicaçes perinatais; melhores condiçes de saœde do concepto, como
melhor crescimento intrauterino, menor incidŒncia de baixo peso ao nascer, reduçªo da
PRUWDOLGDGH PDWHUQR LQIDQWLO H GD PRUELPRUWDOLG

Éimportante destacar que Ø direito da mulher em seu período gestacional ter a
assistŒncia de qualidade, um direito que toda gestante adquire a partir do momento em que
HQJUDYLGD 3RU LVVR p XP GHYHU GR PXQLFtSLR GLVSRU
a assistŒncia prØ-natal, parto, puerpØrio e neonatal devidamente organizados (BRASIL,
0$5,1+2 HW DO

'HVVD IRUPD HVWH HVWXGR WHP R REMHWLYR GH DQ
prØ-natal e as características dos recØm-nascidos no Brasil no período de 2013 a 2017,
evidenciando a importância das consultas de prØ-natal durante toda a gravidez como
preconizado pelo MinistØrio da Saœde, o monitoramento e o cuidado do prØ-natal para
UHGXomR GD PRUELGDGH H PRUWDOLGDGH PDWHUQR LQ
pergunta: HÆ associaçªo entre consultas de prØ-natal com o Apgar (1” e 5” minuto), baixo
peso do UHFpP QDVFLGR H GXUDomR GD JHVWDomR"µ

2 | MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal, analítico, de carÆter quantitativo nas cinco
UHJL}HV TXH FRPS}HP R %UDVLO &HQWUR 2HVWH 1RUGH
pesquisa foram utilizados dados secundÆrios do Sistema de Informaçes sobre Nascidos
9LYRV 6,1$6& GR 0LQLVWpULR GD 6D~GH QR SHUtRGR GH
foram: nœmero de consultas de prØ-natal, duraçªo da gestaçªo, Apgar 1” minuto, Apgar 5”
PLQXWR SHVR DR QDVFHU DQRPDOLD FRQJrQLWD H UHJLm

7$%:,1 H HVWUXWXUDGRV SRU PHLR GR SURJUDPD 0LFURVR

As limitaçes deste estudo tŒm o uso de dados do sistema de informaçes, que SRGHP DSUHVHQWDU R YLpV GHYLGR jV IUDJLOLGDGHV QDV

Sobre os aspectos Øticos, esta pesquisa utilizou em sua anÆlise dados de origem secundÆria de domínio pœblico provenientes do banco de dados do DATASUS, que possui DFHVVR JUDWXLWR H RQOLQH 2V GDGRV H DV LQIRUPDo}H RV LQGLYtGXRV RX VHMD QmR RIHUHFHP ULVFRV H SRU H submissªo ao ComitŒ de Ética, segundos as Resoluçes 466/12 e 510/16 do Conselho 1DFLRQDO GH 6D~GH GR 0LQLVWpULR GD 6D~GH GR %UDVLO

3 | RESULTADO E DISCUSSˆO

Com relaçªo aos nœmeros de consultas de prØ-natal e duraçªo da gestaçªo, destaca-se as gestaçes que ocorreram no período de 37 a 41 semanas (69,6%), Logo GHSRLV SRGHPRV REVHUYDU TXH HQWUH DV JHVWDQWHV das gestaçes ocorreram no período de 28 a 31 semanas; para as que sórealizaram de 1 a 3 consultas, 32,5% tiveram a duraçªo da gestaçªo de 22 a 27 semanas; entre as gestantes que nªo realizaram nenhuma consulta 13,9% obtiveram seus partos antes das 22 semanas 7DEHOD

Segundo os dados encontrados, nota-se que as gestantes que frequentaram 7 ou PDLV FRQVXOWDV GH SUp QDWDO REWLYHUDP VHXV SDUWR O período gestacional compreende de 37 a 42 semanas de gestaçªo, e preferencialmente, de 39 a 40 semanas e seis dias, segundo a Federaçªo Brasileira das Associaçes de *LQHFRORJLD H 2EVWHWUtFLD)HEUDVJR 'DU j OX] SUHFR GHPDLV SRU XP SDUWR HVSRQWkQHR WDPEpP p SHULJRVR

A relaçªo das consultas de prØ-natal com o Apgar 1” minuto se destaca com Apgar de 8 a 10, 67,6 % dos UHFpP QDVFLGR 51 FXMD PmH IUHTXHQWRX SUp QDWDO -i SDUD JHVWDQWHV TXH IUHTXHQWDUDP GH RN que obtiveram Apgar 0 a 2 que representa 30,1%; para as gestantes que frequentaram de 1 a 3 consultas ou nenhuma o Apgar de 0 a 2 minutos se repete sendo 15,8% e 6,1 %, UHVSHFWLYDPHQWH 7DEHOD

Sobre o Apgar 5” minuto com relaçªo as consultas de prØ-natal observamos que a PDLRULD GRV 51•V TXH QDVFHUDP FRP $SJDU D PDLV GH FRQVXOWDV SDUD DV JHVWDQWHV GH D FRQ Apgar de 3 a 5; para quem teve de 1 a 3 consultas obteve um Apgar de 0 a 2 (21,3%), e SDUD TXHP QmR WHYH QHQKXPD FRQVXOWD GRV 51•V 7DEHOD

A avaliaçªo clínica do recØm-nascido (RN) foi proposta por Virginia Apgar em H WHQGR VLGR PXLWR ~WLO QR MXOJDPHQWR GD

TXDQGR DSOLFDGD QR PLQXWR GH YLGD H QRYDPHQWH de avaliaçªo em países em desenvolvimento, onde os exames laboratoriais podem nªo HVWDU GLVSRQtYHLV R EDL[R YDORU GR HVFRUH GH $SJD necessitam de cuidados adicionais, mesmo na ausŒncia de dados laboratoriais (OLIVEIRA HW DO

A avaliaçªo do estado geral do recØm-nascido (RN) nos primeiros minutos de vida Ø de fundamental, pois orienta a assistŒncia imediata que o RN deverÆ receber, assim como DOHUWD TXDQWR DRV SUREOHPDV TXH SRGHUmR VXUJLU YLWDOLGDGH GR 51 R PDLV DFHLWR H XWLOL]DGR SHORV 51 QR PXQGR RFLGHQWDO p R PpWRGR GH $SJDU 6&+/$77

Sobre a relaçªo das consultas de prØ-natal com peso ao nascer a maioria dos recØm nascidos nasceram com peso 3000 a 3999g sendo 68,9% para gestantes que tiveram 7 consultas ou mais consultas; para as que frequentaram de 4 a 6 consultas 43,6% dos RN nasceram com peso de 1000g a 1499g; as gestantes que apenas frequentaram de 1 a 3 consultas, 28,1% dos RN obtiveram o peso de 500g a 999g e para as que nªo frequentaram QHQKXPD FRQVXOWD RV 51•V WDPEpP QDVFHUDP FRP SHVR

Estudos relatam que o baixo peso ao nascer, consequŒncia de um crescimento intrauterino inadequado, de um menor período gestacional ou da combinaçªo de ambos, FRQVWLWXL R PDLV LPSRUWDQWH GHWHUPLQDQWH GD PR Estudos mostram que o baixo peso ao nascer estÆ inequivocamente associado ao risco GH DGRHFHU H PRUUHU QR SULPHLUR DQR GH YLGD $O retrospectivos evidenciaram, na dØcada passada, associaçªo entre subnutriçªo intrauterina e doenças crônicas na vida adulta, tais como doença cardiovascular, hipertensªo arterial, GLDEHWHV PHOLWXV QmR LQVXOLQRGHSHQGHQWH H FkQFH

Crianças prematuras e com baixo peso ao nascer apresentam risco de mortalidade VLJQLÀFDWLYDPHQWH VXSHULRU j FULDQoDV QDVFLGDV FRP GD JHVWDomR PDLRU RX LJXDO D VHPDQDV 2 EDL[R SH sªo os fatores mais importantes na determinaçªo da mortalidade neonatal, sendo que o baixo peso, particularmente, pode ser derivado tanto da prematuridade como do retardo do FUHVFLPHQWR LQWUDXWHULQR .,/6=7$-1 HW DO *$Ì9

Sobre a relaçªo das consultas de prØ-natal e anomalia congŒnita, as gestantes que obtiveram mais de 7 consultas de prØ-natal (66,3%) dos recØm-nascidos nªo obtiveram nenhuma anomalia congŒnita; para as que frequentaram de 4 a 6 consultas, 25,3% obtiveram alguma anomalia congŒnita; as que frequentaram de 1 a 3 consultas, 7,7% tambØm obtiveram algum tipo de anomalia congŒnita e para as gestantes que nªo realizaram QHQKXPD FRQVXOWD GH SUp QDWDO WLYHUDP DOJXP V Esse caso nos mostra que, gestantes que acabam frequentando poucas consultas de prØ- QDWDO RX QHQKXPD HVWmR PDLV VXVFHWtYHLV SDUD TXH

WLSR GH DQRPDOLD FRQJrQLWD

$V DQRPDOLDV FRQJrQLWDV WrP DSUHVHQWDGR UHOH
PRUWDOLGDGH H PRUELGDGH GD SRSXODomR 'H PRGR JHU
nascidos vivos (NV) apresentam alguma anomalia do desenvolvimento, determinado total
RX SDUFLDOPHQWH SRU IDWRUHV JHQpWLFRV $ PDLRULD GH
durante o primeiro ano de vida, impactando na taxa de mortalidade infantil (MENDES et
DO

Em relaçªo as consultas de prØ-natal com as regiıes do Brasil, destaca-se a regiªo Sul por apresentar gestantes que realizaram de 7 ou mais consultas (76,9%), logo após para as gestantes que realizaram de 4 a 6 consultas se destaca a regiªo Norte com 35,3%; as gestantes que frequentaram de 1 a 3, e nenhuma consulta se destaca tambØm a regiªo 1RUWH FRP H UHVSHFWLYDPHQWH 7DEHOD 7 regiªo Norte se destacou para as gestantes que tiveram menos consultas de prØ-natal, isso se deve ao fato de que essa regiªo possui mais problemas socioeconômicos, o que acaba GLÀFXOWDQGR R DFHVVR D DVVLVWrQFLD j VD~GH

Apesar da cobertura da assistŒncia prØ-natal vir aumentando nas œltimas dØcadas, DV GHVLJXDOGDGHV QR XVR GHVWD DVVLVWrQFLD DLQGD QD FREHUWXUD GH DFRUGR FRP DV UHJL}HV JHRJUiÀFDV F &2,0%5$ HW DO (63267, HW DO

No entanto, cabe ressaltar que a qualidade do acesso, no que diz respeito ao início do prØ-natal, ao nœmero de consultas realizadas e àrealizaçªo de procedimentos EiVLFRV SUHFRQL]DGRV SHOR 0LQLVWpULR GD 6D~GH p LG e, principalmente, em determinados grupos populacionais menos favorecidos econômica e VRFLDOPHQWH 181(6 HW DO

	Nœmero de consultas de prØ-natal												
	Nenhuma		De 1 a 3 consultas		De 4 a 6 consultas		7 ou mais consultas		Ignorado		Total		Valor p
	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	
Duraçªo gestaçªo													
Menos de 22 semanas		13,9		39,4		28,7		14,5	264	3,5		100	
De 22 a 27 semanas		7,7		32,5		43,2		14,4		2,2		100	
De 28 a 31 semanas		4,6		20,8		45,4		27,6		1,5		100	
De 32 a 36 semanas		2,3		10,8		34,9		51,1		0,8		100	0,00*
De 37 a 41 semanas		1,6		5,5		22,8		69,6		0,6		100	
De 42 semanas ou mais		1,5		7,2		25,9		65,1		0,3		100	
Idade ignorada		23,2		10,9		25,1		36,2		4,6		100	
Total		2,3		6,5		24,4		66,1		0,7		100	
Apgar 1” minuto													
0 a 2		6,1		15,8		30,1		45,2		1,9		100	
3 a 5		3,2		9,3		28,4		58,1		1,0		100	
6 a 7		2,3		7,2		26,9		63,0		0,7		100	0,00*
8 a 10		2,0		6,0		23,8		67,6		0,6		100	
Ignorado		10,4		14,2		32,4		40,6		2,4		100	
Total		2,3		6,5		24,4		66,1		0,7		100	
Apgar 5” minuto													
0 a 2		8,6		21,3		31,1		36,7	946	2,4		100	
3 a 5		6,2		15,8		32,3		43,9		1,9		100	
6 a 7		3,8		11,0		30,9		53,1		1,2		100	0,00*
8 a 10		2,0		6,1		24,1		67,2		0,6		100	
Ignorado		10,5		14,2		32,5		40,4		2,4		100	
Total		2,3		6,5		24,4		66,1		0,7		100	

Peso ao nascer									
Menos de 500g	8,1	23,6	31,8		34,3	419	2,2	100	
500 a 999g	9,3	28,1	43,5		16,3		2,8	100	
1000 a 1499 g	6,2	18,7	43,6		29,4		2,0	100	
1500 a 2499 g	3,7	10,4	32,3		52,6		1,2	100	
2500 a 2999	2,4	7,0	25,5		64,3		0,8	100	0,00*
3000 a 3999 g	2,0	5,6	22,9		68,9		0,6	100	
4000 g e mais	1,9	5,4	22,8		69,3		0,6	100	
ignorado	42,4	30,8	17,1	404	5,9	259	3,8	100	
Total	2,3	6,5	24,4		66,1		0,7	100	
Anomalia congŒnita									
sim	2,4	7,7	25,3		63,7		0,9	100	
nªo	2,2	6,4	24,4		66,3		0,7	100	
ignorado	6,1	7,2	26,5		58,7		1,4	100	
total	2,3	6,5	24,4		66,1		0,7	100	
Regiªo									
norte	4,7	13,0	35,3		46,4		0,6	100	0,00*
nordeste	3,1	8,3	31,1		56,7		0,8	100	
sudeste	1,4	4,3	19,2		74,3		0,8	100	
sul	1,2	4,1	17,6		76,9		0,3	100	
centro-oeste	2,7	5,9	24,0		66,9		0,5	100	
Total	2,3	6,5	24,4		66,1		0,7	100	

4 | CONCLUSÕES

Neste estudo, observou-se que hÆ uma relaçªo entre as condiçes de saœde do UHFpP QDVFLGR FRP D TXDQWLGDGH GH SUp QDWDO UHDOL prØ-natal tem associaçªo direta com os problemas de saœde analisados, sendo evidente TXH DOpP GD TXDQWLGDGH GR SUp QDWDO GHYH VH REVHU evitar diversos danos na saœde do recØm-nascido, problemas que poderiam ser evitados se IRVVHP UHDOL]DGDV FRQVXOWDV RX PDLV RX VHMD DV J

ou poucas consultas de prØ-natal, tŒm mais riscos de ter problemas durante ou depois da gestaçªo, podendo vir a ocasionar problemas de saœde ao UHFpP QDVFLGR

$OpP GLVVR p HYLGHQWH TXH DV DVVLVWrQFLDV DR SU

e precÆrias em algumas regiıes do país, precisando de melhorias tornando acessíveis e HÀFLHQWHV QRV ORFDLV RQGH DV FRQGLo}HV VRFLRHFRQ SRSXODomR Mi H[SRVWD &DEH DRV JHVWRUHV UHDOL]DU JUXSRV GH SODQHMDPHQWR IDPLOLDU H JHVWDQWHV DE acesso aos serviços de prevençªo e assistŒncia durante a JUDYLGH] SRGHQGR LG precocemente as condiçes de saœde do UHFpP QDVFLGR

REFERˆNCIAS

%5$6,/ $JrQFLD 1DFLRQDO GH 9LJLOkQFLD 6DQLWiULD %UDVLO 6H VHJXUDQoD H TXDOLGDGH %UDVtOLD $19,6$

%5$6,/ 0LQLVWpULR GD 6D~GH 6HFUHWDULD GH $WHQomR j 6D~GH EstratØgicas. PrØ-natal e SXHUSpULR DWHQomR TXDOLÀFDGD H KXPDQL]DGD

%5$6,/ 0LQLVWpULR GD 6D~GH GH MXQKR GH ,QVWLWXL R +XPDQL]DomR QR 3Up 1DWDO H 1DVFLPHQWR QR kPELWR GR 6LVWHP 'LVSRQtYHOHP KWWS GWU VDXGH JRY EU VDV 32 57$,$6 3257 H HPHUJrQFLDV PDWHUQDV JXLD SDUD GLDJQyVWLFR H FRQGXWD HP %UDVtOLD 0LQLVWpULR GD 6D~GH

&$51,(/ (PLOLD GH)DULD HW DO $ ·'HFODUDomR GH 1DVFLGR 9LYRp HP QtYHO ORFDO 5HFLIH Rev. Bras. Saœde Matern. Infant.,, 2003. 10 p.

&58= *LVVHOOH & MØrcia Dias da Silva. Avaliaçªo da qualidade de assistŒncia ao prØ-natal no Brasil: revisªo integrativa da literatura $YDOLDomR GD TXDOLGDGH GD $WHQomR 3Up de Janeiro, 2019

&2,0%5$ / & 6,/9$ $ 0 0 02&+(/ (*)DWRUHV DVVRFLDGRV j LQDG DVVLVWrQFLD SUp QDWDO GH XPD 5HGH Revista Saúde Pública

'8$57(-XOLDQD A hora certa do bebŒ Nascer. >6 O @ 'LVSRQtYHO HP K JORER FRP QRWLFLD KRUD FHUWD GR EHEH QDVFHU KWPO $F

(63267, &DUROLQD 'XUD 'HJOL HW DO 'HVLJXDOGDGHV VRFLDLV H DVVLVWrQFLD SUp QDWDO GH XPD 5HGH Ciência & Saúde Coletiva

),502 : & $ 3$5('(6 $ 2 HW DO 3HUÀO GRV H[DPHV ODERUDWRULD DWHQGLGDV QR FHQWUR GH VD~GH /DJR 9HUGH Health Care 2003; 4(2):

*$Ì9$ 0DULD $SDUHFLGD 0XQKR] HW DO)DWRUHV DVVRFLDGRV j PR
GH EDL[R SHVR DR QDVFHU Revista Eletrônica Acervo Saœde Y Q S H

+RODQGD &6 $OFKLHUL -& 0RUDLV)55 0DUDQKmR 702 (VWUDWpJ
DFRPSDQKDPHQWR H DYDOLDomR GR DWHQGLPHQWR Rev Panam
Salud Publica. †

.$1729,6&. 0DULQrV 1HYHV *,867,1$ SRQ 3DXOD ASSISTÊNCIA NO
PRÉNATAL $QD 3DXOD 'HOD &XUVR GH 3yV *UDGXDomR HP *HVWmR GH
&XULWLEDQRV >V O @

., /6=7$-1 6DPXHO HW DO AssistŒncia prØ-natal, baixo peso e prematuridade no Estado

/8= /HDQGUR $OYHV HW DO $YDOLDomR GD TXDOLGDGH GD $WHQom
5LR GH -DQHLUR Y

0$/7$ 'HERUDK & HW DO 0RUWHV HYLWiYHLV HP PHQRUHV GH XP D
SDUD D DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR Cadernos de Saœde Pœblica
SiJ 'LVSRQtYHO HP DFHVVDGR DEU

0$5,1+2 $GHLOPD 0LOKRPHP 3HUHLUD HW DO $ 35É7,&$ 'A 9,2/¨1&,$
(1)(50(,52 12 (032'(5$0(172 'A 08/+(5 0XOWLGHEDWHV Y Q S

0$57,16 4XLWpULD 3ULFLOD 0HVTXLWD HW DO &21+(&,0(172 'E *(67
(9,'¨1&,$6 3$5$ 2 &8,'$'2 'E (1)(50(,52 Saœde Revista de Politicas Publicas, Sobral,
Y Q S MXO

0,1$*$:$ ÉXUHD 7DPDPL %DL[R SHVR DR QDVFHU H RHVSRQVLo}HV PDWH
enferm., >V O @ Y

1$*$+0 ((, 6$17,$*2 6 0 $ LQVWLWXFLRQDOL]DomR GD Saœde
Coletiva

1(72 'VRQ 7KHRGRUR GRV 6DQWRV HW DO 3ROtWLFDV GH VD~GH P
LQGLFDGRUHV GH VD~GH Saœde Debate LQVIDQWLO YRO Q

181(6 -XOLDQD 7HL[HLUD HW DO 4XDOLGDGH GD DVVLVWrQFLD SUp
SXEOLFDGRV GH Cad. Saœde Colet 5LR GH -DQHLUR >V

OLIVEIRA , Tatiana et al. Escore de Apgar e mortalidade neonatal em um hospital localizado na
zona sul do município de 6mR 3DXOR (LQVWHLQ 6DR SDXOR S GH]

2/,9(,5$ // *RQoDOYHV $& &RVWD -6' HW DO 0DWHUQDO DQG QHRQ
5HY (VF (QIHUP 863 GRL 6

2/,9(,5$ 0D[0RXUD GH HW DO $YDOLDomR GR 6LVWHPD GH ,QIRUPD
D Epidemiol. Serv. Saœde %UDVtOLD >V O @

2/,9(,5$ (& HW DO $ LPSRUWkQFLD GR DFRPSDQKDPHQWR SUp QDWD &LHQWtÀFD)DF0DLV 9RO 9,, 1~P

3$,9$ 1$7$/,$ 6$17$1$ HW DO Sistema de Informaçes Sobre Nascidos vivos: um estudo de revisªo 5,2 '(-$1(,52)LRFUX] S

3$&+(&2 &HFLOLD Impacto da Atenção Básica sobre a mortalidade materno infantil no estado de Sªo Paulo , PSDFW RI WKH DFWLRQV RI UHGH FHJRQKD SU LQIDQW PRUWDOLW\ LQ WKH VWDWH RI 6mR 3DXOR

3(5(,5$ &ODXGLD DULD CARACTERIZAÇÃO DOS ÓBITOS E NASCIDOS VIVOS DE MÂES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SAIRÉPE, 2008 RECIFE I PRQRJUDÀD (VSHFLDOL]DomR HP *HVWmR GH 6LVWHPDV H 6HUYLoRV GH VD~GH &UX] 5HFLIH

5,%(,52 -) /LUD -$&)RQWLQHOH $9& 6DQWRV 32 /LPD)) *DOYmR 7 YLYRV GH PmHV UHVLGHQWHV H [Revista de Saúde Pública, v. 42, n. 6, p. 1] $YDLODEOHIURP KWWS ZZZ RMV XISL EU LQGH[SKS QXSFLV DUWLF UHSLV Y L

6$1726 /XFLDQD $QJpOLFD 9LHLUD HW DO Métodos de avaliaçªo da qualidade Histó e características da assistŒncia prØ-natal de puØrperas adolescentes e adultas em uma maternidade do interior de Minas Gerais, Brasil de assistŒncia ao prØ-natal no Brasil: revisªo integrativa da literatura. Departamento de Enfermagem, Universidade Federal dos Vales do -HTXLWLQKRQKD H 0XFXUL 8)9-0 >V O @

720$6, (/$1(HW DO 4XDOLGDGH GD DWHQomR SUp QDWDO QD UHGH H GHVLJXDOGDGHV [Caderno de Saúde Pública> 6 O @ S

CAPÍTULO 5

A INCIDÊNCIA DO CONSUMO DO ÁLCOOL EM GESTANTES: E SEUS EFEITOS DELETÉRIOS; REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Carlos Alberto Ocon
Universidade Nove de Julho - Uninove

Renata Miniaci
Universidade Nove de Julho - Uninove

Andressa Viveiros de Castro
Universidade Nove de Julho - Uninove

Dannielly Gomes Cabral
Universidade Nove de Julho - Uninove

José Almir Alves da Silva
Universidade Nove de Julho - Uninove

Letícia Medeiros de Castro (IC)
Universidade Nove de Julho - Uninove

Amanda Cabral David
Universidade Nove de Julho - Uninove

Rayssa Rayane Alves de Macedo
Universidade Nove de Julho - Uninove

Marcelo Marreira
Universidade Nove de Julho - Uninove

RESUMO: A exposição ao álcool durante a gravidez pode afetar o feto em desenvolvimento cerebral e causar déficits intelectuais que se manifestam mais tarde na infância. Consumir bebidas alcoólicas durante a gestação é uma realidade que gineco-obstetras e pediatras já constataram em terríveis consequências em todas as formas, levando a vários efeitos deletérios ao embrião e ao feto e causando abortos espontâneos. Objetivo: Examinar por meio de uma revisão bibliográfica, o efeito deletério do consumo de álcool durante a gestação nos últimos 16 anos, o efeito deletério do consumo de álcool durante a gestação nos últimos 16 anos. Busca em três bases de dados eletrônicos de periódicos: SciELO, PubMed e LILACS que são necessárias ações multidisciplinares com assistência e orientações a essas gestantes, conscientizando-as da gravidade do problema que é o consumo de álcool por nascer, e na prevenção obter resultados favoráveis, incluindo a promoção de uma vida saudável, incluindo a redução de ingestão do álcool, prevenindo contra doenças que tragam consequências materno-fetais.

PALAVRAS-CHAVE: Gestantes; Consumo de bebidas alcoólicas, efeitos adversos; Fatores de risco

THE INCIDENCE OF ALCOHOL CONSUMPTION IN PREGNANT WOMEN: AND ITS DELETIVE EFFECTS; LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: Exposure to alcohol during pregnancy can impair fetal brain development and cause intellectual deficits that manifest later in childhood. Consuming alcoholic beverages during pregnancy is a reality that

J\QHFRORJ\ REVWHWULFLDQV DQG SHGLDWULFLDQV KDYH D
consequences in all its forms, leading to various deleterious effects on the embryo and fetus,
DQG LW LV XS WR WKHVH SURIHVVLRQDOV WR FRQWULEXWH
DQG LQWHUHVW IRU KHDOWK SURIHVVLRQDOV GXH WR WKH
SUHJQDQW ZRPHQ DV ZHOO DV NQRZLQJ WKH FRQVHTXHQF
2EMHFWLYH 7R H[DPLQH WKURXJK D OLWHUDWXUH UHYLHZ
HIIHFW RI DOFRKRO FRQVXPSWLRQ GXULQJ SUHJQDQF\ 0D
HOHFWURQLF GDWDEDVHV IURP WR 6FLHOR 3XE0HG
ZHEVLWHV 5HVXOWV VKRZHG WKDW PXOWLGLVFLSOLQDU\
JXLGDQFH WR WKHVH SUHJQDQW ZRPHQ PDNLQJ WKHP DZDU
KRZ KDUPIXO LW LV WR WKH XQERUQ FKLOG DQG LQ SUHYH
interventions aimed at promoting a healthy life, including reducing alcohol intake, preventing
GLVHDVHV WKDW EULQJ PDWHUQDO IHWDO FRQVHTXHQFHV
KEYWORDS 3UHJQDQW ZRPHQ &RQVXPSWLRQ RI DOFRKROLF E
IDFWRUV

LISTA SIGLAS/ABREVIATURAS

206	2UJDQL]DomR 0XQGL
(WDQRO	ÉOFRRO (WtOLFR
+HSDWyFLWRV	&pOXODV +HSiWLF
6$)	6tQGURPH $OFRyOL
61&	6LVWHPD 1HUYRVR
,*)	,QVXOLQ /LNH*URXW
,*)	,QVXOLQ /LNH*URXW
51	5HFpQ 1DVFLGR
06	0LQLVWpULR GD 6D

1 | INTRODU˙ˆO

Para a Organizaçªo Mundial da Saœde OMS [1], o consumo de Ælcool Ø um tema de
JUDQGH SUHRFXSDomR QD VRFLHGDGH 2 XVR DEXVLYR GR
estar humano, pois afeta pessoas, famílias, comunidades e a sociedade como um todo, e
DLQGD FRQWULEXL SDUD DV GHVLJXDOGDGHV VRFLDLV H V

O consumo do Ælcool por homens e mulheres vem de muitos sØculos, em diversos
HYHQWRV FHULP{QLDV UHOLJLRVDV FHOHEUDo}HV GHQW
proibiam as noivas de se embriagarem na celebraçªo do seu casamento para que numa
possível gravidez nªo ocorresse efeito do Ælcool[2].

Segundo Assis e Castro[3], o crescente aumento do pœblico feminino no consumo
alcoólico tambØm pode ser atribuído à conquista da igualdade de direitos entre homens

e mulheres, resultantes das lutas e movimentos feministas das dØcadas de 1960 a 1980, YHULÀFDGD SHOD PXGDQoD QR HVWLOR GH YLGD TXH D P QRYRV SDSpLV H UHVSRQVDELOLGDGHV

E mesmo com as recomendaçes da OMS [1], o consumo de Ælcool, por gestantes p GH JUDQGH SURSRUomR H p VDELGR TXH PHVPR DSHQD SRGHQGR WHU UHSHUFXVV}HV SRVWHULRUPHQWH [4], QR VHX repercussıes da sua utilizaçªo vªo para alØm do efeito nos próprios indivíduos que as FRQVRPHP RX VHMD LPSOLFDP WRGD D VRFLHGDGH

A exposiçªo ao Ælcool durante a JUDYLGH] SRGH SURMXGLFDU R FHUHEUDO GR IHWR H HVWi DVVRFLDGD D GpÀFLWV LQWHO QD LQIkQFLD 8PD PHOKRU LGHQWLÀFDomR H LQWHUYHQom durante a gravidez Ø muito importante, uma vez que poderia impedir vÆrias repercussıes e sofrimentos, sendo ainda mais importante que exista um mØtodo preventivo [4] 2 iOFRRO tambØm Ø um tóxico que afeta uma ampla gama de estruturas e processos no sistema nervoso central que interagem com características de personalidade [5]

De acordo com Baptista et al [6]., pesquisas na AmØrica do Norte e Europa indicam que a freqüŒncia de uso de bebidas alcoólicas durante a gravidez varia entre 8,5% e VHQGR HVVDV WD[DV PXLWR GHSHQGHQWHV GR LQVW do consumo alcoólico e do período da JUDYLGH] TXH IRL LQYHVWLJDGR

Costa et al [7]., DÀUPDP TXH QR %UDVLO HVWXGRV UHDOL]DGRV HVWLPDP D IUHTrQFLD GH FRQVXPR GH iOFRRO HP WRUQR Fabri [8], esse fato Ø preocupante, principalmente quando se sabe que o consumo de Ælcool durante a gestaçªo envolve grande risco, devido à embriotoxicidade e teratogenicidade IHWDO TXH D HOH HVWmR UHODFLRQDGDV WUDQVIRUPDQG

Segundo Gupta; Gupta e Shirasaka [9], o consumo abusivo de bebidas alcoólicas SURYRFD DOWHUDo}HV KHPRGLQkPLFDV QD JHVWDQWH TX placentÆrio, alØm de circular livremente por todos os compartimentos líquidos do corpo, LQFOXLQGR YDVFXODWXUD OtTXLGR LQWHUVWLFLDO H LQ Ø a mesma na gestante e no concepto, fazendo com que o líquido amnióticoo permaneça LPSUHJQDGR GH iOFRRO QmR PRGLÀFDGR HWDQRO H DFHW

Consumir bebida alcoólica durante a gestaçªo Ø uma realidade que gineco-obstetras H SHGLDWUDV Mi FRQVWDWDUDP H VDEHP GDV WHUUtYHL OHYDQGR D YiULRV HIHLWRV GHOHWpULRV DR HPEULmR H FRQWULEXLU GHFLVLYDPHQWH SDUD D SUHYHQomR 2 FUHV idade reprodutiva e na gestaçªo tem sido alvo de grande preocupaçªo no meio clínico, pois Mi VH VDEH TXH R FRQVXPR FU{QLFR GH HWDQRO JHUD SUR a gestante como para o recØm-nascido [10]

No Brasil, sªo poucos os estudos sobre a epidemiologia do uso de Ælcool durante a gestaçªo, sendo a maioria, conduzidos na regiªo sudeste do País [11]

2 | OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral

2 REMHWLYR GHVWH HVWXGR p H[DPLQDU SRU PHLR compreendendo os œltimos 16 anos, o efeito deletØrio do consumo de Ælcool durante a JHVWDomR

2.2 2EMHWLYRV (VSHFtÀFRV

(QWHQGHU DSyV D FRQVXOWD ELEOLRJUiÀFD gravidez SULQFLSDOPHQWH DR IHWR FDXVDGD SHOR FRQVXPR GH

Compreender os mecanismos de metabolizaçªo do Ælcool, durante a JUDYLGH]

Atualizar sobre os nœmeros reais de consumo de Ælcool durante a gravidez, SULQFLSDOPHQWH QRV JUDQGHV FHQWURV

3 | RELEV´NCIA DO ESTUDO

O presente estudo foi desenvolvido pela relevância de um problema de saœde publica que tem aumento exponencialmente, que Ø o consumo de Ælcool durante a gestaçªo, levando a um aumento de patologias fetais e de recØm-nascido, cada vez maior, como EDL[R SHVR SUHPDWXULGDGH GRHQoDV GR UHFpQ QDVFLG

4 | REVISˆO DE LITERATURA

4.1 `lcool

2 iOFRRO p XPD GURJD OHJDO DPSODPHQWH FRQVXPL uma conotaçªo diferenciada de todas as outras drogas, o seu uso Ø facilmente aceito pela VRFLHGDGH 2 IiFLO DFHVVR EDL[R FXVWR H HOHYDGD DFH VHMD FDGD YH] PDLV HVWLPXODGR OHYDQGR D TXH VHMD do mundo[12]

De acordo com a Organizaçªo Mundial da Saœde OMS [13], o uso do Ælcool faz parte de muitas prÆticas culturais, religiosas e sociais e, frequentemente, estÆ associado j VHQVDomR GH SUD]HU H UHOD[DPHQWR 1R HQWDQWR V quando hÆ consequŒncias sociais e para a saœde, tanto para o consumidor como para as pessoas próximas a ele e para a sociedade em geral, ou quando o padrªo de consumo estÆ DVVRFLDGR D PDLRU ULVFR GH GDQRV j VD~GH

Éimportante considerar que conhecer e entender padrıes de consumo de Ælcool Ø um passo importante para prever as consequŒncias de seu uso e para criar medidas TXH FRQWULEXDP SDUD PXGDU KiELWRV QRFLYRV $ SUR dependŒncia Ø sutil e decorre nªo somente da quantidade consumida, mas tambØm da freqüŒncia, circunstâncias deste consumo e consequŒncias para a saœde[14]

e VDELGR TXH R PDLRU FRQVXPR GH iOFRRO VHPSUH I
DV PXOKHUHV WrP DXPHQWDGR VLJQLÀFDWLYDPHQWH HVVH
PDV WDPEpP j IUHT rQFLD (VVD HTXLSDUDomR GR FRQVXI
de preocupaçes, pois pode representar desigualdade nos resultados para a saœde, uma
vez que as mulheres sªo biologicamente mais vulnerÆveis aos efeitos do Ælcool do que os
KRPHQV &RP LVVR HODV WrP PDLRU SUREDELOLGDGH GH
FRP QtYHLV GH FRQVXPR PDLV EDL[RV H RX HP LGDGH PDL
comparaçªo com 2010, o ano de 2016 se encerrou com 91 mil mulheres a mais, em todo
R PXQGR DÀUPDQGR FRQVXPLU iOFRRO PHVPR HP XP FHQ
prevalŒncia mundial de consumo caiu de 37,3% para 32,3%[15]

4.1.1 Metabolismo do Ælcool

Quando o Ælcool Ø ingerido, Ø absorvido completamente ao longo do tubo digestivo:
QR HVW{PDJR DSUR[LPDGDPHQWH QR GXRGHQR H R
RFRUUH UDSLGDPHQWH KDYHQGR DOJXQV IDWRUHV TXH
tais como: concentraçªo de Ælcool, composiçªo da bebida estada da mucosa gÆstrica e
GXRGHQDO LQJHVWmR VLPXOWkQHD GH DOLPHQWRV HWF
D DEVRUomR ID] VH PDLV UDSLGDPHQWH GR TXH TXDQGR L
atingindo a sua concentraçªo mÆxima no sangue atØ cerca de uma hora e meia após a
ingestªo [16]

O Ælcool, na circulaçªo sanguínea, difunde-se facilmente por todo o organismo em
IXQomR GR FRQWH~GR KtGULFR GRV GLIHUHQWHV yUJmRV H
no sangue, líquido cefalorraquidiano, suor, urina, líquido amniótico da mulher grÆvida e
no leite da mulher a amamentar, atingindo especialmente os órgªos mais vascularizados
FRPR R ItJDGR FpUHEUR ULQV H P~VFXORV $ HOLPLQDom
SHORV SXOP}HV SHOR VXRU H SHOD XULQD 2V UHVWDQWH
metabolizados no nível do fígado a nível celular (hepatócitos), ocorrendo uma reduzida
metabolizaçªo extra-hepÆtica em nível do tubo digestivo[16]

O consumo de Ælcool na gestaçªo vem desde a antiguidade, porØm, somente
QDV ~OWLPDV GpFDGDV p TXH VH REVHUYD XP JUDQGH LQ
VREUH R DVVXQWR 7DO SUHRFXSDomR VH GD GHYLGR DR
na gestaçªo e o efeito sobre o desenvolvimento do feto e posteriormente da criança e do
DGXOWR 5HVVDOWD VH TXH R PRGR GHVSUHRFXSDGR H DV
Ælcool pelas mulheres Ø encarada pela populaçªo contribui para tal[12]

4.1.2 `lcool na gestaçªo

Grinfeld [17], em seus estudos, observou que os efeitos resultantes da exposiçªo
DR iOFRRO PD JHVWDomR VmR GH XP H[WHQVD FRPSOH[LG

muitas vezes a suspeita clínica e diagnóstico devido à variedade de aspetos clínicos e
F R P S R U W D P H Q W D L V D V V R F L D G R V

Na teoria dos autores De Vido; Bogunovic e Weiss[18], nªo existe um consenso sobre
D T X D Q W L G D G H V H J X U D G H i O F R R O T X H S R G H U L D V H U L Q J H
se que baixos níveis de exposiçªo prØ-natal podem afetar negativamente o desenvolvimento
H P E U L R I H W D O 3 R U W D Q W R D U H F R P H Q G D o m R G R V V H U Y L o R
T X H D V P X O K H U H V V H D E V W H Q K D P F R P S O H W D P H Q W H G R X V
· 1 R % U D V L O R 0 L Q L V W p U L R G D 6 D ~ G H S U R S } H T X H R V
gestantes sobre os riscos associados ao uso de Ælcool e recomendam particular abstençªo
nos trŒs primeiros meses gestacionais[19]

Importante ressaltar que o cØrebro Ø o ógªo mais susceptível aos efeitos da
exposiçªo prØ-natal ao Ælcool, uma vez que todos os trimestres da gestaçªo sªo críticos
S D U D R V H X G H V H Q Y R O Y L P H Q W R 2 i O F R R O D J H G H G L Y H U
cØlula cerebral e do estÆgio de desenvolvimento embriofetal, podendo provocar alteraçes
H V W U X W X U D L V H I X Q F L R Q D L V P R U W H F H O X O D U S U H M X t] R
de migraçªo celular, produçªo de neurotransmissores e formaçªo de sinapses [20]

Baptista et al[6]., O H P E U D P T X H H P I R L L G H Q W L À F D G R H
H V S H F t À F R Q D V F U L D Q o D V Q D V F L G D V G H P X O K H U H V H W L O L
Fetal (SAF ou FAS, fetal alcoholsyndrome (V V D p X P D F R Q G L o m R L U U H Y H U V
S R U D Q R P D O L D V F U D Q L R I D F L D L V W t S L F D V G H À F L r Q F L D G
disfunçes do sistema nervoso central (incluindo anormalidades neurológicas, alteraçes
F R P S R U W D P H Q W D L V D W U D V R Q R G H V H Q Y R O Y L P H Q W R Q H X
alØm de vÆrias malformaçes associadas, principalmente cardíacas, oculares, renais e de
F R O X Q D Y H U W H E U D O

Ramadoss e Magness[21] D À U P D P T X H D H [S R V L o m R P D W H U Q D D R i C
hemodinâmicas: o eixo endócrino regulador da resistŒncia vascular, a reatividade vascular
V L V W r P L F D D K H P R G L Q k P L F D ~ W H U R S O D F H Q W i U L R D D Q J
(V V D V D O W H U D o } H S F R Q W U L E X H P S D U D D S D W R J r Q H V H G D

Kahilaet al[22] D S R Q W D P X P D X P H Q W R G D P R U W D O L G D G H P D W
abortamento e natimortalidade sªo relatados por Chiodoet al [23] H V W X G D Q G R D V W I
P R U W D O L G D G H P D W H U Q D G H P X O K H U H V T X H W L Y H U D P À O K F
i O F R R O Y H U L À F D U D P T X H H V V D W D [D H U D Y H] H V P D L R U
Q m R W L Y H U D P À O K R V D I H W D G R V F R P P p G L D G H S H U G D G H
D Q R V

Segundo Freire et al[24]., a exposiçªo ao Ælcool estÆ ligada ao ganho do peso gestacional
L Q V X À F L H Q W H P H Q R U Q ~ P H U R G H F R Q V X O W D V S U p Q D W D C
R X W U D V G U R J D V (V W L P D V H T X H D G D V J H V W D Q W H V
W L S R G H E H E L G D D O F R y O L F D

Para Grinfeld e Segre[25], o consumo de Ælcool na gravidez associa-se a mÆs

condições socioeconômicas, nível educacional baixo, multiparidade, idade acima de 25 anos e concomitantemente encontram-se desnutrição, doenças infecciosas e uso de outras GURJDV

O consumo de Álcool na gestação pode levar ao abortamento, deslocamento prematuro da placenta, hipertonia uterina, parto prematuro, baixo peso dos recém-nascidos e aumento o risco de infecções [26] 6mR PXLWDV H LPSRUWDQWHV DV UD]}H grávida permaneça com o seu vício de alcoolismo durante a JUDYLGH] (VWXGRV U salientam que a causa mais comum de alcoolismo materno é depressão desencadeada pela atitude negativa em relação à JUDYLGH] $FRPSDQKD R TXDGUR FRP U uma carência afetiva global, um baixo padrão socioeconômico e um estado nutricional comprometido[27]

Mesquita e Segre[11] UHDOL]DUDP XPD SHVTXLVD FRP JHVW seguintes fatores para consumo de álcool entre essas gestantes: adolescência; baixo nível de escolaridade; baixo nível socioeconômico; coabitação com alcoolistas; hábito de fumar; XVR GH GURJDV LOtFLWDV JHVWDomR QmR SODQHMDGD H

O uso do álcool na gestação se associa a uma rede complexa de variáveis sócio GHPRJUiÀFDV FRPSRUWDPHQWDLV H IDPLOLDUHV 2V IDWR interseção com esse comportamento incluem idade mais elevada e status socioeconômico desfavorável (renda e escolaridade baixa)[32]

1R %UDVLO XP HVWXGR PXOWLFrQWULFR FRQGX]LGR H de hospitais públicos de Manaus, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre estimaram uma prevalência de uso de álcool durante a gestação de 34,4%[29] (VWXGRV de Moraes e Reichenheim[30] HP QR 5LR GH -DQHLUR LGHQWLÀF JHVWDQWHV HVWXGDGDV LQJHULUDP iOFRRO HP DOJXP PRP

Estudos de Mesquita e Segre[11] em 2009 na cidade de São Paulo, em uma população carente, encontraram 33,3% de gestantes consumidoras de álcool em algum momento da JHVWDomR H FRQVXPLQGR iOFRRO GXUDQWH WRGD D I *HVWDQWHV XVXiULDV GH iOFRRO WHQGHP D UHMHLW incidência de sintomas depressivos e de violência doméstica[21]

Diversos autores estudaram as taxas de mortalidade materna de mulheres que WLYHUDP ÀOKRV FRP DOWHUDo}HV SUp QDWDLV GHYLGDV D YH]HV PDLRU TXH QR JUXSR FRQWUROH GH PmHV TXH PpGLD GH SHUGD GH DQRV GH H[SHFWDWLYD GH YLGD GH IRUDP FkQFHU OHV}HV GHFRUUHQWHV GR XVR GH iOFRRO mais grave e dramática segue sendo a ocorrência da SAF[33-35-36-37]

4.1.3 Fatores de risco relacionados aos efeitos do álcool na gestação, no feto e no recém-nascido

Border[35] ensina que a expressão fatores de risco envolve condições e/ou

variÆveis que possibilitam a ocorrŒncia de resultados negativos para a saœde, bem-estar e
GHVHPSHQKR VRFLDO $ LGHQWLÀFDomR GH IDWRUHV GH UI
diagnóstico precoce e, consequentemente, de intervenções tambØm precoces, dirigidas a
GLPLQXLU DTXHODV FRQGLo}HV OHVLYDV j VD~GH
(P UHODomR DRV HIHLWRV GR iOFRRO VREUH R IHWR
GH VXPD LPSRUWkQFLD (PERUD QmR KDMD HVWXGRV HP C
fato de serem inter-relacionados e possivelmente diferentes segundo as populações, torna-
VH GLItFLO GLVSRU GH GDGRV DFXUDGRV D UHVSHLWR (QI
interferir na exposiçªo prØ-natal ao Ælcool, como mostrados a seguir[26]

)DWRUHV GHPRJUiÀFRV H HVWLOR GH YLGD

idade materna acima de 30 anos;

baixa renda e baixo nível socioeconômico;

baixa escolaridade;

PmH VROWHLUD DXVrQFLD GH FRPSDQKHLUR À[R

estar desempregada;

baixo peso e altura materna (IMC baixo), indicando desnutriçªo;

pouca religiosidade;

cor da pele nªo branca ;

residŒncia em Ærea ruralª[26]

Ramados e Mafness[27] DÀUPDP TXH DV H[SRVLo}HV PDWHUQDV
variÆveis hemodinâmicas: o eixo endócrino regulador da resistŒncia vascular, a reatividade
vascular sistŒmica, a hemodinâmica œtero-placentÆrio, a angiogŒnese e o remodelamento
YDVFXODU (VVDV DOWHUDo}HV FRQWULEXHP SDUD D SDWR
$OJXQV IDWRUHV GH ULVFR SDUD R HIHLWR GR iOFRRO
o nível educacional e econômico da gestante, no entanto continuam a existir dœvidas,
PHFDQLVPRV SRU HVWDEHOHFHU DVVRFLDo}HV FDXVD HIHL
questªo ainda por responder diz respeito à quantidade e freqüŒncia de Ælcool ingerido
FDSD] GH FDXVDU GDQR QR IHWR GLÀFXOWDQGR D LGHQW
VHJXUD SDUD D LQJHVWmR GH iOFRRO QD JHVWDomR R TX
total abstinŒncia de Ælcool durante a gravidezª[27]

4.1.4 Ações do Ælcool sobre o feto

Vieira[38] DÀUPD TXH R iOFRRO H[HUFH QR IHWR LQ~PHUDV I
atingindo todos os seus órgªos por açªo direta, alterando a funçªo, multiplicaçªo e
migraçªo celular, e tambØm por uma açªo indireta, que decorre de suas ações sobre a
gestante, interferindo no seu apetite levando-a àmÆ nutriçªo, provocando vasoconstriçªo

SODFHQWiULD WHQGR FRPR FRQVHT rQFLD D GLÀFXOGDGH SDUD R IHWR (VVHV HIHLWRV UHVXOWDP HP UHVWULomR PDOIRUPDo}HV FRQJrQLWDV IHWDLV

Ainda o mesmo autor acrescenta que um fator importante Ø que o tempo de exposiçªo GR IHWR DR iOFRRO YDULD PXLWR 8PD D GXDV KRUDV GH encontrado no sangue fetal em níveis semelhantes aos maternos, contudo sua eliminaçªo Ø lenta, devido àreduzida capacidade metabólica do feto, alØm de que o líquido amniótico VH WRUQD UHVHUYDWyULR GH HWDQRO H GR DFHWDOGHtGR GHSHQGH GD FDSDFLGDGH PHWDEyOLFD PDWHUQD TXH SR Essa Ø uma explicaçªo possível para o fato de que quantidades semelhantes de Álcool consumido durante a gestaçªo resultam em grande variaçªo dos fenótipos encontrados [38]

1D ÀJXUD D VHJXLU SRGHP VHU YLVWRV HVTXHPDV desenvolvimento fetal evidenciando que, desde muito precocemente, o Álcool pode atingir RV PDLV GLIHUHQWHV yUJmRV GHVVH IHWR HP GHVHQYROY

Conforme Costa[39], durante o período embrionÁrio (da nidaçªo atØ a 8“ semana de idade gestacional), o Álcool atua provocando alteraçªo de divisªo, proliferaçªo, migraçªo H GLIHUHQFLDomR FHOXODU TXH VH WUDGX]HP SHOR DSDU Durante o período fetal (da 9“ atØ a 14“ semana deidade gestacional) sua açªo provoca DOWHUDo}HV QR 6LVWHPD 1HUYRVR &HQWUDO 61& 6mR Y DomR GR iOFRRO QR 61&

$ ÀJXUD D VHJXLU PRVWUD RV PHFDQLVPRV GH DomR FHQWUDO

O dano que o Álcool causa no cérebro em desenvolvimento pode ser vários sentidos, SRUpP R PDLV LPSRUWDQWH SRGH VHU D PRUWH QHXURQD a certas regiões do cérebro, como os gânglios da base, mas pode ocorrer em outras regiões ou simplesmente não existir [39]

Costa[39] DÀUPD TXH D SUHVHQoD JUDYLGDGH H ORFDOL]D HQWUH DV FULDQoDV H[SRVWDV DRV HIHLWRV GR iOFRRO Q de peptídeos opióides endógenos e atividade dos receptores do Ácido gama-aminobutírico (GABA) e este interage com muitos sistemas de neurotransmissores promovendo aumento da glicina, acetilcolina, dopamina e da atividade da serotonina e dos opioides e inibe a atividade de transmissão do glutamato sobre os neurônios terminais, provocando a apoptose de milhões de células nervosas no cérebro em desenvolvimento, como também D SUROLIHUDomR LQDSURSULDGD H SHUGD GH DVWUyFLWRV dos neurônios), interrompendo ou alterando sua migração, de modo que esses não estarão QRV VHXV OXJDUHV DSURSULDGRV QD IDVH SUHFRFH GR GH

Na teoria de Brocardo; Gil-Mohapel e Christie[41] podem-se também incluir como efeitos do Álcool no feto a elevada resposta ao estresse e diminuição na resposta imune, a baixa proliferação das células T e da atividade citolítica das células Natural Killer NK, GLPLQXLomR GD UHVSRVWD j LQWHUOHXFLQD H GR Q~PHU ItJDGR FRP DXPHQWR GD LQFLGrQFLD GH LQIHFo}HV EDFWH (VWXGRV GHPRQVWUDP TXH R SROLPRUÀVPR GDV HQ]L desidrogenase nos genes maternos e seus alelos estão correlacionado com a maior

incidŒncia de efeitos do Ælcool na gestante e no feto[40]. O álcool reduz a retinol-desidrogenase diminuindo a produção de ácido retinoico, que é essencial para a formação de novos tecidos/órgãos e padrões craniofaciais, levando às alterações presentes na Síndrome Alcoólica Fetal-SAF) [39]

De acordo com resultados obtidos em estudos de Niemelaet al[41]., o álcool atua sobre peptídeos opioides nas terminações nervosas do trato gastrintestinal fetal, diminuindo a motilidade intestinal, altera o transporte de glicose para as células, por diminuição de seus transportadores e, com consequente redução da disponibilidade de glicose, ainda a ação dos fatores de crescimento (IGF1 e IGF2), levando a divisão celular alterada e consequente retardo no crescimento intrauterino.

A gestação com abuso do consumo de álcool induz problemas neuropsicológicos nos descendentes, incluindo transtornos de atenção, aprendizagem, de linguagem, má adaptação àvida em sociedade e problemas de comportamento [39]

Jones e Bass[42] asseguram que a retirada abrupta do RN de um ambiente uterino alterado pelo álcool é uma síndrome de abstinência ao álcool geralmente se manifestam nos primeiros dois dias de vida, embora possa ser mais tardia. Os sinais mais comuns incluem irritabilidade, hipotonia, tremores, excessiva tensão muscular comopistótomo, alteração do padrão do sono, estado de alerta freqüente, sudorese, Taquipneia e apneia, recusa alimentar e distúrbios gastrintestinais.

5 | TRATAMENTO

Na teoria de López et al[43]., considerando os problemas físicos, mentais e comportamentais relacionados àexposição fetal ao álcool, as orientações clínicas pré-natais sugerem uma breve avaliação do consumo de álcool durante a gravidez para detectar o consumo de álcool e dos fatores de risco. O consumo de álcool deva ser considerado arriscado durante a gravidez. Identificar os transtornos de uso de álcool é importante, porque elas podem precisar de uma intervenção mais especializada do que os consumidores ocasionais.

Floyd et al[44]., argumentam que de modo geral as gestantes alcoolistas são encaminhadas para serviços de reabilitação e não para serviços de atenção básica. Os serviços de atenção básica são mais indicados para o acompanhamento pré-natal e puerperal. Segundo o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento - como Changing High-riskalcohol use andIncreasing Contraception Effectiveness Study -

CHOICES baseado no emprego das intervenções motivacionais curtas tem sido utilizado em comunidades com altos índices de gestantes alcoolistas e os resultados se mostram DQLPDGRUHV

Brasiliano[27] DÀUPD TXH DV PXOKHUHV GHSHQGHQWHV GH DSUHVHQWDP FDUDFWHUtVWLFDV H QHFHVVLGDGHV GH W'LDQWH GLVVR R TXH VH SURS}H p R GHVHQYROYLPHQWR G Éconsensual que o princípio fundamental para desenvolver e implementar programas Vy SDUD PXOKHUHV DOpP GH DWHQGHU D HVVD SRSXODo JrQHUR RX VHMD XWLOL]H VH GH HVWUDWpJLDV SDUWLF ~QLFDV GDV PXOKHUHV GHSHQGHQWHV 3RUWDQWR UHVV TXH LQFOXDP DVVLVWrQFLD VRFLDO MXUtGLFD DWHQGLPE questıes ligadas àauto-estima, imagem corporal, grupos de terapia sóde mulheres, onde possam ser discutidas questıes afetivas e interpessoais, e nªo somente aquelas ligadas GLUHWDPHQWH j GURJD WHUmR XPD FKDQFH PDLRU GH VH

Segre[47] VXJHUH TXH VHMDP FULDGRV SURJUDPDV QR kPE DWHQGHU jV HVWUDWpJLDV GH SUHYHQomR SULPiULD VHF e orientar as gestantes sobre os efeitos desastrosos do Álcool sobre os fetos, salientando TXH DV FRQVHTXrQFLDV VmR LUUHYHUVtYHLV H TXH QmR FDEH WDPEpP jV VRFLHGDGHV GH SURÀVVLRQDLV GD VD~GH papel importante na divulgaçªo e orientaçªo sobre os inœmeros problemas causados pela H[SRVLomR LQWUD XWHULQD DR iOFRRO $OJXQV GHVDÀRV XPD UHDO SHUFHSomR GD VRFLHGDGH HP JHUDO VREUH D J mitos, como por exemplo, a síndrome alcoólica fetal Ø muito rara , ou minha mªe bebia e nªo me aconteceu nada , ou ainda meu mØdico disse que beber um pouquinho nªo faz PDOµ

6 | MATERIAL E MÉTODO

6.1 EstratØgia de Pesquisa

5HDOL]DPRV XPD EXVFD HP WUrV EDVHV GH GDGRV H Eletronic Libray), Pubmed (Public/Publister Medline), Birene (Biblioteca Regional de 0HGLFLQD

7DPEpP IRUDP FRQVXOWDGRV DUWLJRV SHULyGLFRV LQIRUPDo}HV DGLFLRQDLV

7 | DISCUSSˆO

Moraes e Reichenheim[27], em seus estudos no Rio de Janeiro em 2007, observaram que a causa mais comum de alcoolismo materno Ø a depressªo desencadeada pela atitude

negativa em relaçªo à J U D Y L G H] $ F R P S D Q K D R T X D G U R F R P U H O D W L
afetiva global, um baixo padrªo socioeconômico e um estado nutricional comprometido [27]
$ O p P G L V V R L G H Q W L À F D U D P T X H G D V J H V W D Q W H V H V
P R P H Q W R G D J H V W D o m R H D W p R À Q D O [31] em (Sªo Paulo, G H
em 2009, em uma populaçªo carente, encontraram 33,3% de gestantes consumidoras de
i O F R R O H P D O J X P P R P H Q W R G D J H V W D o m R H F R Q V X P L
Para Souzaet al[26] H P H P 0 L Q D V * H U D L V G D V J H V W D Q W
D O J X P P R P H Q W R G D J H V W D o m R H D W p R À Q D O G D J H V W
A literatura tambØm aponta associaçªo entre consumo de Ælcool na gestaçªo e
D X V r Q F L D G H F R P S D Q K H L U R À [R 0 X O K H U H V V R O W H L U D V D L
de risco associados ao uso de Ælcool na gestaçªo como baixa escolaridade, baixo nível
socioeconômico e J U D Y L G H] L Q G H V H M D G D * H V W D o } H V Q m R S O D Q
demora do reconhecimento das mesmas, permitindo que muitas mulheres se envolvam em
comportamentos de risco, incluindo o consumo de Ælcool[24] 2 X W U R V D X W R U H V F R P S
T X H D O p P G D D X V r Q F L D G H F R P S D Q K H L U R À [R R X W U R V I D W
associados ao consumo abusivo de Ælcool sªo: idade superior a 30 anos, baixa escolaridade,
cor de pele nªo branca , uso de tabaco e drogas ilícitas, e situaçªo de vulnerabilidade
socioeconômica.[30-36]
Na cidade de Sªo Paulo, a pesquisa de Mesquita e Segre[11] L G H Q W L À F R X
S X H U S H U D V F R P R 7 $ & (S R V L W L Y D V (Q W U H R V I D W R U H V F
G H i O F R R O G X U D Q W H D J H V W D o m R H V W X G R M D P D S D V V D G R D G H S
uso de Ælcool com outras drogas, nœmero de coabitantes tambØm usuÆrios de etanol e a
Q m R F R D E L W D o m R F R P R F R P S D Q K H L U R (V W X G R [30], em
2007, com 537 parturientes no Rio de Janeiro constatou que cerca de 40% das mulheres
À] H U D P X V R G H D O J X P W L S R G H E H E L G D D O F R y O L F D G X U D Q
P D L V F R P X P H Q W H F L W D G D et al[24]. (e a Z X G R R n G 1 5 0 p u e r p e r a l d a
cidade de Ribeirªo Preto, no estado de Sªo Paulo, observou-se reduçªo mØdia de 109g
Q R S H V R H G H F P Q R S H U t P H W U R F H I i O F R Q R V À O K R V
L G H Q W L À F D G D V S H O R 7 $ & (V H Q G R T X H Q R V I H W R V G R J r Q
mais acentuada (186g), sugerindo uma possível maior susceptibilidade relacionada ao
gŒnero do U H F p P Q D V F L G R
Éimportante ressaltar que a restriçªo de crescimento fetal Ø um efeito conhecido do
i O F R R O 2 H W D Q R O L Q G X] D I R U P D o m R G H U D G L F D L V O L Y U
H O L S t G H R V F H O X O D U H V D X P H Q W D Q Q G R D D S R S W R V H H S U
nascimento de bebŒs com baixo peso (< 2500g no recØm-nascido a termo) ou pequenos
para idade gestacional aumenta linearmente em mªes que consomem diariamente uma
G R V H G H i O F R R O F H U F D G H J G H i O F R R O D E V R O X W R R X
gestantes de uma maternidade pœblica da cidade de Sªo Paulo constatou que quanto maior
o consumo de Ælcool, menores eram o peso, o perímetro cefÆlico e o comprimento dos

recØm-nascidos[11]

2 UHFRQKHFLPHQWR GR SHUÀO GH PXOKHUHV TXH ID]HP
a gestaçªo pode ser utilizado para priorizar açes de educaçªo em saœde voltadas para
SDUFHOD GD SRSXODomR PDLV YXOQHUiYHO 1R HQWDQWR
a atençªo àuma populaçªo aparentemente de risco, uma vez que muitas mulheres com
suspeita de uso abusivo do Ælcool nªo correspondem ao padrªo estabelecido na literatura[30]

O MinistØrio da Saœde[19] SUHFRQL]D TXH GXUDQWH R SUp QDWD
ERP YtQFXOR HQWUH D JHVWDQWH H D HTXLSH GH SURÀVV
D LGHQWLÀFDomR GH PXOKHUHV FRP SURSHQVmR SDUD XV
VREUH DV FRQVHTXrQFLDV GR XVR GH iOFRRO QD JHVWDom
segura de ingesta de Ælcool durante a gravidez e que qualquer quantidade pode afetar
o desenvolvimento embriofetal, Gupta; Gupta e Shirasaka[20] recomendam que o material
SXEOLFDGR SHOR 0LQLVWpULR GD 6D~GH 06 SDUD HGXF
como da populaçªo leiga, explicite a importância da abstençªo de consumo de bebidas
DOFRyOLFDV DR ORQJR GH WRGD JHVWDomR H QmR DSHQ
de campanhas publicitÆrias sobre o assunto tambØm pode ser uma medida adicional de
HGXFDomR HP VD~GH

O reconhecimento dos problemas relacionados com a exposiçªo fetal ao Ælcool
permite uma maior adequaçªo do atendimento oferecido àgestante, ao recØm-nascido e
àsua IDPtOLD 3RUWDQWR D LGHQWLÀFDomR H FDUDFWHUL]D
ao consumo de Ælcool na gestaçªo podem colaborar no desenvolvimento de estratØgias
GH LQWHUYHQomR PDLV HÀFD]HV SDUD SUHYHQLU H RX GLP
Ælcool, contribuindo para prevençªo primÆria das alteraçes neuro comportamentais e da
GHÀFLrQFLD tLQWHOHFWXDO

8 | CONCLUSˆO

A literatura mostrou que existe uma elevada prevalŒncia de uso de Ælcool por
PXOKHUHV QD JHVWDomR e QHFHVViULR TXH VHMDP IHLWR
alvos de investigaçes mais detalhadas, uma vez que existem poucas pesquisas sobre
HVVD UHODomR

O alcoolismo na gestaçªo Ø considerado um grave problema social, e sªo necessÆrias
açes multidisciplinares com assistŒncia e orientaçes a essas mulheres, conscientizando-
DV GD JUDYLGDGH GR SUREOHPD H R TXDQWR p SUHMXGLFL
XWHULQR H QD SUHYHQomR SDUD REWHU UHVXOWDGRV ID
Adoçªo de Intervençes intensivas que visem promoçªo de uma vida saudÆvel,
incluindo a conscientizaçªo da gestante sobre os malefícios da ingestªo do Ælcool durante
a JUDYLGH] SUHYHQLQGR D RFRUUrQFLD TXH WUDJDP FRQV
O presente estudo demonstrou de forma clara, após a revisªo de vÆrios artigos o

SDSHO GHVWUXWLYR GR FRQVXPR GH iOFRRO QD JHVWDomI

Ressaltamos a importância da divulgação de campanhas para conscientização da Gestante, como sendo uma ferramenta fundamental para promover futuros problemas de saœde, mÆ formação fetal e desenvolvimento cognitivos do UHFpP QDVFLGR

REFERˆNCIAS

206 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG Problemas de salud pública causados por el uso nocivo delalcohol. /D $VDPEOHD 0XQGLDO GH OD6DOXG *LQHEUD

*5,1)(/' + &RQVXPR QRFLYR GH iOFRRO GXUDQWH D JUDYLGH] ,Q 6LOYHLUD & 0 (GV `lcool e suas consequências: XPD DERUGDJHP PXOWLFRQFHLWXDO 0LQKD (GLWRUD SS

$66,6 ')) GH &$6752 1 7 GH $OFRROLVPR)HPLQLQR LQtFLR WUDWDPHQWR Textos &Contextos 3RUWR $OHJUH Y Q S DJR

52&+$ $ Consumo de Ælcool e vivŒncia psicológica da gravidez 'LVVHUWDomR GH 0HVWUDGR 8QLYHUVLGDGH &DWyOLFD 3RUWXJXHVD 3RUWR

:+2 :RUOG +HDOWK 2UJDQL]DWLRQ European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012 2020 &RSHQKDJHQ :+2 5HJLRQDO 2IÀFH IRU (XURSH

%$37,67$) + 52&+$. % % 0$57,1(//, - / 6,/9$ '($9— / 5)(5 PrevalŒncia e fatoresassociados ao consumo de Ælcool durante a JUDYLGH] Rev. Bras. Saude Mater. Infant Y QR 5HFLIH $SU -XQH

&267$ ' 2 1(72 3) 9)(55(,5$ / 1 &248(,52 5 6 &$6277, & $ Ælcool e tabaco por gestantesassistidas na estratØgia de saœde da D P tOLD Revista Eletrônica Gestªo & Saœde

)$%5, 2 Desenvolvimento e validação de um instrumento de rastreamento do uso nocivo de Ælcool durante a gravidez (T-ACE). Dissertação (Mestrado) Universidade de Sªo Paulo (USP) 5LEHLUmR 3UHWR

*837$ . . *837$ 9 . 6+,5$6$.$ 7 $Q 8SGDWH RQ)HWDO $OFRKR 5LVNV DQG 7UHDWPHQW AlcoholClinExp Res

%85*26 0 * 3 $ 0('(,526 0 & %,21) 0 3(662$ ' & 1 3 EHELGDV DOFRyOLFDV HP PmHVODFWDQWHV Rev. Bras. Saude Mater. Infant XVV}HV

0(648,67$ 0 $ 6(*5(& $ 3)UHTXrQFLD GRV HIHLWRV GR iOFRR GH EHELGDV DOFRyOLFDV SHODV JHVWDQWHV GH 0DWHUQLGDGH S~ Crescimento Desenvolvimento Hum

2/,9(,5$ *) (/8&+(6, / % 2 GLVFXUVR VREUH iOFRRO QD 5HYLV Rev. Latino-Am. Enfermagem SS

206 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG Global Strategy to reduce the harmful use of alcohol *HQHEUD 6XtoD 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GD 6D~GH D

$1'5$'($ `lcool e a saœde dos brasileiros: panorama 2019 &,6$ &HQWUR GH ,QIRUPDo}HV VREUH 6D~GH H ÉOFRRO %UDVLO

2 0 6 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG Global Status Report on Alcohol and Health 2018. *HQHEUD 6XtoD 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GD 6D~GH D

0(//2 0 / 0 %$55,$6 - (`lcool e problemas ligados ao Æ/LVERD 'LUHomR *HUDO GD 6D~GH

*5,(1)(/' + $OFRROLVPR IHPLQLQR GXUDQWH D JHVWDomR ,Q 6(gestante, no feto e no UHFpP QDVFLGR Sociedade Brasileira de Pediatria de Sªo Paulo SS

'(9,'2 - %2*8129,&2 :(,66 5' $OFRKRO XVH GLVRUGHUV LQ SUHJQ

%5$6,/ 0LQLVWpULR GD 6D~GH 6HFUHWDULD GH $WHQomR j 6D~G Atenç²o ao prØ-natal debaixo risco/MinistØrio da Saœde. 6HFUHWDULD GH $WHQomR j 6D~ 'HSDUWDPHQWR GH $WHQomR %iVLFD HG UHY %UDVtOLD (GLWRU 'LVSRQtYHO HP KWWS GDE VDXGH JRY EU SRUWDOGDE ELEOLRWHF HP

*837$ . . *837$ 9 . 6+,5$6$.$7 $Q 8SGDWH RQ)HWDO $OFRKRO 5LVNV DQG 7UHDWPHQW AlcoholClin Exp Res

5$0$'2 - 0$*1(66 5 5 9DVFXODU HIIHFWV RI PAWWHysDO DOFRK Heart Circ Physiol +

.$+,/$ + *,66/(5 0 6$5.2/$ 7 $877,5b0g , +$/0(60b., (0DWHUQ morbidity and mortality 6-15 years after a pregnancy complicated by alcohol and substance abuse: a UHJLVWHU EDVHG FDVH FRQWURO DrugAlcohol Depend WXG\ RI ZRPHQ

&+,2'2 / 0 %$,/(< % $ 62.2/ 5 - -$1,66(- '(/$1(< %/$&. 9 HW VSRQWDQHRXV DERUWLRQLQ PLG SUHJQDQF\ AQnSDWWHUQV RI SU

)5(,5(7 0 0$&+$'2 - & 0(/2 (9 0(/2 ' * (IHLWRV GR FRQVXP VREUH R IHWR RevBrasGinecol Obstet

*5,1)(/' + 6(*5(& $ 5HFpP QDVFLGR Principios Fundamentais de Ética Prática

628=$ / + 5) Padrªo do consumo de Æ/cool em gestantes atendidas em um hospital pœblico universitÆrio e fatores de risco associados

%5$6,/,$1 Comorbidade entre dependŒncia de substâncias psicoativas e transtornos alimentares SHUÀO H HYROXomR GH PXOKHUHV HP XP WUDWDPHQWR HVS >WHVH@ 6mR 3DXOR 8QLYHUVLGDGH GH 6mR 3DXOR

,6$6(1 $ % 67%<(7 0 0 %$*$ % 7 '$/79(,7 $. $OFRKRO FR SUHJQDQW ZRPHQ LQ 1RUWKHUQ 7DQ]DQLD D UHJLVWU\ EDVH

.52()) / 5 0(1*8(6 6 6&+,0,'7 0 , '81&$1 % %)$9$5(772 $ /
DVVRFLDGRV DR IXPR HP JHVWDQWHVDYRUHV GH FDUDFWHUtVWLFDV HLGDGHV EUDV

025$(6 & / 5(,&+(1+(,0 0 (5DVWUHDPHQWR GH XVR GH iOFRRO
S~EOLFRV GH VD~GH GR 6WDWH 3XEOLF 2IILFH

0$1=2//, 3 181(6 0 $ 6&+0,'7 0 , 3,1+(,52 $ 3 62$5(6 5 0 HW
GHSUHVVLYHV\PSWRPV GXULQJ SUHJQDQF\ Psychiatry Psychiatr DUH VWXG\
Epidemiol

:2/)((/ '$9,6 7 *8<',6+ - '(/8&&+, . / 0RUWDOLW\ ULVN DVVR
DQG DOFRKRO XVH HPHULQJ DOLIRUQLD

&+,2'2 / 0 %$,/(< % $ 62.2/ 5 - -$1,66(- '(/$1(< %/$&. 9 HW
VSRQWDQHRXV DERUWLRQ LQ PLG SUHJQDQF\ Alcohol SDWWHUQV RI SU

/, 4),6+(5 : : 3(1* & = :,//,$06 $ ' %85' /)HWDO DOFRKRO
D SRSXODWLRQ EDVHG VWXG\ RI SUHDGWHUP Maternal Child Health J

%25'(5 & $ 0 (IHLWRV GR iOFRRO QD JHVWDQWH QR IHWR H QR
Sociedade de Pediatria de Sªo Paulo

/((6 + 6+,1 6 - :21 6 ' .,0 (- HW DO $OFRKRO 8VH GXULQ
)DFWRUV LQ .RUHD PsychiatryInvestig

2•/($5< & 0 (%2:(5 & *XLGHOLQHV IRU SUHJQDQF\ ZKDW•V DQ
HYLGHQFH ÀQDOO\ Drug Alcohol Rev J XS" SS

9,(,5$ Metabolismo do etanol >WHVH@ 3RUWXJDO 3RUWR 8QLYHUVLGL
)DFXOGDGH GH &LrQFLDV GD6D~GH

&267$ + 3) $o}HV GR iOFRRO VREUH R IHWR ,Q 6(*5(& $ 0 (
feto e no UHFpP QDVFLGR HS Sociedade de Pediatria de Sªo Paulo

%52&$5'2 3 6 *,/ 02+$3(/ - &+5,67,(% 5 7KH UROH RI R[LGDWI
VSHFWUXP Braz Res Rev

1,(0(/b 2 1,(0(/b 6 5,79$1(1 $ *,66/(5 0 %/2,*8 $ HW DO $VVD
JOXWDP\O WUDQVIHUDVH DQG FDUERK\GUDWH GHÀFLHQW WUDQVIHU
WKH GHWHFWLRQ RI SUHGLFWRUV Alcohol Clin Exp Res

-21(6 0 : %$66 : 7 Fetal alcoholsyndrome 1HRQDWDO 1HWV

/—3(= 0 % /,&+7(1%(5*(5 $ &21'(. &5(0217(0 3URSULHGDGHV
LQVWUXPHQWRV GH WULDJHP GH FRQVXPR GH Revista Brasileira de
Obstet

)/2<' 5 / 62%(// 0 9(/$648(= 0 0 ,1*(562// . 1(77/(0$1 0 62%(
DO 3UHYHQWLQJ $OFRKRO ([SRVHG 3UHJQDQFLHV $ 5DQGRPL]HG &

+$1621 - ' 3285,(5 6 7KH 2JODOD 6LRX[WULEH &+2,&(6 SURJUD
DOFRKRO H[SRVHG SUHJQDQF\LQWHUYHQWLRQ IRU XVH LQ DQ $PHU
Public Health

+$1621 - ' ,1*(562// . 3285,(5 6 'HYHORSPHQW DQG LPSOHPHQ
to reduce drinking, improve contraception, and prevent alcohol-exposed pregnancies in American Indian
ZRPHQ J Subst Abuse Treat

6(*5(& $ 0 (IHLWRV GR iOFRRO QD JHVWDQWH QR IHWR H QR re
SUHYHQomR H G Sociedade de Pediatria de Sªo Paulo

CAP´TULO 6

ASPECTOS RELACIONADOS ÀPSOR´ASE E SUAS POSS´VEIS IMPLICA˙ÕES NA GRAVIDEZ

Afonso Pedro Guimarães Pinheiro
AcadŒmico do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do AmapÆ (UNIFAP)

Emilly Gabriele Prata de Abreu
AcadŒmica do Curso de Enfermagem da 8QLYHUVLGDGH)HGHUDO GR $PDSi 81,)$3 VoluntÆria do Programa de Educação Tutorial - PET Enfermagem UNIFAP

Naeli Gomes Correa
AcadŒmica do Curso de CiŒncias Biológicas da Universidade Federal do AmapÆ (UNIFAP)

Tatiana do Socorro dos Santos Calandrini
8QLYHUVLGDGH)HGHUDO GR $PDSi 81,)$3 Docente de Enfermagem e Mestre em CiŒncias da Saœde
MacapÆ - AmapÆ

Camila Rodrigues Barbosa Nemer
Docente de enfermagem da Universidade Federal do AmapÆ (UNIFAP) e Doutoranda em Saœde Pœblica pela Escola Nacional de Saœde Pœblica SØrgio Arouca (ENSP/FIOCRUZ)
MacapÆ - AmapÆ, Brasil

Giovanni Paulo Ventura Costa
Presidente do ComitŒ Local de Acompanhamento e Avaliação dos Programas de Educação Tutorial (CLAAPET) da Universidade Federal do AmapÆ
MacapÆ - AmapÆ, Brasil

Vencelau Jackson da Conceicao Pantoja
Enfermeiro da SuperintendŒncia de Vigilância em Saœde do AmapÆ e Especialista em Gestão de Sistemas e Serviços de Saœde e Sexualidade humana
MacapÆ - AmapÆ, Brasil

Rubens Alex de Oliveira Menezes
Tutor do Programa de Educação Tutorial - PET Enfermagem da Universidade Federal do $PDSi 81,)$3 'RFHQWH GR &XUVR GH Graduação em CiŒncias da Saœde da UNIFAP

RESUMO: Introdução: A gravidez Ø um período em que mudanças expressivas ocorrem no corpo da mulher e a vitalidade da mesma Ø de suma LPSRUWkQFLD SDUD TXH QmR QR GHFRUUHU GD JHVWDomR V associada a vÆrias comorbidades e fatores de ULVFR TXH SRGHP VHU SUHMX Objetivo $ ÀQDOLGDGH GHVWH HV os aspectos alusivos a psoríase e quais suas provÆveis implicações na JUDYLGH]. Metodologia : 7UDWD VH GH XPD UHYLVmR ELE na qual foram usados os descritores Gravidez e Psoríase, nos seguintes bancos de dados BVS H 3XE0HG. Resultados e discussão: Após as buscas nas bases de dados foram selecionados 6 artigos, para a seção de resultados e GLVFXVV&RQVLGHUDo}HV ÀQDLV autores concordam que as mulheres psoriÆticas eram mais propensas a terem complicações na JUDYLGH] TXH DV QmR SV contrapartida, outros alegam que a psoríase na gestação nÃo causa piores resultados no decorrer GD PHVPD (VWXGRV HVWmR VH

VH REWHU FRQFOXV}HV GHÀQLWLYDV H JDUDQWLU j PXOKHU
PALAVRAS-CHAVE: Psoríase; *UDYLGH] $UWULWH 3VRULiWLFD ,PSOLFD

ABSTRACT: Introduction 3UHJQDQF\ LV D SHULRG LQ ZKLFK H[SUHV
ZRPDQ•V ERG\ DQG KHU YLWDOLW\ LV RI SDUDPRXQW LPSRU
GXULQJ SUHJQDQF\ 3VRULDVLV KDV EHHQ OLQNHG WR VHYH
EH KDUPIXO WR Objective: The purpose of this study is to identify aspects related to
SVRULDVLV DQG ZKDW LWV OLNHOLKRRG Methodology: This is an integrative
OLWHUDWXUH UHYLHZ LQ ZKLFK WKH GHVFULSWRUV 3UHJQD
GDWDEDVHV %9 DQG 3XE0HG Results and Discussion: After searching the databases, 6
DUWLFOHV ZHUH VHOHFWHG IRU WKH Final Considerations: Some
DXWKRUV DJUHH WKDW SVRULDWLF ZRPHQ ZHUH PRUH OLNH
WKDQ QRQ SVRULDWLF RQHV 2Q WKH RWKHU KDQG RWKHUV
FDXVH ZRUVH RXWFRPHV GXULQJ SUHJQDQF\ 6WXGLHV DUH
FRQFOXVLRQV DQG JXDUDQWHH WKH ZRPDQ D VPRRWK SUHJ
KEYWORDS: 3VRULDVLV 3UHJQDQF\ 3VRULDWLF $UWKULWLV ,P

INTRODU˙ˆO

Durante a gestação numerosas alterações ocorrem na mulher, desde aquelas
FRQVLGHUDGDV ÀVLROyJLFDV, como o peso da gestação, até as condiciona o
FRPSRUWDPHQWR GH PXLWDV GRHQoDV LPXQROyJLFDV HQ
No que se refere as auto-imunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerodermia, a
GHUPDWRSROLPLRVLWH H RV SrQÀJRV H D SRUÀULD FXWkQH
Adicionamente a psoríase em placas pode melhorar, entretanto uma modalidade de psoríase
pustulosa grave, o impetigo herpetiforme, Ø característico da gestação (CARNEIRO;
$ = 8 / $ < $ % 8 / $) , $

$V PRGLÀFDo}HV FXWkQHDV ÀVLROyJLFDV GHFRUUHP
glandular, e de forma particular pela produção dos hormônios esteróides (progesterona
H HVWURJrQLR 2 SLFR GHVVHV KRUP{QLRV YDULD GH D
UH`HWLQGR VH QDV PDQLIHVWDo}HV FXWkQHDV $ SVRUtDV
cutânea poligênica imunomediada com placa eritematosa demarcada e com escamas
PLFiFHDV (P LQGLYtGXRV SUHGLVSRVWRV D GRHQoD SRG
fatores como medicamentos, traumas e infecções (CARNEIRO; AZULAY-ABULAFIA, 2005;
1(67/e .$3/$1

Dependendo da sÚrie, um histórico familiar positivo foi relatado por 35% a 90% dos
SDFLHQWHV FRP SVRUtDVH 6HJXQGR XP HVWXGR FRP XP
$OHPDQKD VH RV GRLV SDLV WLYHVVHP SVRUtDVH R ULV
era 41%, mas se apenas um dos pais fosse afetado, o risco era 14% (ANDRESSEN;
+(16(/(5 &RPR DIHWD SULPDULDPHQWH D HSLGHUPH
tempo a psoríase foi considerada uma doença epidÚrmica, na qual a imperfeição bioquímica

RX FHOXODU HQFRQWUDYD VH QR TXHUDWLQyFLWR $ ÀVLR
cØlulas T e suas interaçes com cØlulas dendríticas, alØm de cØlulas que participam da imunidade inata, incluindo queratinócitos (GUILHOU et al., 1976; GRIFFITHS et al.,

2V ORFDLV PDLV FRPXPHQWH DFRPHWLGRV VmR FRXU
seguidos das unhas, mªos, pØs e tronco (KERKHOF et al., 'R SRQWR GH YLVW
D SVRUtDVH SRGH DSUHVHQWDU VH FRP XPD DPSOD JDPD G
PRPHQWR YDULDQWHV GLYHUVDV SRGHP FRH[LVWLU HP X
lesıes cutâneas compartilham os mesmos traços característicos: eritema, espessamento e
HVFDPDV $SHVDU GH R WDPDQKR GD OHVmR SRGHU YDULD
mais de 20 cm de diâmetro, o contorno da lesªo Ø, em geral, circular, oval ou policíclico (KERKHOF et al.,

'XUDQWH D H[DFHUEDomR DV OHV}HV SVRULiWLFDV FR
ao redor de placas psoriÆticas existentes indicam que o paciente estÆ em uma fase instÆvel
GD GRHQoD $OpP GLVVR DV OHV}HV SVRULiWLFDV HP H[
DWLYD FRP HULWHPD PDLV LQWHQVR $V OHV}HV LQ`DPDGD
Geralmente a involuçªo de uma lesªo começa no centro, resultando em lesıes psoriÆticas anulares (KERKHOF et al.,

Nesse contexto a gravidez representa um dos fenômenos mais desconhecidos e
VHPSUH Ki D SUHRFXSDomR VREUH R TXH SRGH DFRQWHFH
p YiOLGR SDUD WRGRV RV SURÀVVLRQDLV HQYROYLGRV QR
HP UHODomR j PmH TXDQWR DR IHWR +(<0$11 $GHPD
ciclosporina e tratamentos biológicos direcionados às principais cØlulas efetoras da
LPXQLGDGH LQDWD H FLWRFLQDV SURSRUFLRQDP PHOKRU

$GLFLRQDOPHQWH DV DOWHUDo}HV GHUPDWROyJLFDV
PLQLPL]DP R GHVFRQIRUWR VHQWLGR SHODV PXOKHUHV $V
VLJQLÀFDWLYDV H FRPSURPHWHU D GLPHQVmR ELROyJLFD
Norteado por tais discussıes, esta pesquisa buscou encontrar na literatura estudos que versem sobre os aspectos relacionados à patologia da psoríase e suas possíveis implicaçes na JUDYLGH]

MÉTODOLOGIA

2 HVWXGR WUDWD VH GH XPD UHYLVmR ELEOLRJUiÀFD
literatura atual conhecimentos relacionados ao tema proposto, sendo a revisªo integrativa um mØtodo de investigaçªo que permite a procura, a avaliaçªo clínica e a síntese das evidŒncias disponíveis sobre um tema investigado de maneira sistemÆtica, ordenada e abrangente, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado e dando suporte a PrÆtica Baseada em EvidŒncias (PBE), em desenvolvimento nªo sóna

enfermagem como em outras Æreas relacionadas àsaœde (SOUSA et al., 2017; FERENHOF;)(51$1'(6

Para a seleçªo desses estudos foram utilizados os descritores: *UDYLGH] H 3VRUt $V SHVTXLVDV IRUDP UHDOL]DGDV QRV VHJXLQWHV EDQFRV de inclusªo foram: artigos disponíveis na íntegra e gratuita, publicada no período de 2009 a 2019, estudos de coorte e estudos de caso e controle com o intuito de obter dados SULPiULRV)RUDP HVWDEHOHFLGRV FRPR FULWpULRV GH íntegra, com assunto nªo condizente a temÆtica proposta e com data de publicaçªo fora do SHUtRGR HVWDEHOHFLGR

A partir da busca feita nas bases de dados BVS e PubMed com os descritores e DSyV D DSOLFDomR GRV ÀOWURV FKHJRX VH DR UHVXOWDG LQWHJUDOPHQWH RX SDUFLDOPHQWH R WHPD SURSRVWR $ qual se chegou aos estudos utilizados nesta pesquisa, que deve ser observada da seguinte forma: por meio dos descritores foram realizadas buscas nos bancos de dados, utilizando-se dos critØrios de inclusªo e exclusªo estabelecidos, como resultado foram selecionados DUWLJRV VHQGR SURYHQLHQWHV GR EDQFR GH GDGRV

RESULTADO E DISCUSS´O

$SyV D VHOHomR GRV DUWLJRV IRUDP UHDOL]DGDV quais fora montado o quadro 1, que apresenta uma síntese dos trabalhos selecionados, YLVXDOL]DGR RV VHJXLQWH WySLFRV DXWRUHV WtWXOR H FRQFOXVmR 3DUD IDFLOLWDU R GHVHQYROYLPHQWR

abordagens que surgiram após a leitura dos textos, que sªo: 1) resultados da gravidez; U L V F R G D H [S R V L omR DR W U D W D P H Q W R U L V F R G H P D estªo no centro da discussªo sobre a psoríase e gravidez e sªo de suma importância para a investigaçªo do tema com vistas a melhorar a qualidade do atendimento prestado à J H V W D Q W H

AUTOR	T˝TULO/ ANO DE PUBLICA˙ˆO	OBJETIVO	METODOLOGIA	CONCLUSˆO
% $ 1 ' 2 / , * JOHNSON, ' / - 2 1 (6 . / HW DO	3 R W H Q W L D O \ D G Y H U V H risk factors for adverse pregnancy R X W F R P H V L Q ZLWK SVRULDVLV	Determinar se a Psoríase apresenta um nœmero excessivo de fatores de risco que provoquem adversidades durante a J U D Y L G H]	Estudo de coorte S U R V S H F W L Y R	Mulheres grÆvidas com psoríase podem ter maior risco de apresentar resultados adversos na gravidez devido a comorbidades ou outros comportamentos de saœde associados à G R H Q oD 2 T X H G H Y levado em consideraçªo durante o tratamento clínico de mulheres com S V R U tD V H HP L G D G
CARMAN, : H Q G \ - ACCORTT, 1 H L O $ ANTHONY 0 D U \ 6 H W Q D P P D W R U \ R U S V R U L D V L V ZLWK RXW H W D Q H U F H S W H XVH	Pregnancy and infant outcomes including P D M R U F R Q J H Q L W D O malformations among Z R P H Q Z L W K L Q ZLWK RXW H W D Q H U F H S W H XVH	Estimar a prevalŒncia de complicaçıes durante a gravidez e infância, incluindo malformaçıes congŒnitas entre mulheres com psoríase, com ou sem o uso de (Q W D Q H U F H S W H	(V W X G R G H F R R U W H Q W L À F R X Q R Y D V preocupaçıes de segurança associadas ao uso de etanercept durante a J U D Y L G H] Entretanto o etanercept, M X Q W D P H Q W H F R P outros TNFis, permanece um tratamento sem ensaios clínicos bem controlados em mulheres J U i Y L G D V	Este estudo L G H Q W L À F R X Q R Y D V
CLOWSE, 0 H J D Q (% FELDMAN 6 W H Y H Q 5 ISAACS, - R K Q ' H W D O	Pregnancy outcomes in the tofacitinib safety databases for rheumatoid arthritis D Q G S V R U L D V L V	Relatar os resultados de gravidez com D U W U L W H L Q ` D P D W y U L D ou psoríase em tratamento utilizando tofacitinibe e suas possíveis complicaçıes, L G H Q W L À F D G R V	Ensaio clínico U D Q G R P L] D G D	Os resultados da gravidez relatados neste pequeno nœmero de pacientes com Artrite Reumatóide / psoríase parecem semelhantes aos observados na populaçªo em geral e em pacientes tratadas com terapias biológicas para G R H Q oD V L Q ` D P D W y no entanto, nªo Ø possível tirar conclusıes G H À Q L W L Y D V
LIMA, ; L Q D L G D 7 JANAKIRAMAN, Vanitha; HUGHES, 0 L F K D H O ' D O	The impact of psoriasis on S U H J Q D Q F \ R X W F R P H V	Avaliar se as gestantes com psoríase apresentam maior risco de desenvolver complicaçıes durante a J U D Y L G H]	Estudo de coorte U H W U R V S H F W L Y R	Este estudo mostrou maiores chances de composiçªo de mal resultado (POC) em S D F L H Q W H V F R P S V

POLACHE K, Ari; SHLOMI, Inbal Polachek; SPITZER, . DUHQ HW	Outcome of SUHJQDQF\ LQ ZLWK SVRULDWLF arthritis compared to healthy	([DPLQDU D LQFLGrQFLD GH resultados adversos em resultados de gravidez, além de avaliar as pacientes durante a gravidez e QR DQR SyV SDUWR	Estudo de caso e FRQWUROH	Pacientes com artrite psoriática não têm mais infertilidade ou piores resultados de gravidez em comparação com controles saudáveis
5(0$(86 . STEPHANS 621 2 JOHANSS ON, . HW DO	Maternal and infant pregnancy outcomes LQ ZRPHQ ZLWK psoriatic arthritis: a 6ZHGLVK QDWLRQZLGH FRKRUW VWXG\	Descrever os resultados da gravidez materna e infantil entre mulheres com artrite psoriática em comparação com mulheres sem artrite SVRULiWLFD	(VWXGR GH FRKRUW	No presente estudo encontraram-se riscos aumentados de parto prematuro e cesariana em comparação com gestações sem Artrite SVRULiWLFD

Resultados na gravidez

A gravidez UHSUHVHQWD XP PRGLÀFDo}HV SDUD D PXO WRGRV RV VLVWHPDV GR RUJDQLVPR VmR DIHWDGRV LQFO decorre de alterações mecânicas e/ou hormonais, caracterizando por grandes elevações de estrogênio, progesterona, beta-HCG, prolactina e uma variedade de hormônios e mediadores que alteram completamente as funções do organismo (CARNEIRO; AZULAY-$%8/$),$ +(<0$11

$OpP GDV DOWHUDo}HV ÀVLROyJLFDV SUySULDV GD JUD GHFRUUHQWHV GD ÀVLRSDWRORJLD GD SVRULtDVH SURYRT SHUtRGR JUDYtGLFR Retardo HJXQGRP/LOPKDHUHV FRP SVRULtDVH SR chances de composição de mal resultado na gravidez do TXH SDFLHQWHV VHP SVI autor ressalta ainda a importância de novos estudos na área, dada a importância biológica da associação entre gravidez e psoríase, em vista dessas possíveis consequências Ø QHFHVViULR YHULÀFDU RV ULVFRV TXH HVWD DSUHVHQWD S

Conforme Bandoli et al DSHVDU GD HVFDVVH] GH GDGRV da gravidez em mulheres com psoríase, existem comorbidades associadas à psoríase, como: obesidade, tabagismo e depressão, as quais aumentam o risco de resultados QHJDWLYRV DR QDVFLPHQWR 6HX HVWXGR PRVWURX TXH maior probabilidade de estar acima do peso (P < 0,0001), de fumar (P < 0,0001) e de ter XP GLDJQyVWLFR GH GHSUHVVmR 3

$GHPDLV D DÀUPDomR TXH PXOKHUHV JUiYLGDV FRP SV a resultados adversos na gravidez devido a comorbidades ou comportamentos de risco associados àdoença, deve ser levado em consideração no acompanhamento de mulheres FRP SVRULtDVH HP LGDGH IpUWLO QR LQWXLWR GH PRGLÀF atendimento integral a essa mulher, dando segmento em seu tratamento clínico (BANDOLI

et al 3RLV D LGHQWLÀFDomR H FODVVLÀFDomR GH ULV
DFHVVR FRP TXDOLGDGH DR VLVWHPD GH VD~GH H UHGX]LU

Risco da exposiçªo ao tratamento

Dentro da relaçªo entre psoríase e gravidez, deve-se levar em conta tambØm a questªo do tratamento para a patologia, que pode infuenciar no ciclo gestacional em YLUWXGH GD XWLOL]DomR GH IDUPDFRV H VXEVWDQFLDV T et al QmR HYLGHQFLRX HP VHX HVWXGR IDWRUHV TX quanto a utilizaçªo do Etanercept no tratamento clínico da psoríase durante a gravidez, QmR REVHUYDQGR SUHYDOrQFLD VLJQLÀFDWLYD SDUD RV U com a patologia expostas ao medicamento, nªo expostas ao medicamento e grupo da populaçªo em geral, mas ressalta a escassez de ensaios clínicos bem controlados em PXOKHUHV JUiYLGDV SDUD YHULÀFDU DV LPSOLFDo}HV GR

Outros estudos tambØm buscaram investigar sobre os riscos dos tratamentos da psoríase para os resultados da gravidez, FRPR WUDWDU et al &ORZVH TXH EXVFRX UH os resultados dos casos de gravidez LGHQWLÀFDGRV D SDUWLU GH HQVDLR GH 7RIDFLWLQLEH SDUD SVRUtDVH R TXDO QmR LGHQWLÀ intencional ao medicamento e riscos aumentados de resultados adversos para o feto e o SURFHVVR JHVWDFLRQDO VH FRPSDUDGR D SRSXODomR JH

Risco de malformaçes fetais

Alguns autores tambØm se dedicaram a buscar resultados para a relaçªo entre psoríase e gravidez, QR VHQWLGR GH EXVFDU LQGLFLRV TXH DSRQW R IHWR 5 et al HP VHX HVWXGR FKHJRX D FRQFOXVmR psoriÆtica possuem risco aumentado para parto prØ-termo e cesariana se comparadas às PXOKHUHV VHP D SDWRORJLD

Em contrapartida, Polachek et al., HP VHX WUDEDOKR FRP R investigar se a fertilidade e o resultado da gravidez em mulheres com artrite psoriÆtica sªo GLIHUHQWHV GRV FRQWUROHV VDXGiYHLV DÀUPD TXH SDFL mais LQIHUWLOLGDGH RX UHVXOWDGRV DGYHUVRV VH FRPSD indica a necessidade de novos estudos mais precisos relacionados ao tema, para que DVVLP SRVVDP VHU IHLWDV LQIHUHQFLDV TXH HPEDVHP D S

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por ser associada a diversas comorbidades, a psoríase comumente Ø correlacionada D XP IDWRU ULVFR Entretanto, constata-se uma divergência de opiniões acerca GD LQÀXrQFLD GD SVRUtDVH QD RFRUUrQFLD GH DGYHUVL alguns autores apontam que a patologia pode causar aborto espontâneo e parto prematuro,

HQTXDQWR RXWURV DSRQWDP TXH HOD QmR LQ`XHQFLD QD
j JHVWDomR $OpP GLVVR QmR VH HQFRQWUDUDP HVWXGR
QR WUDWDPHQWR GD SVRUtDVH SDUD D JUDYLGH] Evidencia-se
na gestaçªo sªo escassas e hÆ necessidade da realizaçªo de novos estudos referentes à
PHVPD SDUD FRQVWDWDomR GH VXD LQ`XrQFLD VREUH R FL

REFER˚NCIAS

$1'5(66(1 & +(16(/(5 7 ,QKHULWDQFH RI SVRULDVLV $QDO\VLV RI
Medline 'LVSRQtYHO HP KWWSV ZZZ QFEL QOP QLK JRY SXEPHG

%$1'2/, * HW DO 3RWHQWLDOO\ PRGLÀDEOH ULVN IDFWRUV IRU DG
ZLWK SVRULDVLV Y 'HSDUWDPHQWR GH ,QYHVWLJDomR %UiV &OtQLFDV H C
Journal Of Dermatology 'LVSRQtYHO HP KWWSV RQOLQHOLEUDU\ ZLOH
M [! $FHVVR HP QRY

&$50$1 :HQG\ - HW DO 3UHJQDQF\ DQG LQIDQW RXWFRPHV LQFOXG
DPRQJ ZRPHQ ZLWK FKURQLF LQ`DPPDWRU\ DUWKULWLV .RU SVRULDV
I Centro de Observaçªo e Pesquisa $PJHQ 0LFKLJDQ

&$51(,52 6 & 6 $=8/$< $%8/$),$ / 3HOH QD *HVWDomR 5HY %UDV
PDL MXQ

&/2:6(0HJDQ (% HW DO 3UHJQDQF\ RXWFRPHV LQ WKH WRIDFLWL
DUWKULWLV DQGDSVRULDVLV Segurança de Medicamentos 6SULQJHU
'LVSRQtYHO HP KWWSV ZZZ QFEL QOP QLK JRY SPF DUWLFOHV 30

)(5(1+2) +HOLR $LVHQEHUJ)(51$1'(6 5REHUWR)DELDQR 'HVPLVWL
FRPR EDVH SDUD UHGDomR FLHQWtÀFD 0pWRGR 66) Revista Acb: Biblioteconom
)ORULDQySROLV Y S DJR

*8,/+28 - - HW DO ,PPXQRORJLFDO DVSHFWV RI 3VRULDVLV 'LVR
'HSHQGHQW OBritish Journal of Dermatology ,QJODWHUUD S MDQ

*5,))7+6 & (HW DO &OHDUHQFH RI SVRULBritish Medical Journal Z GRVH F\
,QJODWHUUD S VHW

+(<0$11 :5 'HUPDWRVHV RI SUHJQDQF\ XSGDWH - $P $FDG 'HUPDWR

.(5.+2) 3HWHU &P YDQ GH HW DO Dermatologia. 5LR GH -DQHLUR (OVHYL

/,0$;LQDLGD 7 HW DO 7KH LPSDFW RI SVRULDVLV Journal RQ SUHJQDQF\ F
Investigative Dermatology (OVHYLHU 0DVVDFKXVHWWV

1(67/e)UDQN 2 .$3/$1 'DQLHO + 3VRULDVLV The New EnglaWorld Journal of Med
MXO

32/$&+(. $UL HW DO 2XWFRPH RI SUHJQDQF\ LQ ZRPHQ ZLWK SVRUL
controls. Y Departamento de Dermatologia Clíica 6SULQJHU 'LVSRQtYHO HP
OLQN VSULQJHU FRP DUWLFOH)V FLWHDV! $FHVV

5(0$(86 . HW DO 0DWHUQDO DQG LQIDQW SUHJQDQF\ RXWFRPHV L
6ZHGLVK QDWLRQZLGH FRKRUW VWXG\ I Departamento de Medicina, Instit
'LVSRQtYHO HP KWWSV REJ\Q RQOLQHLEUDU\ ZLOH\ FRP GR
UHIHUHU ZRO VKRZBFKHFNRXW WUDFNLQJBDFWLRQ SUHYLHZBFOL

6286$ /XtV 0DQXHO 0RWD GH HW DO $ PHWRGRORJLD GH UHYLVmR
Investigação em Enfermagem S QRY

CAP´´TULO 7

ASSIST˚NCIA DE ENFERMAGEM EM MULHERES COM DEPRESSˆO PÓS-PARTO DPP: UMA REVISˆO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Data de submissªo: 07/11/2021

Silvana Nunes Figueiredo
Mestre de Enfermagem pela UFAM
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Clemilene Maia de Souza
Universidade Paulista-UNIP
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Leslie Bezerra Monteiro
Mestre em Enfermagem
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Fabiane Araœejo de Azevedo da Cunha
Universidade Paulista-UNIP
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Andreia Silvana Silva Costa
Mestrado em Saœde Pœblica
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Jhenniffer Thelka Rodrigues Vilhena
Universidade Paulista-UNIP
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Camila Soares Santos
Mestre em Enfermagem
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Keila Maria da Silva e Silva
Universidade Paulista-UNIP
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Kesley Aparecida da Silva e Silva
Universidade Paulista-UNIP
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Loren Rebeca Anselmo
Mestre em Doenças Tropicais e Infecciosas
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Monike Emyline Andrade Rodrigues
Especialista em UTI Neonatal e PediÆtrica
Manaus, AM
K W W S O D W W H V F Q S T E U

RESUMO: A Depressªo Pós-Parto, tambØm conhecida pela abreviaªo DPP Ø um distœrbio psíquico depressivo caracterizado pela presença de humor deprimido ou pela perda de interesse e prazer por quase todas as atividades do F R W L G L D Q R D G H Q R Q L D V H Q Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais como uma circunstância que surge nas quatro primeiras semanas após o parto, D I H W D Q G R G L Y H U V D V P R Objetivo: 5 H F R Q K H F H U D L P S R U W k Q F L D enfermagem mediante aos cuidados de mulheres com ' H S U H V V mR 3 y V 3 D U W R Metodolo se de um estudo do tipo revisªo integrativa da literatura, descritiva, onde foi pesquisado S H U L y G L F R V S X E O L F D o } H V G H indexados nas bases de dados online: Scielo,

0HGOLQH H /LODF•V XWLOL]DQGR SDODYUDV FKDYH H HVS
Resultados: busca empregada para a pesquisa resultou na seleçªo de 20 artigos
FLHQWtÀFRV TXH HPEDVDUDP D UHYLVmR LQWHJUDWLYD
resultados encontrados, entendeu-se a DPP Ø patologia psíquica de grande relevância e
que acomete diversas mulheres no mundo no período conhecido como puerpØrio, sendo
FODVVLÀFDGD SHOR ’60 H &,’ FRPR XPD PDQLIHVWDomR FO
VHPDQDV DWp DQR DSyV R SDUWR 3RVVXL WUDWDPHQWR
DSURYDGR H UHIRUPXODGR SDUD XP PHOKRU FXVWR 3UR
LPSRUWDQWH SDSHO QRV FXLGDGRV Conclusão: destinados a FRP
QHFHVVLGDGH GH GHVHQYROYHU XP WUDEDOKR GH UHYLVm
a ’HSUHVVmR 3yV 3DUWR VXD FODVVLÀFDomR TXDQWR DRV V
WUDWDPHQWR H SULQFLSDOPHQWH R SDSHO GR SURÀVVLRQ
GH SDFLHQWHV SXpUSHUDV FRP ’33
PALAVRAS-CHAVE: Depressªo Pós-Parto, PuerpØrio, $VVLVWrQFLD GH HQIHUPDJ

NURSING CARE FOR WOMEN WITH POSTPARTUM DEPRESSION - PPD: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

ABSTRACT: 3RVWSDUWXP GHSUHVVLRQ DOVR NQRZQ E\ LWV DE
depressive disorder characterized by the presence of depressed mood or the loss of interest
DQG SOHDVXUH LQ DOPRVW DOO GDLO\ DFWLYLWLHV DGHQ
6WDWLVWLFDO 0DQXDO RI ’LVRUGHUV 0HQWDO DV D FLUFXPV
FKLOGELUWK WKDW DIIHFWV VRPH: Objective: To recognize the importance
RI WKH QXUVLQJ SURIHVVLRQDO WKURXJK WKH FDUH RI
Methodology: 7KLV LV D GHVFULSWLYH LQWHJUDWLYH OLWHUDW
SXEOLFDWLRQV LQGH[HG LQ RQOLQH GDWDEDVHV ZHUH VHD
NH\ZRUGV DQG WLPHOLQH: Results: Search used for the research resulted
LQ WKH VHOHFWLRQ RI VFLHQWLÀF DUWLFOHV ZKLFK VXS
UHYLHZ %DVHG RQ WKH UHVXOWV IRXQG 33’ LV XQGHUV
SDWKRORJ\ WKDW DIIHFWV VHYHUDO ZRPHQ LQ WKH ZRUOG
EHLQJ FODVVLÀHG E\ WKH ’60 DQG &,’ DV D FOLQLFDO PDQ
ZHHNV XS WO \HDU DIWHU GHOLYHU\ ,W KDV HIIHFWLYH
WR EH DSSURYHG DQG UHIRUPXODWHG IRU D EHWWHU FRVW
UROH LQ WKH FDUH RI Conclusão: SDWLHQWV ZLWK 33’ RQVWUDWHG WKH
D OLWHUDWXUH UHYLHZ WKDW FRXOG FKDUDFWHUL]H 3RVWS
subtypes of disorders, diagnosis, treatment and, mainly, the role of the nursing professional
WKURXJK WKH FDUH RI SXHUSHUDO SDWLHQWV ZLWK 33’
KEYWORDS: 3RVWSDUWXP ’HSUHVVLRQ 3XHUSHULXP 7UHDWPHQ

1 | INTRODUˆO

A gravidez Ø uma fase muito delicada e importante na vida de uma mulher que
VHPSUH GHVHMRX VHU PmH $ JHVWDomR TXDQGR p DOPHMD
se um presente concretizado, todavia quando este processo nªo Ø, devidamente idealizado

DFDED VH WRUQDQGR DOJR IUXVWUDQWH JHUDQGR GLYHUV
D SUySULD YLGD GD PmH H GH VHX EHEr 0$1(17(HW DO

O processo da gestaçªo nªo Ø simplesmente um ciclo vital que representa a identidade de uma mulher que venha a se tornar mªe, mas sim envolve vÆrios aspectos, FRPR ELROyJLFRV SVLFROyJLFRV ItVLFRV H VRFLRHFRQ{ na fase do puerpØrio que pode ocorrer àmanifestaçªo de um transtorno designado como 'HSUHVVmR 3yV 3DUWR † '33 (/2,6(HW DO

O puerpØrio Ø um estÆgio pós-gestacional, onde se necessita de uma importante recuperaçªo devido ao esgotamento físico causado pela própria gravidez e, principalmente, SHOR SDUWR e QHVWH PRPHQWR TXH D PmH ÀFD YXOQHUiY AlØm da DPP, existe tambØm o Baby Blues, as psicoses puerperais e o Distœrbio de Pânico Pós- Parto que podem agravar mais ainda a saœde de muitas mªes recentes (TEIXEIRA HW DO

A Depressªo Pós-Parto Ø uma doença caracterizada como um grande problema de saœde mental em mulheres que acabaram de se tornar mªes, sendo manifestada após as SULPHLUDV VHLV VHPDQDV RX PHVHV DSyV R QDVFLPHQW YDULD GH D QR SDtV 0(,5$ HW DO

Esta doença psicológica pode apresentar sintomas, como: diminuiçªo do apetite e da libido, diminuiçªo do nível de funcionamento mental, presença de ideias obsessivas e supervalorizadas, sentimento de culpa, impaciŒncia e pensamentos recorrentes em PDFKXFDU R SUySULR ÀOKR GHVkQLPR SHUVLVWHQWHV PH HQWUH RXWURV VLQWRPDV 7(,;(,5$ HW DO

O estudo da depressªo da mulher na fase do puerpØrio pressupıe a compreensªo e D GHÀQLomR GD LQWHQVLGDGH GRV VLQWRPDV KXPRUDLV D do bebŒ e que podem variar desde a melancolia da maternidade (baby blues) atØ as psicoses puerperais, passando pela depressªo pós-parto, propriamente dita (ALIANE et DO

A melancolia da maternidade, tambØm denominada de tristeza pós-parto por caracteriza-se por um distœrbio de labilidade transitória de humor, que atinge cerca de 50% das novas mªes entre o terceiro e o quinto dia após o parto, tendo, geralmente, remissªo HVSRQWkQHD 0XLWDV PmHV H[SHULPHQWDP XP HVWDGR QH melancolia, disforia, choros frequentes, ansiedade, irritabilidade e dependŒncia (CORR˚A 6(55$/+$

A ocorrŒncia da DPP nos primeiros meses de vida do bebŒ pode estar associada D XPD VpULH GH GLÀFXOGDGHV UHODFLRQDLV QD GtDGH H QR GHVHQYROYLPHQWR HPRFLRQDO VRFLDO H FRJQLWLYR GH IRUPD LQGLUHWD HPERUD D PmH VHMD D PDLV DFRPH

1HVWH WUDEDOKR GH UHYLVmR LQWHJUDWLYD GD OL

UHFRQKHFHU D LPSRUWkQFLD GR SDSHO GR SURÀVVLRQDO
de mulheres com ' H SUHVVmR 3yV 3DUWR FXMRV REMHWLYRV HVSH
GD OLWHUDWXUD FLHQWtÀFD D '33 GHVFUHYHU RV SULQFI
SDSHO GR SURÀVVLRQDO GH HQIHUPDJHP QD DVVLVWrQFLD

2 | OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

$ QDOLVDU R TXH D OLWHUDWXUD FLHQWtÀFD DERUGD V
mulheres com diagnóstico de Depressªo Pós-Parto;

2.2 2EMHWLYRV HVSHFtÀFRV

& DUDFWHUL]DU DWUDYpV GD OLWHUDWXUD FLHQWtÀFD
Descrever os principais tipos de tratamentos;
' HVWDFDU R SDSHO GR SURÀVVLRQDO GH HQIHUPDJHP Q

3 | METODOLOGIA

3.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo do tipo revisªo integrativa da literatura em artigos indexados
QDV EDVHV GH GDGRV RQOLQH 6FLHOR PHGOLQH H /LOD
WHPSRUDO FRPSUHHQGLGRV GH D
$ SURGXomR GHVWH WLSR GH UHYLVmR p HODERUDGD H
do tema e seleçªo da questªo de pesquisa, 2) estabelecimento dos critØrios de inclusªo
H H[FOXVmR LGHQWLÀFDomR H DQiOLVH GRV HVWXGRV S
estudos selecionados, 5) anÆlise e interpretaçªo dos resultados e 6) apresentaçªo da
UHYLVmR VtQWHVH GR FRQKHFLPHQWR

3.2 $UWLJRV &LHQWtÀFRV

2 SUHVHQWH HVWXGR EDVHRX VH HP GDGRV H UHIHUrQ
atualizados provindos das principais bases de dados referŒncia em trabalhos acadŒmicos,
RV TXDLV VmR 6FLHOR PHGOLQH H /LODF•V $R WRGR IR
DUWLJRV H VHOHFLRQDGRV SDUD R HVWXGR

3.3 CritØrios de Inclusªo

Baseou-se em pesquisas de artigos de revisªo integrativa da literatura e artigos originais referentes ao tema deste trabalho; as temÆticas incluídas foram: Depressªo Pós-Parto (DPP), baby blues, tristeza materna, psicose materna, aspectos epidemiológicos, FODVVLÀFDomR GD '33 GHSUHVVmR WUDQVWRUQR GH DQ

mundo e no Brasil, diagnóstico, Escala de Depressªo Pós-parto de Edimburgo (EPDS), WHUDSrXWLFD DWHQomR EiVLFD

3.4 CritØrios de Exclusªo

Para aquisiçªo de resultados mais primordiais de acordo com a pesquisa realizada, H[FOXLX VH GR HVWXGR RV DUWLJRV TXH QmR JXDUGDYDP LQWHJUDWLYD TXH HVWDYDP IRUD GR SHUtRGR GHOLPLWD explicitamente a relevância da DVVLVWrQFLD GH HQIHUPDJHP GXUDQW DFRPSDQKDPHQWR GD PXOKHU FRP '33

3.5 AnÆlise dos Resultados

Após a execuçªo das pesquisas realizou-se diversas leituras minuciosas referentes ao tema principal do trabalho, leituras analíticas e detalhadas para uma melhor aceitaçªo dos artigos na construçªo do Trabalho de Conclusªo de Curso (TCC), o que proporcionou melhor compreensªo a respeito da importância da assistŒncia de enfermagem a mulher com 'HSUHVVmR 3yV 3DUWR

4 | RESULTADOS

A partir da busca pelas palavras chaves: Depressªo Pós-Parto, PuerpØrio, AssistŒncia GH HQIHUPDJHP H ÀOWURV $ UHJLmR QRUGHVWH IRL PDLV DUWLJRV UHODFLRQDGRV DR WHPD SURSRVWR

)RUDP HQFRQWUDGRV MXQWR D EDVHV GH GDGRV XP V HP SRUWXJXrV H LQJOrV Mi ÀOWUDQGR QRV XOWLPDV GH DUWLJRV $ SDUWLU GD OHLWXUD IRUDP UHFXSHUD

Após a leitura dos títulos e resumos foram selecionados 14 artigos para elaboraçªo GHVWD UHYLVmR WDEHOD

Em relaçªo ao ano de publicaçªo dos artigos, compreendidos entre 2011 a 2021, observou-se maiores prevalŒncias nos anos de 2021 correspondendo a 3 artigos (22%) e 3 artigos (22%) do ano de 2018, 2 artigos (14%) do ano de 2020, 2 artigos (14%) do ano de 2016, 1 artigos (7%) do ano de 2017, 1 artigos (7%) do ano 2015, 1 artigo no ano de 2014 H D U W L J R G R D Q R

De modo a organizar os artigos de forma cronológica o seguinte quadro abaixo foi H O D E R U D G R S R Q W X D Q G R D E D V H G H G D G R V W t W X O R D X W

Capítulo 7

5 | DISCUSSˆO

5.1 Caracterizaçªo da Depressªo Pós-Parto

6HJXQGR 6$OOL, ,ID\DQWL · D ’33 SRGH VHU GH
ou psíquico que acomete diversas mulheres no mundo, ocorrendo após o parto, período
conhecido como ou puerpØrio, que de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de
7UDQVWRUQRV 0HQWDLV ’60 H D &ODVVLÀFDomR ,QWHUQ
de manifestaçªo deste transtorno ocorre nos primeiros seis meses após o aparto, embora
RXWURV HVWXGRV FLHQWtÀFRV UHODWHP SHUtRGRV GLVWL
’H DFRUGR FRP $OPHLGD $UUDLV ·(VWXGRV FR
deste distœrbio Ø alta e real necessitando de medidas urgentes que possam ameninar
o sofrimento de muitas mulheres, principalmente, pacientes despreparadas para o
puerpØrio, aceitaçªo das responsabilidades de mªe, com renda baixa, menos favorecidas,
desamparadas na maioria das vezes pelo próprio parceiro ou familiares, sendo necessÆria
XPD UHDELOLWDomR SVLFROyJLFD H VRFLRHFRQ{PLFD HP C
A Escala de ’HSUHVVmR 3yV 3DUWR SURMHWDGD SRU &R[HW
avaliaçªo dos sintomas depressivos no SXHUSpULR $ HVFDOD FRQWpP L

sintomas relacionados àdepressªo nos œltimos sete dias, com pontuaçªo de zero a trŒs em FDGD LWHP H YDULDomR GH]HUR D QD SRQWXDomR ÀQDO

(P HVFDOD PXQGLDO SHVTXLVDV GH EDVH SRSXODFLR indivíduos que vivem em dez países em quatro continentes registraram prevalŒncia de GHSUHVVmR 3yV SDUWR DR ORQJR GD YLGD YDULDQGR GH

1R WHUULWyULR EUDVLOHLUR D SUHYDOrQFLD DSUR[Essa grande variaçªo provavelmente se deve às diferenças nas tØcnicas de avaliaçªo e nos pontos de corte adotados, no momento da avaliaçªo, bem como nas características FXOWXUDLV H VRFLDLV GDV SRSXODo}HV HVWXGDGDV SULQ GLVSDULGDGHV HFRQ{PLFDV H VRFLDLV REVHUYDGDV QDV U

WOICE Ø um instrumento da atualidade que Ø destinado a dar voz a condiçes QHJOLJHQFLDGDV QR DWHQGLPHQWR GH URWLQD :2,&(UH PHGLU D PRUELGDGH PDWHUQD QmR JUDYH SHUPLWLQGR

uma compreensªo mais ampla das mulheres alØm das doenças clínicas e assim podendo trabalhar mais na soluçªo dos problemas do SXHUSpULR /$086 HW DO

As taxas de prevalŒncia da depressªo durante a gravidez encontrada nos estudos de países em desenvolvimento, incluindo os trabalhos nacionais, estiveram, em sua maioria, SRU YROWD GH ('(0%85*2

5.2 Tipos de Tratamento

8P HVWXGR UHDOL]DGR SRU 0FNHOYH\ 6SHOLQ terapŒuticas farmacológicas para a DPP continuam sendo medicamentos antidepressivos, PHGLFDPHQWRV HVWHV TXH WDPEpP VmR XWLOL]DGRV SI DGXOWDV (VVHV IiUPDFRV HQJOREDP ,QLELGRUHV GD 5H DQWLGHSUHVVLYRV DWtSLFRV QR WUDWDPHQWR GD GHSUH efeito destes fÆrmacos ainda Ø desconhecido em longo prazo no organismo dos lactentes, HPERUD VHMDP FRQVLGHUDGRV VHJXURV

5HFHQWHPHQWH HP FRQIRUPLGDGH FRP 0RUULVRQ HW FRQVLGHUDGR HÀFD] QR WUDWDPHQWR GD 'HSUHVVmR 3yV pela Food and Drug Administration (FDA), sendo sua aplicaçªo por via intravenosa, o nome do IiUPDFR p =XOUHVVR EUH[DQRORQD (VWH PHGLFDPHQW QD YLVmR GD FRPXQLGDGH FLHQWtÀFD

'H DFRUGR FRP 0RUULVRQ HW DO ·(VWD PHGLF avanço na classe de medicamentos no tratamento de Depressªo Pós Parto, todavia seu custo Ø muito elevado e nªo alcançaria qualquer tipo de paciente, em virtude do seu valor

5.3 $ LPSRUWkQFLD GR SURÀVVLRQDO GH HQIHUPDJHP com DPP

Com relaçªo à Depressªo Pós Parto Ø bem nítido, e dentre as atribuiçes do

enfermeiro que se encontram na lei 1498/86, que vem a dizer sobre a assistŒncia de enfermagem a gestante, parturiente e puØrpera, o que nªo se sabe Ø se realmente isso vem a ser realizado na prÆtica, mas nªo existe uma política pœblica direcionada diretamente FRP D 'HSUHVVmR 3yV 3DUWR 6DQWRV HW DO .

(P FRQFRUGkQFLD FRP 6LOYD ·2 SURÀVVLRQDO LPSRUWDQWH SDSHO QR FXLGDGR FRP D SDFLHQWH DFRI SURÀVVLRQDO WHFQLFDPHQWH FDSDFLWDGR H HVSHFLDOL sua funçªo inicia-se desde a admissªo na unidade de saœde podendo se estender após a DOWD KRVSLWDODUµ

*XHGHV HW DO SRU LVVR SRXFR SHVTXLVDGDV &RQWXGR PRVWUDP VH GH LGHQWLÀFDomR LPSRUWDQWH DFRPHWHP DV SXpUSHUDV $ SUHYDOrQFLD GH GHSUHVVmR O enfermeiro possui uma funçªo muito importante, atuando no prØ-natal, prevenindo contra a DPP, por meio de açes e intervençes, prestando cuidados e proporcionando apoio necessÆrio a cada gestante e IDPtOLDµ 'XUDQWH HVVH SHUtRGR D JHV VHQGR SUHSDUDGD ÀVLFDPHQWH H SVLFRORJLFDPHQWH S SRVLWLYRV QR PRPHQWR GR SDUWR H QD DPDPHQWDomR S

3URÀVVLRQDLV GD iUHD GH HQIHUPDJHP HPERUD WHQK '33 SRGHP HQIUHQWDU DOJXPDV GLÀFXOGDGHV QR PRPHQ pode ser gerada devido às diversas tarefas que podem surgir, como os cuidados com bebŒ, D UHFXSHUDomR ItVLFD GD PmH H DWp HQWUHWHQLPHQWR TXH R SURÀVVLRQDO VDLED WRPDU PHGLGDV SDUD VH SUHF

Medidas de educaçªo preventiva momentos antes da alta hospitalar necessitam ser reavaliada, pois as prÆticas atuais de ensino de alta hospitalar podem representar uma distraçªo e desfoco das atividades que necessitam ser priorizadas e tambØm podem UHSUHVHQWDU XPD EDUUHLUD SDUD VD~GH SVLFROyJLFD G

Os cuidados de enfermagem nªo devem ser voltados somente àsaœde do binômio mªe-bebŒ, mas àsaœde integral da mulher, como tambØm a atençªo deve ser direcionada DRV VHXV IDPLOLDUHV SDUD TXH HVWHV VHMDP FDSD]HV WUDQVWRUQR H VLQDOL]DU SDUD D HTXLSH GH VD~GH)UH

6 | CONCLUSˆO

$ '33 SRGH VHU GHÀQLGD FRPR GLVW~UELR PHQWDO RX mulheres no mundo, ocorrendo após o parto, período conhecido como puerpØrio, que de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) e a &ODVVLÀFDomR ,QWHUQDFLRQDO GH 'RHQoDV &,' R SHUtR RFRUUH QRV SULPHLURV VHLV PHVHV DSyV R DSDUWR HPE SHUtRGRV GLVWLQWRV

(VWLPD VH TXH DWp R DQR GH HVVH WUDQVWRUQR
QD YLGD GH PXLWDV PmHV DIHWDQGR FHUFD GH D
realizados pela OMS indicam que a prevalŒncia de DPP ocorre, principalmente, em países
HP SURFHVVR GH GHVHQYROYLPHQWR UHYHODQGR XPD WD[
Sªo aplicados diferentes mØtodos terapŒuticos podendo ser farmacológicos e
nªo farmacológicos, isto Ø, utilizando-se de tØcnicas de psicologia, fÆrmacos ou ainda
D FRPELQDomR GH DPERV 8P QRYR PHGLFDPHQWR FRQVL
Depressªo Pós-parto foi aprovado nos Estados Unidos pela Food and Drug Administration
(FDA), sendo sua aplicaçªo por via intravenosa, o nome do IiUPDFR p =XOUHVVR EUH
(VWH PHGLFDPHQWR DSUHVHQWD UHVXOWDGRV VDWLVIDWyU
2 SURÀVVLRQDO GH HQIHUPDJHP WHFQLFDPHQWH FDSDF
com paciente enfermo, sua funçªo inicia-se desde admissªo na unidade de saœde podendo
VH HVWHQGHU VH HVWHQGHU D DOWD KRVSLWDODU $WXDO
por meio de açes e intervençes, prestando cuidado e proporcionando apoio necessÆrio
D FDGD JHVWDQWH H IDPLOLDU e LPSRUWDQWH UHVVDOW
surge como o papel fundamental de orientaçªo e acompanhamento no preparo físico,
PHQWDO H EHP HVWDU

REFERˆNCIAS

$/,$1(3 3 0$0('(0 9)857$'2 ( ) revisªo sistemÆtica sobre fatores de risco associados àdepressªo pós-parto †

$/0(,'$ 1 0 ' & 55,6 $ ' 5 o prØ-natal psicológico como programa de SUHYHQomR j depressªo pós-parto. SVLFRORJLD F,L36QFLD H† SURÀWWmSV GRL RUJ WHP

$9,//$ - & '(*,8*/,$1, & 0(,5($ /(5,$ % &/É8',$ $ 0$57,16 associaçªo entre satisfaçªo materna com a amamentaçªo e sintomas de depressªo pós-parto. †

BOTELHO LLR, CUNHA CCA, MACEDO M. the integrative review metgod in organizational studies. gestªo e sociedade

%5,72 & 1 2 $/9(6 6 9 /8'(0,5 $ % '(5Ô2 7 9 % dep entre mulheres com gravidez nªo pretendida. artigooriginal, KWWSV GRL RUJ V

&255¨$) 3 6(55$/+$ & $ a GHSUHVVmR SyV SDUWR H D ÀJX retrospectiva e contextual. acta colombiana de psicologia , 18 † KWWSV GRL RUJ DFS

(',0%85*2 ('(depressªo entre puØrperas : prevalŒncia e fatores associados postpartum depression : prevalence and associated factors depresión entre puØrperas:

prevalencia y factores asociados † KWWSV GRL RUJ [

(/2,6(6 5)(55(,5$ $ $ /,0$ 5) ' 6). GHSUHVVmR SyV SD
sinais, sintomas e fatores associados em maternidade de referŒncia em manaus artigo, 10(3),
† KWWSV GRL RUJ [Y Q

)5(,7$6 '5 9,(,5$ %'* $/9(6 9+ (7 $/ Alojamento conjunto em um hospital
universitÆrio: depressªo pós-parto na perspectiva do enfermeiro - UHV IXQGDP FDUH RQOL
DEU MXQ KWWSV '2, Y Q S

)216(&$ 9 5 - 5 0 6,/9$ * $ '$ 277$ (relaçªo entre depressªo pós-p
e disponibilidade emocional materna. cadernos de saœde pœblica, 26 † KWWSV GRL
RUJ V [

*8('(6 $ & (.$0, & 7 &$9$//, / . '(9 1,&2/$28 6 . +(66 9 %
& 3). depressªo pós-parto: incidŒncia e fatores de risco associados. rev. med. (são paulo),
90 † KWWS ZZZ UHYLVWDV XVS EU UHYLVWDGF DUWLFOH YL

/$086 0 1 3$%21 6 032&$ & *8,'$ - 3 3$53,1(//, 0 $
SDUWR GDU jV PXOKHUHV ZRS LUFH YQR rQyVL S DU HRRUELGDGH PDWHUQD
alto risco usando o instrumento ZKR ZRLFH †

0(,5$ % '(0 3(5(,5$ '(36 6,/9(,5$ 0 '( ) $ *8$/'$ ' 0 5 6$17
+ 3 2 GHVDÀRV SDUD SURÀVVLRQDLV GD DWHQomR SULPiULD QR I
depressªo pós-parto. texto e contexto enfermagem, 24 † KWWSV GRL RUJ
0707201500049-14

0$1(17(0 9 3,$=(17,1 2 0 52'5,*8(6 maternidade e trabalho:
associaçªo entre depressªo pós-parto, apoio social e satisfaçªo conjugal. pensando famílias,
20 †

0&.(/9(< 0 0 (63(/,1 - logo secundÆrio logotipo do jornal depressªo pós-
parto alØm do baby blues . †

0255,621 . (&2/($ % 7+203621 6 0 %$/(7 / brexanolone
tratamento de pacientes com depressªo pós- parto resumo fundo. 55 †

2/,9(,5$ $ 0 '($/9(6 7 5 '(0 $=(9('2 $ 2 '(&9/&$17(5 '
$=(9('2 ' 0 '(FRQKHFLPHQWR GH SURÀVVLRQDLV fam GD HVWUDWpJ
sobre depressªo pós-parto ou.

6$//, ' ,)$<$17, W baby blues screening on post-partum mother by comparing epds
and phq-9 methods for health-care service and public applications in lubuk buaya community
health care padang city, indonesia malaysian journal of medical research, 2 † KWWSV GR
RUJ PMPU Y L

6,/9$ ' & depressªo pós-parto: o papel do enfermeiro durante o prØ-natal artigo de
revisªo, 7 †

6,/9(,5$ 0 6 *85*(/ 5 4 %$55(72 Ì ' '(& 75,1'$'(/ 0 ')
GHSUHVVmR SyV SDUWR HP PXOKHUHV TXH VREUHYLYHUDP j PRUELG
saœde coletiva, 26 † KWWSV GRL RUJ [

7(,;(,5$ 0 * &59/+2 & 0 6 '(0$*$/+fi(6 - 0 9(5$6 - 0 '(0
) & 0 -$&2%,1$ 3 .) detecçªo precoce da depressªo pós-parto na atençªo
bÆsica. 11(2), 0

CAPÍTULO 8

AÇÕES DE ENFERMAGEM PARA AMENIZAR OS RISCOS DE DESENVOLVIMENTO DA RETINOPATIA DA PREMATURIDADE

Data de submissão: 29/12/2021

Jessica Priscilla da Silva Anselmo
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Belém - Pará
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

Adriele do Socorro Santos Brabo
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Belém - Pará
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

Domingas Teixeira de Carvalho Neta
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Belém - Pará
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

Camila Brito de Almeida
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Belém - Pará
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

Maria de Nazaré da Silva Cruz
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

Fernando Conceição de Lima
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Belém - Pará
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

Vitória Regina Silva Teixeira
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Belém - Pará
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

Aline Santos Brabo
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Belém - Pará
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

Rodrigo Silva Gomes
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Belém - Pará
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

Isabelle Souza Machado
Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Belém - Pará
http://lattes.cnpq.br/1234567890123456

RESUMO: Objetivo de enfermagem para amenizar os riscos de desenvolvimento de retinopatia da prematuridade. Metodologia realizada com enfermeiros neonatologistas em um Hospital Público de Belém do Pará, onde ocorreu a elaboração de três categorias, a primeira sobre a compreensão do conhecimento acerca da retinopatia da prematuridade, fatores de risco e exames que diagnosticam a doença, a segunda quais as intervenções realizadas para minimizar o desenvolvimento da doença e a terceira sobre as orientações dadas aos pais. Resultados os enfermeiros neonatologistas possuem conhecimento vago à respeito do conceito e evolução da doença, porém reconhecem os fatores de risco e exames que diagnosticam a doença. Notou-se que há carência nas orientações dadas aos pais e realizam ações preventivas

FRQGL]HQWHV FRP DV HVSHUDGDV H HQFRQWUDGDV QD OLV
FDSDFLWDomR GRV SURÀVVLRQDLV
PALAVRAS-CHAVE: Retinopatia da Prematuridade; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Cuidados de Enfermagem; 1HRQDWRORJLD

NURSING ACTIONS TO MITIGATE THE RISKS OF DEVELOPING RETINOPATHY OF PREMATURITY

ABSTRACT: 2EMHFWLYH WR NQRZ QXUVLQJ DFWLRQV WR PLWLJD
RI SUHPDWXULW\ 0HWKRGRORJ\ 'HVFULSWLYH UHVHDUFK ZL
ZDV SHUIRUPHG ZLWK QHRQDWRORJLVW QXUVHV DW D 3XEO
ZDV WKH HODERUDWLRQ RI WKUHH FDWHJRULHV WKH ÀUV
DERXW UHWLQRSDWK\ RI SUHPDWXULW\ ULVN IDFWRUV DQ
LGHQWLI\LQJ WKH JXLGHOLQHV SURYLGHG E\ SURIHVVLRQD
LQWHUYHQWLRQV ZHUH FDUULHG RXW WR PLQLPL]H DQG RU
)LQDO FRQVLGHUDWLRQV LW ZDV SRVVLEOH WR LQIHU WKDV
DERXW WKH FRQFHSW DQG HYROXWLRQ RI WKH GLVHDVH EX
GLDJQRVWLF H[DPLQDWLRQ ,W ZDV QRWHG WKDW WKHUH LV
WKH\ FDUU\ RXW SUHYHQWLYH DFWLRQV FRQVLVWHQW ZLWK
7KHUH LV D QHHG IRU WUDLQLQJ RI SURIHVVLRQDOV
KEYWORDS: Retinopathy of Prematurity; Intensive Care Units, Neonatal; Nursing Care; 1HRQDWRORJ\

1 | INTRODU˙ˆO

A retinopatia da prematuridade (ROP) Ø uma enfermidade vaso proliferativa secundÆria à vascularizaçªo inadequada da retina imatura, contendo mœltiplas causas e associa-se ao baixo peso ao nascer, menor idade gestacional e uso prolongado de R[LJHQRWHUDSLD SURQXQFLD VH HP GXDV IDVHV D DJXGD 628=$

A patologia em questªo Ø a segunda maior responsÆvel pela cegueira infantil, SDVVtYHO GH SUHYHQomR (VWLPD VH TXH H[LVWDP QR PXQ GHVWDV FHUFD GH HVWmR QD $PpULFD /DWLQD Ministørio da Saœde (MS), nªo existem nœmeros exatos de crianças afetadas, mas supıe-VH TXH DQXDOPHQWH SUHPDWXURV DSUHVHQWHP D IR RFRUUD HQWUH D QRYDV FULDQoDV FHJDV SHOD U H WUDWDPHQWR SUHFRFHV)257(6)/+2 HW DO 6$172 $ 523 SRGH VHU GHWHFWDGD SUHFRFHPHQWH SRU PH (TRV) ou teste do olhinho que Ø um dos exames diagnósticos pertencente à triagem neonatal como tentativa de reduzir a morbi-mortalidade, indicado nos primeiros dias de vida GR QHRQDWR 6$1726 %$+,$ H 0,5$1'$ =$121, HW DO

A assistŒncia de enfermagem aos recØm-natos hospitalizados em Unidade de

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) vai além do preparo para realização do exame de detecção da ROP, esta envolve a oferta de um cuidado humanizado proporcionando um ambiente tranquilo e adequado para recuperação do UHFpP QDVFLGR 51 $OpP GLVVR RV SURÀVLRQDLV GH à adequada instalação, manutenção e vigilância dos sistemas de suporte de oxigênio ao paciente, realizar proteção ocular, ações de controle de infecção, entre outras intervenções que quando efetivadas irão minimizar os riscos de desenvolvimento da patologia em TXHVWmR H RXWUDV SRVVtYHLV FRPSOLFDo}HV TXH R 51 H ambiente hospitalar &$5'262 /Ô&,2 H $*8,$5

Estudos que demonstrem a importância de o enfermeiro ter conhecimento sobre a doença, suas formas de prevenção, tratamento e ações que diminuam o surgimento da patologia em questão são necessários, visto que o mesmo está diretamente ligado ao SURFHVVR GH FXLGDU GR QHRQDWR $OpP GLVVR QRo}HV pertinentes a assistência preventiva de complicações a saúde, sendo necessário realizar HGXFDomR SHUPDQHQWH DRV SURÀVLRQDLV REMHWLYDQGR GR 51 KRVSLWDOL]DGR

(VWH HVWXGR WHYH R REMHWLYR GH FRQKHFHU DV Do os riscos de desenvolvimento da retinopatia da prematuridade em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Unidades de Cuidados Intermediários no hospital de referência em obstetrícia e neonatologia, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Belém, Pará, %UDVLO

2 | METODOLOGIA

7UDWD VH GH XPD SHVTXLVD GR WLSR GHVFULWLYD FR TXDOLWDWLYD WHP HQIRTXH QD DQiOLVH GRV GDGRV EXVF FRQVLGHUDomR D UHDOLGDGH GR REMHWR GH HVWXGR %D os seus aspectos, procurando explicar suas origens, relações e mudanças, e tentando GHGX]LU DV FRQVHTXrQFLDV MXQWDPHQWH FRP HVWD D SHVTXLVD GHVFULWLYD XPD YH] TXH WHP D ÀQDOLGDGH G IHQ{PHQR HVWDEHOHFHQGR D UHODomR HQWUH DV YDULiYH com exatidão as peculiaridades de uma circunstância relacionando os eventos (OLVEIRA,

A pesquisa foi desenvolvida na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará (FSCMPA), referência em Obstetrícia e Neonatologia, tendo como campo as UTIN H DV 8&, 3DUWLFLSDUDP GR HVWXGR HQIHUPHLURV HVSH FDPSRV VXSUDFLWDGRV -i SDUD D FROHWD GH GDGRV IH] seguindo um instrumento de coleta de dados, sendo precedida pela apresentação do Termo GH &RQVHQWLPHQWR /LYUH H (VFODUHFLGR

Após as entrevistas, sucedeu-se a anÆlise dos dados baseada na tØcnica de anÆlise de conteœdo, a qual foi elaborada por Laurence Bardin, onde viabiliza a descriçªo VLVWHPiWLFD GR FRQWH~GR FRPXQLFDWLYR HP EXVFD GH

Estudo foi aprovado pelo ComitŒ de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do ParÆ e da instituiçªo coparticipante, Fundaçªo Santa Casa de Misericórdia do ParÆ, sob R SDUHFHU Q

3 | RESULTADOS

A amostra foi constituída por 19 enfermeiros, dos quais 18 eram do sexo feminino e GR VH[R PDVFXOLQR FRP IDL[D HWiULD HQWUH D DQR H QD 8&, H WLQKDP PDLV GH DQRV GH WHPSR GH VHUYL

Após a realizaçªo das entrevistas e transcriçªo dos dados, realizou-se a tabulaçªo dos mesmos, agrupando perguntas e respostas dos participantes acerca da coleta de GDGRV $SyV D DQiOLVH GDV UHVSRVWDV FXOPLQRX QD FR FDWHJRULD IRL QHFHVViULR DFUHVFHQWDU VXEFDWHJR

Categoria 1. Conhecimento dos profissionais quanto a retinopatia da prematuridade

2V UHVXOWDGRV REWLGRV SRVVLELOLWDUDP SHUFHEH conhecimento acerca das causas da patologia, porØm nªo abordavam com clareza quanto j GHÀQLomR SURSULDPHQWH GLWD H GH[DQGR RQGH elaboravam respostas YDJDV TXDQGR TXHVWLRQDGRV TXDO R VHX FRQKHFLPHQWR

AlØm disso, notou-se que os participantes compreendiam que a doença abordada causa danos como a cegueira, como se pode apreender dos discursos:

... lesªo na retina devido o uso prolongado de oxigŒnio (E1)

Deformaçªo na retina devido ao uso constante e inadequado de equipamento de luz (E9).

... devido àprópria prematuridade e o uso excessivo de oxigŒnio, risco de levar o bebŒ a cegueira (E12).

Todavia, houve respostas mais elaboradas em relaçªo à pergunta, conforme se observa nas falas:

Éuma doença vaso proliferativa secundÆria a vascularizaçªo inadequada da retina imatura (E10).

A retinopatia da prematuridade Ø uma patologia que acomete os recØm-nascidos em que se observa o crescimento desorganizado de vasos sanguíneos ocasionando possível descolamento da retina e em casos mais graves levando o RN a cegueira... (E14).

Subcategoria 1. Conhecimento dos fatores de risco

Os participantes informaram e demonstraram conhecimento em relaçªo aos fatores

de risco que predispıe os recØm-nascidos a desenvolverem a doença, como segue:

... baixo peso, prematuridade, uso prolongado em altas concentraçes de oxigŒnio (E14).

Alguns deles: tempo prolongado de ventilaçªo mecânica, uso de O2, fototerapia sem proteçªo ocular, prematuridade extrema (E16).

Subcategoria 2. Conhecimento do diagnóstico da patologia

Percebeu-se que a maioria dos participantes conhecia o exame diagnóstico UHDOL]DGR QD LQVWLWXLomR SRUpP QRPHDQGR GH GLYH dos enfermeiros soube discorrer como Ø realizado o exame, apenas citavam que era feito GLODWDomR GD SXSLOD H R PHVPR H[HFXWDGR SHOR HVSH HQIHUPHLURV DOHJDYDP QmR WHU DÀQLGDGH FRP R DVVX UHFpP QDVFLGR UHVSRQViYHO SHOD H[HFXomR GR WHVWH responder àpergunta, como se segue:

Teste do olhinho. Esse exame Ø realizado com a dilataçªo das pupilas e feito pelos oftalmologistas (E6).

Exame de fundo do olho. O exame Ø realizado pelo oftalmologista... (E13).

· 2 H[DPH DTXL D JHQWH LGHQWLÀFD FRPR 523 SRSXO do olhinho... e como Ø feito o exame nªo sei te detalhar os procedimentos, Ø feito dilataçªo da pupila, Ø feito o exame de visualizaçªo direta do globo ocular... (E18).

Constatou-se na fala de um participante a idade gestacional como fator importante para realizaçªo do exame, conforme observado na fala a seguir:

Em todos prematuros abaixo de 35 semanas Ø solicitado e realizado ROP, PDSHDPHQWR GH UHWLQD H TXDQGR GHWHFWDGR DOJXPD com oftalmologista do FSCMPA (E2).

Categoria 2. Orientaçes dos profissionais a mªe do RN durante internaçªo e alta

Percebeu-se que as orientaçes dos enfermeiros para as genitoras sªo escassas e vagas durante o tempo de internaçªo para os recØm-nascidos que apresentam os fatores de risco para progressªo da doença, como se segue:

... nªo deverÆ retirar os óculos de proteçªo (E9).

... orientamos a mªe a observa o olhar do bebe, se acompanha os movimentos. Se observa secreçªo nos olhos, algo diferente que possa chamar atençªo... (E13).

(P UHODomR jV LQVWUXo}HV SDUD P mH QR PRPHQWR que havia o repasse de informaçes, porØm de maneira sucinta, pois o posicionamento GRV SURÀVVLRQDLV TXDQWR D LVVR HUD GH DSHQDV DOHU realizar os exames e, alØm disso, salientavam que as orientaçes eram fornecidas pelo RIWDOPRORJLVWD

Categoria 3. Intervenções de enfermagem para amenizar os riscos da retinopatia da prematuridade

Inferiu-se que os enfermeiros realizam as intervenções corretas em seus setores de trabalho, devido a maioria das respostas elencarem como intervenções utilizadas a redução de luminosidade, uso do protetor ocular, controle da oferta de oxigênio e monitorização da saturação de oxigênio aos órgãos, conforme se segue:

> Cobrir isolet com pano, para evitar ou minimizar a luminosidade do ambiente... minimizar luz externa e interna da unidade. Usar proteção ocular... (E2).

> ... administração do uso de O2; controlar a SPO2 nos recém-nascidos... reduzir luminosidade principalmente para os RNs prematuros extremos... (E6).

> ... uso controlado de inalação contínua de O2. Proteção contínua quando em usa de fototerapia. Diminuição de luminosidade na ala ou na isolete (E16).

4 | DISCUSSÃO

A ROP é uma das etiologias acometendo RN prematuros, sobretudo de baixo peso, consequência de uma inadequada vascularização da retina (SANTOS, BAHIA e MIRANDA, 2015; CARDOSO, LÚCIO, AGUIAR, 2009), conceito similar ao que apareceu em duas respostas mais elaboradas, apesar de a maioria ter apenas mencionado as causas da doença sem demonstrar clareza e conhecimento sobre o que é a

Grande parte das respostas mencionou corretamente os fatores de risco para o aparecimento da doença, elencando o uso prolongado de oxigenoterapia, pacientes em ventilação mecânica por muito tempo, concentração de oxigênio superior a 40%, da ROP, sendo a prematuridade e o baixo peso ao nascer os principais fatores, existindo outras causas, sendo destas, índice de apgar menor que 7, pequeno para idade gestacional, gemelaridade, sepse, exposição a luz, meningites, dentre outras (LERMANN, FORTES FILHO e PROCIANOY,

Na literatura a designação do exame diagnóstico é triagem visual, realizada por meio do TRV, conhecido também como teste do olhinho, que possibilita o rastreamento de alterações sugestivas de leucocoria (pupila de cor branca), com auxílio de oftalmoscópio indireto (SANTOS, BAHIA e MIRANDA,

com algumas falas dos participantes, apesar de nomearem de diversas maneiras o exame

AlØm disso, a menção da idade gestacional por um enfermeiro condiz com a UHYLVmR ELEOLRJUiÀFD XWLOL]DGD QD SHVTXLVD D TXDO realizado entre a 4“ e 6“ semana de vida, antes da alta da maternidade (CAMPOS JÚNIOR, 628=$ H &267(5$12 $OpP GHVVH FULWpULR RXW adotados em todas as unidades neonatais, sªo eles: todos os RN com peso inferior ou igual D J H RX LGDGH JHVWDFLRQDO PHQRU RX LJXDO D V 6%3

Diante disso, por o hospital concentrar uma grande quantidade de RN prematuros com baixa idade gestacional e com baixo peso, isso torna essencial a execuçªo do exame diagnóstico, uma vez que eles enquadrando-se nos critØrios preconizados para a realizaçªo do teste e sªo candidatos a desenvolverem a ROP por apresentarem os principais fatores GH ULVFR GD GRHQoD

O enfermeiro Ø responsÆvel em proporcionar aos familiares informaçes acerca da patologia, quais os fatores de risco para o RN desenvolver a doença, bem como fornece RULHQWDomR H DSRLR DRV SDLV UHIHUHQWHV DR TXDGU de conforto, visto que a internaçªo do RN Ø um momento difícil e que os pais sentem GLÀFXOGDGH HP DFHLWDU &589,1(/ H 3$8/(77, '8$57(H devem reforçar no momento da alta o risco desse recØm-nascido desenvolver cegueira e a necessidade de permanecer no acompanhamento, uma vez que tratado precocemente e QR PRPHQWR RSRUWXQR LUi HYROXLU FRP ERP SURJQyVW UHDOL]DGDV RUDOPHQWH H SRU HVFULWR 628=$

Apesar de a literatura embasar as orientaçes que devem ser fornecidas aos IDPLOLDUHV SHUFHEH VH QR HVWXGR TXH QmR KDYLD FO recomendaçes feitas aos pais durante a internaçªo, bem como no momento da alta do RN, com isso Ø imprescindível o enriquecimento das informaçes repassadas aos familiares XPD YH] TXH VmR IXQGDPHQWDLV SDUD FRPSUHHQVmR GD &DEH UHVVDOWDU DLQGD D LPSRUWkQFLD TXH VHMD O RN apresentando ou nªo alteraçes oculares, Ø fundamental reavaliaçes periódicas, por SRVVXtUHP RV SULQFLSDLV IDWRUHV GH ULVFR SDUD R GHV o acompanhamento que deve ser realizado a cada uma ou duas semanas, atØ completa vascularizaçªo da retina temporal na zona III e mantido atØ pelo menos os 2 anos de vida 628=$ H &267(5$12

A promoçªo do cuidado humanizado dentro da UTI neonatal envolve a diminuiçªo de ruídos sonoros e baixa luminosidade, visto que o excesso da exposiçªo a esses fatores provoca aumento da frequŒncia cardíaca e respiratória, diminuiçªo da saturaçªo de R[LJrQLR VXVWR FKRUR GRU GHQWUH RXWURV $OpP GLV uso de mantas espessas sobre as incubadoras, falar em tom baixo sem gritar, alarmes com volumes reduzidos, incubadoras e portinholas manuseadas suavemente (ANDRADE, (/(87e5,2 H 0(/2 6$1726

Quanto àadequaçªo da luminosidade deve-se respeitar o ciclo dia/noite para que nªo ocorra privaçªo do sono, assim como ocorra ganho ponderal de peso e melhor aceitaçªo da dieta, alØm do cuidado ocular fazendo uso de protetor ocular (estando o recØm-nascido ou nªo em fototerapia) e foco luminoso individualizado evitando a luz diretamente nos olhos, uma vez que a anatomia ocular do prematuro absorve grande quantidade de luz em VXD UHWLQD $1'5$'((/(87e5,2 H 0(/2 6$1726

$ SDUWLU GLVVR FRQVWDWRX VH TXH RV SURÀVVLRQD SDUD SUHYHQomR GD 523 SRUpP XP SURÀVVLRQDO DR DÀUH HVSHFLÀFDPHQWH SDUD D SDWRORJLD GHQRWD VH TXH Ki conhecimentos em ralaçªo a ROP para intervir de forma adequada e sabendo o porque de XVDU HVVDV PHGLGDV GH PDQHLUD D HYLWDU D SURJUHVV HVWi SHUPDQHQWHPHQWH HP FRQWDWR FRP R UHFpP QDWR

2XWURVVLP DV Do}HV YROWDGDV HVSHFLÀFDPHQWH SD FRLQFLGHP FRP D ELEOLRJUDÀD UHYLVDGD TXH GHVWDFD T Mi TXH YDULDo}HV QR VHX QtYHO SRGHP DFDUUHWDU DOWH 51 SUHPDWXURV (OXFLGDGR SHORV DXWRUHV 6LOYD HW D ser assistŒncia da enfermagem a realizaçªo da adequaçªo, instalaçªo e manutençªo GR VLVWHPD H YROXPH FRUUHQWH 0RQLWRUL]DU FRQVWD saturaçªo de oxigŒnio no intuito de evitar ocorrŒncias rotineiras de hipóxia e hiperóxia, quadros que provocam a inibiçªo ou estimulaçªo excessiva de neovascularizaçªo em UHFpP QDVFLGRV SUHPDWXURV

5 | CONSIDERA˙ÕES FINAIS

A anÆlise dos dados possibilitou compreender quais sªo as intervençes necessÆrias no cuidado ao RN e que irªo proporcionar um bom prognóstico, sendo elas realizadas SRU WRGRV RV SURÀVVLRQDLV HQYROYLGRV QD SHVTXLVD no conhecimento desses enfermeiros com relaçªo ao que Ø a doença, como ocorre sua HYROXomR H GH TXH HVWmR FRP D LPSODQWDomR GDV LQW D 523 MXQWDPHQWH FRP RXWUDV FRPSOLFDo}HV TXH SRGH

Apesar de realizarem prÆticas condizentes com o esperado, foi notório que os cuidados sªo realizados apenas por caracterizarem normas institucionais, denotando uma assistŒncia tecnicista, sem se preocupar em reconhecer a real importância da necessidade GH Do}HV HVSHFtÀFDV SDUD HYLWDU R DSDUHFLPHQWR GD que apesar de trabalharem diretamente no cuidado de RN com fatores de risco e em um local de assistŒncia primÆria apenas executam o que Ø padronizado, sem atentar-se que VmR IXQGDPHQWDLV QD SUHYHQomR GH DOWHUDo}HV RFX FRQGLWLYR H ItVLFR GD FULDQoD

Constatou-se ainda que os fatores de risco para o desencadeamento da doença

e o exame diagnóstico sªo conhecidos pelos enfermeiros que prestam assistŒncia ao RN, porØm ao executarem a funçªo de orientadores, hÆ uma carŒncia nas informaçes prestadas aos pais e familiares tanto durante a internaçªo quanto no momento da alta GHVVH 51 Mi TXH RFRUUH R UHSDVVH GH RULHQWDo}HV ocorre um esclarecimento adequado das dœvidas que possam vir a existir, culminando na baixa compreensªo da importância dos cuidados e em nªo adesªo do cuidado e DFRPSDQKDPHQWR

3RU ÀP FRQFOXL VH TXH Ki QHFHVVLGDGH GH RFRUUH envolvidos no processo de cuidar dos neonatos internados, sendo imprescindível a implantaçªo de um programa de educaçªo continuada, envolvendo a orientaçªo desde a patologia e intervençes atØ a importância de fornecer informaçes concisas e claras aos IDPLOLDUHV

Consoante a isso, a elaboraçªo de um protocolo com intervençes primordiais que LUi HYLWDU RX PLQLPL]DU R DJUDYR YLVWR TXH D SUHPDV

REFERˆNCIAS

$*8,$5 $GULDQD 6RXVD &DVWUR GH 6RX]D &DUROLQD GH 6RX]D &DVWUR GH 6RX]D &DUROLQD GH 6RX]D &DVWUR GH 6RX]D &DUROLQD GH 6RX]D

'8$57(0DULDQQH 5RFKD '$ 52&+$ 6LOYDQD 5HJLQD 9/26 '$ 6,/9$ $VVLVWrQFLD DR UHFpP-QDVFLGR
HOSPITALIZADO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO.
VII Congresso Brasileiro de Enfermagem ObstØtrica e Neonatal e I Congresso Internacional de
(QIHUPDJHP 2EVWpWULFD H 1HRQDWDO %HOR +RUL]RQWH %UD

-25*((OLDQH &KDYHV 0$5&21 $QGUp 5LFDUGR &DUYDOKR 38(57$6
prematuridade no hospital da Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP 5HYLVWD &Lr1FLD (P
([WHQVm2 Y Q S

/(50$11 9LYLDQH /HY\ )257(6),/+2 -RmR %RUJHV 352&,$12< 5HQDV
retinopatia da prematuridade em recØm-nascidos de muito baixo peso -RUQDO GH 3HGLDWULD
S

2/,9(,5$ 0D[ZHOO)HUUHLUD 0HWRGRORJLD FLHQWtÀFD XP PDQXDO
em Administração 8QLYHUVLGDGH)HGHUDO GH *RLiV &DWDOmR†*2

6$1726 $ 1,'&$3 8PD ÀORVRÀD« GH DFXLGDGH HR&UHVFHU

6$1726 &DPLOD 1DVFLPHQWR %$+,$ 1DWDOL *HO &RQFHLFDR 0,5$1
prematuridade: O conhecimento de enfermeiros neonatais. Revista Enfermagem Contemporânea,
Y Q

6,/9$ 'DQLHOD 0RWD HW DO Uso de Pressªo Positiva Contínua das vias aØreas em recØm-nas
conhecimento da equipe de enfermagem 5HY 5HQH Y S

6RFLHGDGH %UDVLOHLUD GH 3HGLDWULD Protocolo de Reanimação Neonatal. Manual de Neonatologia , Q 6RFLHGDGH
%UDVLOHLUD GH 3HGLDWULD

628=$ 5RGROIR $OYHV 3DXOR 5HWLQRSDWLD GD 3UHPDWXULGDGH: incidŒncia, detecçªo e conduta
em hospital de referŒncia no Distrito Federal

=$121, &DLR $OH[DQGUH HW DO 5HDOLGDGH GD DSOLFDomR GR WH
nascidos em uma maternidade de Campo Grande-MS (QVDLRV H &LrQFLD &LrQFLDV %LR
$JUiULDV H GD 6D~GH Y Q S

=,1 $QGUHD HW DO Proposta de diretrizes brasileiras do exame e tratamento de retinopatia da
prematuridade (ROP). $UTXLYRV %UDVLOHLURV GH 2IWDOPRORJLD Y S

CAP´TULO 9

ESTUDO SOBRE A FREQU°NCIA DE PEDICULOSE EM CRIAN˙AS DE UM CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA CIDADE REGIONAL ESTRUTURAL, DISTRITO FEDERAL, BRASIL

Eleuza Rodrigues Machado
CiŒncias Biológicas,Biomedicina, Enfermagem e FarmÆcia - Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

GardŒnia Barbosa de Sousa
Enfermagem- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Stenia Tarte Pereira Canuto
Enfermagem- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Vania Freitas de Aquino
Enfermagem- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Raianna Rosa Campos
Biomedicina- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Breno Piovezana Rinco
Enfermagem- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Gabriela Cristina Souza Virginio
Enfermagem- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

-RVHOLWD %UDQGmR G
Biomedicina- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Larissa Leite Barbosa
FarmÆcia- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Giovanna Masson Conde Lemos Caramaschi
CiŒncias Biológicas e FarmÆcia- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Rafael da Silva Affonso
FarmÆcia- Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

RESUMO: Pediculose Ø causada por Pediculus humanus capitis, conhecido como piolho-da-FDEHoD (VVH SDWyJHQR p FRPX idade escolar, podendo causar nelas problemas físicos, psicológicos e GpÀFLW GH DSUHQ Esses fatos foram os motivos para a realizaçªo GHVVD SHVTXLVD 9HULÀFDU D IUH de P. humanus capitis em crianças escolares de um Centro Educacional de Ensino Fundamental GD FLGDGH 5HJLRQDO (VWUXWX Material e MØtodos: Foi usado para detecçªo da presença de piolhos: exame físico, usando lupa para cataçªo, avaliando cinco regiıes da cabeça: frontal, parietal, occipital e temporais, e observando a presença de piolhos adultos H OrQGHDV RYRV DGHULGDV cataçªo realizaram uma palestra para todos

os docentes e alunos sobre pediculose, abordando o diagnostico do ectoparasitismo, os
VLQWRPDV LQGX]LGRV SHORV SLROKRV D SUHVHQoD RX DXVrQFLD GH SRV
No ano de 2014, a escola possuía 1030 crianças devidamente matriculadas e distribuídas
HQWUH R DR DQR GR (QVLQR)XQGDPHQWDO ’HVVH WRW
FRP LGDGHV HQWUH D ! VHQGR PHQLQDV H P
crianças portadoras de pediculose por faixa etÆria e gŒnero foram: na faixa etÆria de 6 a 8
anos, examinaram 114 meninas e 71 meninos; nas idades entre 8 a 10 anos avaliara 130
PHQLQDV R TXH IRL VLJQLÀFDWLYDPHQWH PDLRU HP UHODo
As crianças com idade entre 10 a 12 anos foram positivos 96 garotas e 46 garotos (p <
(PDLRUHV GH DQRV R Q~PHUR GH PHQLQDV LQIHV
QRV PHQLQRV IRUDP GLDJQRVWLFDGRV FRP SHGLFXORVH HP UHODomR DRV
DQDOLVDGRV (VVHV UHVXOWDGRV HQFRQWUDP-VH HP FRQVRQkQFLD FRP RV HVWXGRV
FLGDGH 5HJLRQDO (VWUXWXUDO ’) $VVLP D SHGLFXORVH GHYH VHU
ministrada para essas crianças, pois a pediculose pode causar espoliação delas, gerando
SUHMXt]RV ItVLFRV SVtTXLFRV H PRUDO HQWUH HVVHV LQGL
PALAVRAS-CHAVE: Pediculus humanus capitis, crianças escolares, ’ pÀFLW GH DSUHQGL]D
WUDXPDV SVLFROyJLFRV H ItVLFRV

ABSTRACT: Pediculosis is caused by Pediculus humanus capitis QRZQ DV KHDG
This pathogen is common in school-age children and can cause physical and psychological
SUREOHPV DQG OHDUQLQJ GLVDELOLWLHV 7KHVH IDFWV ZHU
Objective: To verify the frequency of P. humanus capitis in schoolchildren at an Educational
&HQWHU IRU (OHPHQWDU\ (GXFDWLRQ LQ WKH 0DWHUQDO DQG 5HJLR
Methods: ,W ZDV XVHG WR GHWHFW WKH SUHVHQFH RI OLFH SKV
JODVV IRU JURRPLQJ HYDOXDWLQJ ÀYH UHJLRQV RI WKH KHD
DQG REVHUYLQJ WKH SUHVHQFH RI DGXOW OLFH DQG QLWV
they held a lecture for all teachers and students on pediculosis, addressing the diagnosis of
HFWRSDUDVLWLVP V\PSWRPV LQGXFHG E\ OLFH SUHYHQWL
Results: ,Q WKH VFKRRO KDG FKLOGUHQ SURSHUO\ HQU
VW DQG WK JUDGH RI (OHPHQWDU\ 6FKRRO 2I WKLV WRWD
SDUWLFLSDWHG LQ WKH VWXG\ JLUOV DQG ER\V 7KH
E\ DJH JURXS DQG JHQGHU ZHUH DJHG WR \HDUV H[DPL
EHWZHHQ DQG \HDUV LW HYDOXDWHG JLUOV ZKLFK Z
S &KLOGUHQ DJHG WR \HDUV ZHUH SRVLWLYH
DQG RYHU \HDUV WKH QXPEHU RI LQIHVWHG JLUOV ZHUH
ZLWK FRQVLGHUDEOH Conclusions: 3HGLFXORVLV ZDV KLJK LQ WKH DQDO\]HG
VKRZ WKDW SHGLFXORVLV LV HQGHPLF DPRQJ VWXGHQWV LQ
a measure of guidance on pediculosis should be given to these children, as pediculosis can
cause dispossession of them, causing physical, psychological and moral damage among
WKHVH LQGLYLGXDOV
KEYWORDS: Pediculus humanus capitis 6FKRROFKLOGUHQ /HDUQLQJ GHÀFL
SK\VLFDO WUDXPD

1 | INTRODUˆ^O

Pediculose Ø causada pelo ectoparasito hematófago, Pediculus humanus capitis, SRSXODUPHQWH FRQKHFLGR FRPR SLROKR GD FDEHoD 2 FL KRPHP SULQFLSDOPHQWH HP FULDQoDV HP LGDGH HVFROD uma preocupaçªo para saœde pœblica, pois alØm dos desconfortos gerados no hospedeiro, pode nas lesıes causadas pelas mordidas, ser porta de entrada para bactØrias e fungos, causando diversas doenças de origem secundÆrias (SANTOS, 2009; GABANI, 2010; 181(6 HW DO &2$7(6 HW DO

2V SLROKRV VREUHYLYHP DOLPHQWDQGR VH GH VDQJ Existem duas espØcies de piolhos, sendo uma delas subespØcie que frequenta somente a cabeça do ser humano, conhecida como P. humanus capitis 3& $ RXWUD HVSpFLH na Europa e menos encontrada no Brasil, o P. humanus corporis (PH), que habita a cabeça H GHPDLV SDUWHV GR FRUSR $1'5$'(HW DO &59/+

1RV SLROKRV R GLPRUÀVPR VHP[XDO P. humanus capitis macho e fêmea P DFKR GH PP VHQGR PHQRU TXH D IrPHD TXH PHGH FHUFD GH mais importante da infestaçªo, pois pode viver atØ 30 dias após a fertilizaçªo e pıe cerca de 8-10 ovos por dia, totalizando de 50-300 ovos durante a vida (PINTO; VARGAS, 2007; &$03/, &$59$/+2 HW DO

2V SLROKRV QmR VmR FRQKHFLGRV SRU WUDQVPLWLU conhecidos, pelos incômodos que causam como: perda do sono devido ao intenso prurido GR FRXUR FDEHOXGR (VVH VLQWRPD RFRUUH GHYLGR D SHOD VDOLYD TXDQWR SHOR PDWHULDO IHFDO GR SLROK as escoriaçges, e nesses casos pode ter como consequŒncia a ocorrŒncia de infecçes secundÆrias, causadas por bactØrias, fungos e em casos mais graves miíases, que Ø uma afecçªo causada pela presença de larvas de moscas em órgªos e/ou tecidos do homem ou GH RXWURV DQLPDLV 6$1726 9$+$%, HW DO),*8

A transmissªo da pediculose nªo estÆ associada à local de aglomeraçes onde hÆ indivíduos infestados, porØm, existe a transmissªo direta que resulta a partir de uma FDEHoD SDUD RXWUD TXDQGR HOHV HVWmR HP FRQWDWR GH XVDU ERQpV WLDUDV GH WHFLGRV SHQWHV H HVFRYL tem aumentado o nœmero de transmissªo devido a populaçªo ter perdido o velho hÆbito GH ROKDU D FDEHoD GDV FULDQoDV H GD FDWDomR H SHQ FRPXQV H HÀFD]HV $1'5$'(HW DO &$03/, &$59$/

A pediculose atinge crianças em idade escolar de todas as classes sociais, nªo somente os pobres, ignorantes ou aquelas crianças que vivem em condiçes insalubres FRPR PXLWRV DLQGD SHQVDP (VVD GRHQoD SDUDVLWiUL ItVLFRV H SVLFROyJLFRV HVSHFLDOPHQWH HP HVFRODUHV

A infestaçªo tambØm pode afetar a concentraçªo do estudante e consequentemente LQ`XHQFLDU QHJDWLYDPHQWH QD TXDOLGDGH GH DSUHQGL HW DO

No Brasil, a pediculose Ø endŒmica e atinge cerca de 30% das crianças em idade HVFRODU tQGLFH DOWR SRLV p PXLWR VLPSOHV D HOLPL de combate àpediculose, utilizada pela populaçªo, sªo os tratamentos químicos com o uso de pediculicidas, que sªo facilmente encontrados nas farmÆcias ou fornecidos pelos postos de saœde, alØm da Ivermectina que Ø um vermífugo, que tambØm tem açªo anti-piolhos 081,5$7+,1$0 HW DO (VVH WUDWDPHQWR HQWUHWDQ a sua utilizaçªo de forma errada, pois a utilizaçªo de dosagens baixas Ø o principal fator TXH OHYD DR DSDUHFLPHQWR GD UHVLVWrQFLD GR SLROK WUDWDPHQWRV TXtPLFRV QRV GLDV DWXDLV VHULD R XVR

Outras formas de controles sªo a desinfestaçªo mecânica e/ou química para evitar disseminaçªo, mas lavar a roupa de vestir, de cama e banho com Ægua quente ou lavar QRUPDO H SDVVDU R IHUUR TXHQWH UHVROYH D LQIHVWDo

Assim, devido àimportância desses patógenos ectoparasitos para o homem, e alta frequŒncia deles na populaçªo, foram as motivaçes para a realizaçªo dessa pesquisa com R REMHWLYR GH YHULÀFDU(PhuluHuT xapDiF enDcrianHasSscRlaOreV um Centro Educacional de Ensino Fundamental da cidade Regional da Estrutural, Distrito)HGHUDO QR DQR GH

2 | METODOLOGIA

2.1 Tipo e Local da pesquisa

Foi um estudo de campo, quantitativo e transversal, realizado em um Centro (GXFDFLRQDO GH (QVLQR)XQGDPHQWDO QD FLGDGH 5HJLF

Entraram no estudo 826 escolares de ambos os gŒneros e com idades entre seis a PDLRUHV GH DQRV GHYLGDPHQWH PDWULFXODGRV QD L

2.2 Diagnostico da pediculose

A detecçªo da presença de piolhos foi realizada usando exame físico, com o uso OXSD SDUD FDWDomR)RUDP DYDOLDGDV FLQFR UHJL}HV temporais (Figura 1), e observado a presença de piolhos adultos e lŒndeas (ovos) aderidas QRV FDEHORV $SyV FDWDomR IRL UHDOL]DGR XPD SDOHV respectiva escola, abordando o tema pediculose e enfatizando o diagnostico, os sintomas LQGX]LGRV SHORV HFWRSDUDVLWRV D SUHYHQomR H HQVL SHGLFXORVH

2.3 CritØrio para inclusªo e exclusªo da criança no estudo

Participaram do estudo as crianças que estavam devidamente matriculadas em um Centro Educacional de Ensino Fundamental, no ano de 2014, e que os pais permitiram a participaçªo delas na pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, permitindo que os pesquisadoras examinassem os cabelos para o diagnóstico da S H G L F X O R V H 7DPEpP IRL UHVSHLWDGR D YRQWDGH GD FULDQoD HP SDUV HVWXGR RV HVFRODUHV TXH QmR WLYHVVHP WRGRV RV TXI

2.4 5HWRUQR j FRPXQLGDGH

Todas as crianças portadoras de S H G L F X O R V H IRUDP HQFDPLQKDGDV O tratamento delas foi realizado por um enfermeiro autorizado pela SecretÆria de Saœde do ') $OpP GLVVR IRUDP UHDOL]DGDV SDOHVWUDV HGXFDWLYHV D FRQWDPLQDomR GHODV SRU SLROKRV

2.5 Analise dos resultados

2V GDGRV REWLGRV QD SHVTXLVD IRUDP RUJDQL]DG porcentagem e avaliados usando os mØtodos estatísticos Qui quadrado (X^2) e Risco relativo, XWLOL]DQGR R 3URJUDPD *UDSK3DG ,Q6WDW)RUDP FRQ quando o p foi < 0,05 (p

3 | RESULTADOS

A cidade Regional Estrutural, DF, no ano de 2014, possuía dois Centros Educacional

GH (QVLQR)XQGDPHQWDO 2 HVWXGR IRL UHDOL]D HP XP G
GHVVD FLGDGH 2 LQVWUXPHQWR SDUD FROHWD GRV GD
TXHVWLRQiULR HVWUXWXUDGR FRPSRVWR GH YDULiYHLV
VXEMHWLYDV H UHVSRQGLGDV SHODV SUySULDV FULDQoDV
VHQGR SHUPLWLGR D LQWHUDomR HQWUH DV FULDQoDV GX

No ano de 2014, a Instituiçªo participante contava com 1030 crianças devidamente PDWULFXODGDV H GLVWULEXtGDV HQWUH R DR DQR G DOXQRV GHODV SDUWLFLSDUDP GR HVWXGR (ODV WLC PHQLQDV H PHQLQRV $V GLVWULEXLoHVHV SRU FULDC

faixa etÆria e gŒnero foram: na faixa etÆria de 6 a 8 anos, examinaram 114 meninas e 71 PHQLQRV QDV LGDGHV HQWUH D DQRV DYDOLDUDP R PDLRU HP UHODomR DRV PHQLQRV FRP S $V FUI DQRV IRUDP SRVLWLYRV JDURWDV H JDURWRV S de meninas infestadas foram 16 casos, enquanto os meninos foram diagnosticados 26 casos (Tabela 1

Faixa etÆria (Anos)	Presença de pediculose							
	Meninos				Meninas			
	Sim	%	Nªo	%	Sim	%	Nªo	%
p	71	90,5	55	9,5	114*	56,5	12	43,5
p	92	84,5	60	15,5	130*	60,5	24	39,5
p	46	89,7	43	10,5	96*	51,5	21	48,5
!	26	84,2	27	16,0	16	49,0	03	51,0

A distribuiçªo dos sinais e sintomas por gŒnero e presença de piolhos nos escolares, mostrou que o índice de coceira na cabeça nas meninas, 286 casos foi maior em relaçªo D PHQLQRV $ PDLRULD GRV HVFRODUHV QmR DSUHVHQW existŒncia deS H G L F X O R V H P H Q L Q D V H P H Q L Q R V &RP U para se concentrar houve diferença entre os gŒneros, pois 170 meninas nªo apresentaram HVVD GLÀFXOGDGH HQTXDQWR PHQLQRV TXHL[DP GHVVH

Com relaçªo ao índice de notas baixas das crianças positivas para piolhos, YHULÀFDUDP TXH GDV PHQLQDV QmR DSUHVHQWDYDP SURYDV HVFRODUHV DVVLP FRPR PHQLQRV WDPEpP Qm Assim segundo os resultados obtidos, os sinais e sintomas clínicos indicativos de pediculose

mostrou correlação positiva somente para a coceira na cabeça das meninas, enquanto que RV PHQLQRV DOpP GD FRFHLUD DSUHVHQWDUDP GLÀFXOG

Sintomas clínicos	GÊnero							
	Meninos				Meninas			
	Sim	%	Nªo	%	Sim	%	Nªo	%
Coceira	231	55,0	191	45	286	70,5	120	30,0
’LÀFXOGDGH HP GRUPLU	128	30,5	291	69,5	138	34,0	267	66,0
’LÀFXOGDGH SDUD FRFKHFKHU	210	50,0	209	50,0	170	42,0	236	58,0
Notas baixas	62	15,0	173	85	100	24,5	262	75,5

Com relação a distribuição das crianças, quanto àidade e o grau de conhecimentos delas sobre pediculose foram observados que das 826 crianças participantes, de 252 com idade entre 6 a 8 anos, 222 delas sabiam o que era SHGLFXORVH ’H HVFRO idade entre 8 a 10 anos, 228 tinham conhecimento sobre pediculose, e de 196 escolares com idade entre 10 a 12 anos, 179 deles sabiam o que era a SHGLFXORVH (QTXDQ das 76 crianças com idades superior a 12 anos, 64 delas tinham conhecimento sobre os SLROKRV 6REUH WHU VRIULGR GH pediculose, dos 826 com idade SRUV HQWUH D PDLRU GH DQRV GHOHV DÀUPDUDP TXH VRIU (Tabela 3

Sobre a variÆvel sobre como eliminar piolhos, 162 dos escolares responderam que a eliminação do piolho se dÆ pela utilização de shampoo, 437 disseram que era por cataço, 66 disseram que raspar o cabelo seria a melhor forma de eliminação, e 115 desses alunos UHODFLRQDUDP D RXWUDV RSo}HV FRPR D XWLOL]DomR GH

Quanto àvariÆvel sobre quem descobriu que os escolares estavam com piolho, 591 alunos sabiam que estavam com pediculose, 458 relataram que a descoberta veio dos pais, 43 foram descobertos pelos professores, 12 por amigos e 83 por outras pessoas como: tios e avós (Tabela 3

Com relação a distribuição dos escolares por gÊnero e os fatores de risco para aquisição de pediculose, dos 826 escolares, 235 meninos e 356 meninas tinham conhecimento sobre os fatores de riscos para aquisição de SHGLFXORVH VHQGR VLJQLÀFDWLYDP de crianças com conhecimento sobre os fatores de riscos (Figura 2)

Os fatores de risco para aquisição de pediculose, foram distribuídos entre os gÊneros e as variÆveis como: ter irmãos pequenos, emprestar ou usar pertences de outras pessoas, ter colegas como piolho (Figura 2A e B 2EVHUYDUDP WDPEpP VH R R WLSR GH FDEHOR LQ`XHQFLDYDP QD DTXLVLomR GHRSLRO

total de crianças com S H G L F X O R V H P H Q L Q R V H P H Q L Q D V W L C
P H Q L Q D V H P H Q L Q R V X V D Y D P R X H P S U H V W D U S H U W H
Os resultados obtidos quanto ao quesito ter colegas com piolho, 322 meninas e 260
P H Q L Q R V W L Q K D P F R O H J D V F R P S L R O K R V 2 W D P D Q K R G R V
para aquisição de piolhos, portanto, 199 meninas e 18 meninos tinham cabelos longos,
P H Q L Q D V H P H Q L Q R V W L Q K D P F D E H O R V G H W D P D Q K R
S H G L F X O R V H P H Q L Q D V H P H Q L Q R V W L Q K D P F D E H O R V
191 meninas tinham cabelos lisos, 199 meninas e 80 meninos tinham cabelos ondulados,
P H Q L Q D V H P H Q L Q R V W L Q K D P F D E H O R V F U H V S R V

VariÆveis (Conhecimento sobre pediculose)		Faixa etÆria (anos)															
		p				p				p				12 > (72)			
		Sim		Nªo		Sim		Nªo		Sim		Nªo		Sim		Nªo	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sabem o que Ø pediculose?		222	88,1	30	11,9	282	92,2	24	7,8	179	91,3	17	8,7	64	88,9	8	11,1
Teve Bullying devido ter pediculose?		31	12,3	221	87,7	43	14,1	263	85,9	11	5,6	185	94,4	10	13,9	62	86,1
1	Sham-poo	45	17,9			75	24,5			35	17,9			19	26,5		
	Cataçªo	144	57,1			146	47,7			117	59,7			41	56,9		
	Raspan-do	28	11,1			29	9,5			14	7,1			07	9,7		
	Outros	35	13,9			56	18,3			30	15,3			05	6,9		
2	Pais	156	61,9			196	64,1			137	69,9			65	90,3		
	Profes-sores	40	15,9			49	16			00	00			02	2,8		
	Amigos	00	00			05	1,6			24	12,2			02	2,8		
	Outros	56	22,2			56	18,3			35	17,9			03	4,1		

4 | DISCUSSˆO

Pediculose Ø a infestaçªo cutânea causada pela presença do ectoparasito Pediculus humanus capitis R SLROKR GD FDEHoD e XPD GRHQoD HQ maneira massiva e permanente, afetando principalmente crianças entre quatro e 12 anos, DSHVDU GRV DGXOWRV QmR HVWDUHP OLYUHV Pediculose GHÀQH D GRHQoD FRPR XP SUREOHPD GH VD~GH LQWHUQDF independente da classe social ou condiçes de higiene, sobretudo em crianças em idade HVFRODU 6,*5,67 &2$7(6 HW DO

(VVH HFWRSDUDVLWR SUHMXGLFD R UHQGLPHQWR QD DXWRHVWLPD GHOD H JHUDU GLÀFXOGDGHV GH FRQFHQWUD FRQWtQXR H GLVW~UELRV GR VRQR /,1$5',)g/67(5 + uma doença comum na infância, principalmente na idade escolar, os conhecimentos e HVWXGRV FLHQWtÀFRV D UHVSHLWR GHVWH DVVXQWR DLQ para a realizaçªo de pesquisa relacionada a esse tema, devido ao estima social gerada SRU HOD

Os resultados encontrados nesta pesquisa mostraram que as crianças entrevistadas e examinadas estavam altamente infestadas, pois em 84,4% delas foi observado presença de piolhos e lŒndeas de P. humanus capitis &RP UHODomR DR JrQHUR YHULÀF PHQLQRV H GDV PHQLQDV HVWDYDP FRP SLROKRV VHQ

PDLRU HQWUH PHQLQDV (VVHV UHVXOWDGRV FRQÀUPDP RV
PHQLQDV VmR GH IDWR PDLV VXVFHWtYHLV j DTXLVLomR G
Esses autores mostraram que de 293 crianças de uma escola pœblica em Sªo Leopoldo,
GHODV HVWDYDP LQIHVWDGDV VHQGR PHQLQDV H
Com relaçªo aos sintomas clínicos induzidos pelos ectoparasitos, os dados
HQFRQWUDGRV QR HVWXGR PRVWUDUDP VLJQLÀFDWLYDV GL
meninas e meninos (p<0,05), onde 70,4% das meninas e 55% dos meninos reclamaram
GH SUXULGR LQWHQVR QD FDEHoD $OpP GLVVR IRL REVH
PDLRU GLÀFXOGDGH GH FRQFHQWUDomR HQTXDQWR
constatado que a pediculose nªo interfere no sono de 66% e 69,5% em meninas e meninos
respectivamente, alØm disso, o prurido intenso devido à alta carga de piolhos afetam
QR UHQGLPHQWR HVFRODU HP GDV PHQLQDV H G
GLIHUHP GRV DSUHVHQWDGRV SRU /,1$5', HW DO Ø T
um problema recorrente na populaçªo mundial, acometendo, sobretudo crianças em
idade escolar, atrapalhando o rendimento na escola, devido àdiminuiçªo da autoestima e
GLÀFXOGDGH GH FRQFHQWUDomR HP FRQVHTXrQFLD GR SU
que nos casos mais graves de pediculose, as crianças podem desenvolver anemia devido
DR DOWR KHPDWRIDJLVPR UHDOL]DGR SHOR SLROKR /,1$5'
Tratando-se do grau de conhecimento, percebeu-se que as crianças demonstraram
bom conhecimento sobre SHGLFXORVH 2V HVFRODUHV FRP LGDGH HQ
sabiam o que era pediculose, as de as 8-10 anos (92,2%), de 10-12 (91,3%), e as maiores
GH VDELDP R TXH HUD H RV IDWRUHV GH ULVFR
doença Ø importante, pois os pais devido àcorreria do dia a dia em alguns casos nªo tŒm
WHPSR GH H[DPLQDU D FDEHoD GH VHXV ÀOKRV H RV VLQ
FDEHoD SDVVD GHVSHUFHELGD SHOD FULDQoD H SHORV SU
reconheci os sintomas de SHGLFXORVH HOD SUySULD D FULDQoD SRG
SDUD VH OLYUDU GR SLROKR 1mR Vy DV FULDQoDV PDV W
HVWDU DWHQWRV DRV VLQWRPDV FOtQLFRV TXH LGHQWLÀF
3,1+(,52 HW DO
Esses autores relatam que a aquisiçªo de conhecimentos sobre pediculose Ø um
fator importante para a compreensªo e prÆtica dos pais e encarregados de educaçªo,
pois muitas vezes sªo capazes de combater a infestaçªo, se adquirirem conhecimentos
H UHFHEHUHP LQVWUXo}HV 6HJXQGR)UDQNRZVNL H FRODE
pode ensinar os pais a lidar com a SHGLFXORVH HQFRUDMDQGR RV D H[
GRV VHXV ÀOKRV H[LVWH D SUHVHQoD GH SLROKRV $OpP
SRGHP YHULÀFDU VH QD FDEHoD GRV HVWXGDQWHV FRP FR
Quanto à forma de como se elimina piolhos foram colocados 4 quesitos para
avaliar o conhecimento dos estudantes, seguindo a distribuiçªo: 1. Uso de shampoo era
a soluçªo para as crianças na faixa etÆria de: 6-8 anos (17,9%), 8-10 anos (24,5%), 10-

DQRV PDLRUHV GH 2. A QDção resolveria a ectoparasitose para: 6-8 anos (57,1%), de 8-10 anos (47,7%), de 10-12 anos (59,7%) maiores de 12 anos GDV FULDQoDV 3. WR GH UDSDJHP GR pedículo para DQRV GH DQRV GH 4. Outros mDQHLUDV como tentar eliminar piolho com gasolina, inseticida e vinagre tambØm foram mencionados pelas crianças: de 6-8 anos (13,9%), de 8-10 anos (18,3%), de 10 12 anos (15,3%) e maiores GH DQRV

As informaçes acima mencionadas pelas crianças durante a pesquisa, revelam um FRQKHFLPHQWR TXH YHP GH TXH SDLV H TXH RV SURIHVVRU realizada com 61 funcionÆrios de um Centro de Ensino Infantil (GABANI; MAEBARA; FERRARI, 2010) com pais e professores, mostram que as opiniões deles sobre os modos de eliminar a pediculose tambØm sªo divergentes entre adultos, quanto ao tratamento, VHQGR R [DPSX FRPXP FRQVLGHUDGR GH pediculose (42,1%), seguido pela DUD D VDO H YLQDJUH 2 TXH FKDPD PDLV D DWHQomR p TX FRQVLGHUDYDP RV SHVWLFLGDV FRPR D IRUPD PDLV DGHT Dentre as prÆticas realizadas nos seus nœcleos de convivŒncia, destacam-se e cataçª H R XVR GH SHQWH ÀQR H GH PHGLFDPHQWRV FRQVLGHUDYDP D HGXFDomR GRV IDPLOLDUHV H FULDQ Essa divergŒncia quantos as formas de eliminaçª da pediculose entre os indivíduos Ø uma FDUDFWHUtVWLFD PXQGLDO +$,'$0$.

Os fatores de riscos para aquisiçª de pediculose avaliados foram: os escolares tinham irmªos pequenos, emprestavam ou usava pertences de colegas como: bonØs, escova de cabelos, roupas e se as crianças tinham colegas ou amigos com piolho, e o WDPDQKR H WLSR GH FDEHOR GHOHV &RP UHODomR HQWUH eram 60% meninos e 59,9% meninas, emprestavam ou usavam pertences de colegas 31% GRV PHQLQRV H GDV PHQLQDV HPSUHVWDYDP RX XVDY Ø importante, pois no caso da criança estar infestada com piolhos, o convívio e o contato direto em casa com os irmªos pode ser a forma de transmissª e manutençª da infecçª LQWUDGRPLFLOLDU d(7,1.$<$ HW DO

Colegas com piolho, 61,9% dos meninos e 79% das meninas disseram que os colegas eram portadores de SHGLFXORVH $OpP GLVVR REVHUYRX VH TXH D usavam mais pertences de colegas, tinham mais colegas com piolho e possuíam maior porcentagem de cabelo compridos, podendo assim associar esses fatores com o maior risco de se infectarem por piolhos, quando comparados com os meninos, acordando com RXWURV HVWXGRV TXH DÀUPDP ·TXH HQWUH DV PHQLQDV brincam se comportando com mais intimidade umas com as outras, a transmissª de piolho p IDFLOLWDGD /,1$5', 0=21$6 HW DO

Com relaçª ao tamanho do cabelo 49% das meninas tinham cabelo comprido e apenas 4,3% dos meninos, essa grande diferença se dÆ tambØm ao cabelo curto, pois 66,4%

GRV PHQLQRV WLQKDP FDEHOR FXUWR H GDV PHQLQDV
que, 45,5% dos meninos e 25,9% das meninas tinham cabelos lisos, cabelo ondulados 19%
GH PHQLQRV H PHQLQDV H FUHVSRV PHQLQRV H
mostram que o tipo de cabelo nªo interfere na aquisiçªo de pediculose, e nªo existe dados
VLJQLÀFDWLYR SDUD HVVD FRQFOXVmR 5HODWRV GD OLWH
mostrado na pesquisa realizada no Abrigo Tereza de Jesus com 300 crianças, mostrando
TXH R WLSR GH FDEHOR OLVR H FUHVSR QmR LQ`XHQFLD
pediculose (2” CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSˆO UNIVERSIT`RIA, BH, MG,

No decorrer do estudo observaram que crianças com hÆbitos de higiene inadequados podem ser mais suscetíveis àaquisiçªo de pediculose, corroborando com os resultados GHVFULWR QD OLWHUDWXUD ’2:16 HW DO TXH TXHVV UHODFLRQDGD FRP D GLVSRQLELOLGDGH OLPLWDGD GH iJXD VLWXDomR FRPXP QD SRSXODomR GH FODVVHV EDL[DV 1R C as crianças com hÆbitos de higiene inadequados podem ser mais suscetíveis a aquisiçªo de SHGLFXORVH FRQFRUGDQGR FRP R UDFLRFtQLR GH ’RZQ VXD DOWD SUHYDOrQFLD VHMD UHODFLRQDGD FRP D GLVSU SUiWLFDV GH KLJLHQH SHVVRDO VLWXDomR FRPXP QD SRS

Recentemente, conforme as diretrizes curriculares, a enfermeira deve ser formada SDUD SODQHMDU H LPSOHPHQWDU SURJUDPDV GH HGXFDom D HVSHFLÀFLGDGH GRV GLIHUHQWHV JUXSRV VRFLDLV H G WUDEDOKR H DGROHFLPHQWR %5$6,/

5 | CONCLUSÕES

Os resultados desse estudo mostram que a pediculose Ø uma ectoparasitose endŒmica no Centro Educacional de Ensino Fundamental, da cidade Regional Estrutural, ’)

Os dados encontrados mostram a necessidade da realizaçªo de mais estudos que FRQÀUPDQGR TXH QmR p QHFHVViULR XP FRQWDWR WmR S para adquirir SHGLFXORVH (VVH IDWR IRL REVHUYDGRV SHORV diagnóstico da pediculose nas crianças, pois eles adquiriram a pediculose, ao realizar o GLDJQyVWLFR GR HVWXGDQWH VHP WHU FRQWDWR RX XVR

2V SURÀVVLRQDLV GD VD~GH HP HVSHFLDO RV HQIHUP os professores tŒm um papel importante com a promoçªo, prevençªo e tratamento da SHGLFXORVH SRU YiULDV UD]}HV HOHV VmR RV SURÀVVLRQD e podem orientÆ-las e seus familiares por meio de palestras educativas, orientando-os para prevençªo de maneira correta para pediculose, pois em muitos casos os pais nªo tŒm SUHSDUDomR VXÀFLHQWH SDUD DJLU GH IRUPD DGHTXDGD

e Professores preparados estarão aptos para oferecer uma orientação continuada para HVVD FOLHQWHOD GH IRUPD FRUUHWD

O tratamento da SHGLFXORVH VH Gi SHOD PHGLFDomR FDWD contudo observa-se que necessita de um plano de intervenção, que envolva um trabalho em equipe com a secretaria de saœde, as escolas e a comunidade para diminuir a incidŒncia GHVVD GRHQoD

Assim, medida de orientação sobre pediculose deve ser ministrada para essas crianças, pois a SHGLFXORVH SRGH FDXVDU HVSROLDomR GDV GHC psíquicos e GpÀFLW GH DSUHQGL]DJHP

REFERˆNCIAS

0=21$6 3 + 0 PediculoseHWDO. em crianças e jovens atendidos em orfanatos e ambulatório pœblico de Manaus, AM, Brasil. 5HY 3DWRO 7URS Y Q

$1'5$'(&) 6 A remoção e o uso de agentes físicos no controle de piolhos. Disponível em: KWWS ZZZ SLROKR RUJ EU DUWLJRV UHPRFDRQLW SGI! $FHVVR HP

$1'5$'(&) HW DO Manual de controle da pediculose 'LVSRQtYHO HP KWWS Z DUWLJRV ÀSRVWVVDLGH SGI 6HWHPEUR GH

$1'5$'(&) Piolhos Soluçao pela educação . 81,&$03 ,% 'HSWR =RROJLD &DPS %LROyJLFR 6mR 3DXOR Y Q S MXO GH]

$1'5$'((- 6 6 3,172 = 7 %$5%26$ - 9. Formação continuada em pediculose: Quando o piolho invade a aula e o professor afasta o aluno. Disponível em < KWWS ZZZ DUFD ÀRFUX] E LFLFW ! $FHVVR HP GH $JRVWR GH

%$5%26$ - 9 3,172 = 7 Pediculose noBrasil PRO 9HFW Y Q

%(66$ 0 (3 Riscos ocupacionais do enfermeiro atuante a Estratégia Saœde da Família 5HY (QIHUP 8(5- 5LR GH -DQHLUR Y Q

&$03/, (' HWDO. Activity of tea tree oil and nerolidol alone or in combination against Pediculus capitis (head lice) and its eggs. 3DUDVLWRO 5HV Y †

&59/+2) 7. Ações de Combate àPediculose em um Centro de Educação Infantil em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. 'LVSRQtYHO HP KWWSV ZZZ QHVFRQ PHGFLFLQD XI LPDJHP SGI! $FHVVR HP GH 6HWHPEUR GH

&59/+2 5 Pediculose: um problema saœde pœblica &DSLWXOR ,Q $o}HV GH 6D~ JHUDo}HV GH FRQKHFLPHQWRV QDV FLrQFLDV PpGLFDV $WHQDV (G

&7/É 6 . HWDO. Prevalência e intensidade da infestação por Pediculus humanus capitis em escolares de seis a onze anos. 5HY GD 6RF %UDV 0HG 7URS Y Q

&7/É 6 -81&2 / 9$325$.< 5. Pediculus capitis infestation according to sex and social factors in Argentina Infestaçªo por Pediculus capitis segundo sexo e fatores sociais na Argentina 5HY 6D~GH 3~EOLFD Y Q

&2$7(6 6 - Ectoparasites: pediculosis and tungiasis. - $P $FDG 'HUPDWRO Y

&267$ & & Prevalência de pediculose de cabeça em crianças inseridas em centros municipais de educaçªo infantil. 5HY (QIHUP &HQWUR 2HVWH 0LQHLUR Y

d(7,1.$<$ 8 ß$+,1 6 8/87$%7KH3RSXODWLRQ'\QDPLFV RI Scabies and Pediculosis in Kayseri. 7XUNL\H 3DUD]LWRO 'HUJ Y Q

d(7,1.$<$ 8 The Prevalence of Pediculus humanus capitis in two primary schools of +DFÕODU .D\VHUL 7XUNL\H 3DUD]LWRO 'HUJ Y Q

&81+$ 3 9 6 HW DO O Discurso dos Professores Sobre a Transmissªo da Pediculose Antes de uma Atividade Educativa. 5HY %UDV &UHVFLPHQWR 'HVHQYROYLPHQWR +XP

),*8(,5('2 5 3$,9$ & 02 Fiocruz [Pediculose]. Rio de Janeiro: Canal Saœde Fiocruz, YtGHR 03(* PLQ V VRQ FRORU /LJDGR HP 6D~GH KW LQGH[SKS"Y SLROKR SHGLFXORVH OHV

)g/67(5 +2/67 Itch Management in Childhood. &XUU 3UREO 'HUPDWRO Y

*$%$1,) / HW DO Pediculose nos centros de educaçªo infantil: conhecimentos e prÆticas dos trabalhadores (VF $QQD 1HU\ 5HY (QIHUP Y

*2/'6&+0,'7 $ /25(72 (. Investigaçªo das concepçıes espontâneas sobre pediculose entre pais, professores, direçªo e alunos de educaçªo infantil e anos iniciais. Revista Electrónica GH (QVHxDQ]D GH ODV &LrQFLDV Y Q

*21d$/9(6) ' HW DO A promoçªo da saœde na educaçªo infantil. &DGS XQLF 6D~GH (GXF Y Q

+$,'$0$. - 6XVFHSWLELOLW\ DVSHFWV WR SHGLFXORVLV DQG ZDVKLQJ GHP ' 0LFURELRORJLD 3DUDVLWRORJLD H 3DWRORJLD SHOD 8QLYHUVLGD

IBGE, ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUDÀD H (VWDWtVWLFD Disponível em: $FHVVR HP GH MXOKR GH

/23(6 $ *,5fi2 $ *21d$/9(6 & Avaliaçªo de Conhecimentos sobre Pediculose. Disponível HP KWWS XFFDURXFH ZHEO\ FRP XSORDGV DYDOLDUE HGXF SGI DFHVVR HP GH $JRVWR GH

0$*$/+fi(6 . 3 6 ,/9$ Infestaçªo por Pediculose e o Ensino de Saœde nas Escolas 5HYLVWD 6D~GH H 3HVTXLVD Y Q

081,5$7+,1$0 $ Impact of ivermectin drug combinations on Pediculus humanus capitis infestation in primary schoolchildren of south Indian rural villages. ,QWHU - 'HUPDWRORJ\ Q

1 8 1 (6 & % Bi HW D Epidemiologia da pediculose da cabeça. Scientia Amazônia, 2014,
Y Q

3,1+(,52) * 6 0 HW DO (WKQRJUDSKLF VWXG\ NQRZOHGJH DQG NC
SHGLFXORVLV LQ $UDFDMX PLFUR UHJLRQ 6HUJLSH ,QWHUIDFHV FI
Y Q †

3,172 = 7 9$5*$6 (3 (GXFDWLRQDO DSURDFK DQG EURDGFDVW RQ
LQWHUQHW 'LVSRQtYHO HP KWWS ZZZ IHS LI XVS EU aSURÀV DUTX

5,%(,52 1 5 5 , GHWR DÀ F DQ G R D pHGXFDWLYR HP (VFRODUHV de saúo Leopoldo
'LVSRQtYHO HP KWWS ZZZ OXPH XIUJV E!U DFHVVR HP GH RXV

6$1726 / 2 *21d$/9(6 Os piolhos-da-cabeça (Phthiraptera: Pediculidae) na visão de
PmHV H ÀOKRV XVXiULRV GH SRVWRV GH DVVLVWrQFLD GH HVWUDWpJLD
Y

628=$ 3 $ 7 HW DO Pediculose Na Escola, Uma Abordagem DidÆtica 'LVSRQtYHO HP
XQHVS EU SURJUDG 3')1(DUWLJRV FDSLWXOR SHGLFXORVH SGI

7$33(+ . + HW DO Pediculosis capitis among Primary School Children and Related Risk
Factors in Urmia, the Main City of West Azarbaijan, Iran. - $UWKURSRG %RUQH 'LV Y
†

725548$72 1 HW DO New perspectives on the treatment of pediculosis. H 6FLHQWLD %HOR +RUL
Q S (GLWRUD 8QL%+

9$+$'$ $ HW DO Prevalence and risk factors of Pediculus (humanus) capitis (Anoplura:
Pediculidae), in primary schools in Sanandaj City, Kurdistan Province, Iran. Tropical Biomedicine,
Y Q †

CAP´TULO 10

CORRELA˙ˆO ENTRE PEDICULOSE E ALTERA˙ÕES HEMATOLÓGICAS EM CRIAN˙AS COM IDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE `GUAS LINDAS DE GOI`S, GOI`S, BRASIL

Raianna Rosa Campos
Biomedicina, Enfermagem - Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Breno Piovezana Rinco
Enfermagem - Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Gabriela Cristina Souza Virgílio
Enfermagem - Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

-RVHOLWD %UDQGmR GH 6DQW•$QD
Biomedicina - Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Larissa Leite Barbosa
FarmÆcia - Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Rafael da Silva Affonso
FarmÆcia - Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

Eleuza Rodrigues Machado
CiŒncias Biológicas,Biomedicina, Enfermagem e FarmÆcia - Universidade Anhanguera de Brasília - Unidade Taguatinga
Distrito Federal, Brasil

RESUMO: Pediculose Ø uma ectoparasitose causada pelo inseto hematófago Pediculus capitis TXH VH DORMDP QR FRXUR humano, sendo as crianças em idade escolar DV PDLV DFRPHWLGDV GH HQWUH $F presença de P. capitis HP FULDQoDV H se existe correlaçªo entre a presença de pediculose, alteraçes hematológicas e a queda da qualidade na aprendizagem desses LQGLYtGXRV Metodologia: Foi uma pesquisa experimental e qualitativa realizada na cidade de `guas Lindas de GoiÆs, no ano de 2014, usando FULDQoDV HVFRODUHV GH (QV Fizeram exames crianças nos cabelos para detecçªo de piolhos e lŒndeas, analises hematológicos para detecçªo de alteraçes nas cØlulas sanguíneas, e aplicado um questionÆrio SDUD LGHQWLÀFDU R JUDX GH alunos sobre pediculose e os sintomas clínicos LQGX]LGRV SHORV Resultados: PARA Participaram do estudo 147 crianças, sendo 80 do gŒnero masculino e 67 do gŒnero feminino, QD IDL[D HWiULD HQWUH TXDWU Dessas crianças, 26 estavam com pediculose, 22 FDVRV HUDP PHQLQDV H TXDWUR principais sintomas relatado por elas foi o prurido H GLÀFXOGDGH HP GRUPLU)R WUrV FDVRV GH DQHPLD H FLC Conclusıes: Pediculose ainda Ø um problema de saœde pœblica, especialmente em crianças, tendo como fatores de risco: gŒnero, idade e FRQYLYrQFLD HP DPELHQWHV FR DJORPHUDo}HV (VVD SDUDVLWR HRVLQRÀOLD QRV LQGLYtGXRV H

PALAVRAS-CHAVE: Pediculus capitis, Pediculose, DOWHUDo}HV KHPDWROyJ

ABSTRACT: Pediculosis is an ectoparasitosis caused by the hematophagous insect Pediculus capitis ZKLFK ORGJHV LQ WKH KXPDQ VFDOS ZLWK VFKRRO D
Objective: to identify the presence of P. capitis in children and to verify if there is a correlation EHWZHHQ WKH SUHVHQFH RI SHGLFXORVLV KHPDWRORJLFD TXDOLW\ RI OHDUQLQJ Methods: WKLV ZDV DQ H[SHULPHQWDO research carried out in the city of `guas Lindas de GoiÆs, in 2014, using elementary school FKLOGUHQ &KLOGUHQ H[DPLQHG WKHLU KDLU IRU WKH GHWH WR GHWHFW FKDQJHV LQ EORRG FHOOV DQG DSSOLHG D TX NQRZOHGJH DERXW SHGLFXORVLV DQG WKH FOLQLFDO Results: $ WRWDO RI FKLOGUHQ SDUWLFLSDWHG LQ WKH VWXG\ DQG \HDUV ROG 2I WKHVH FKLOGUHQ KDG SHGLFXORV ZHUH ER\V 7KH PDLQ V\PSWRPV UHSRUWHG E\ WKHP ZHUH L FDVHV RI DQHPLD DQG ÀYH RI HRVLQRSKLOLD Conclusions: Pediculosis still a public health problem, especially in children, having as risk factors: gender, age and living LQ FROOHFWLYH HQYLURQPHQWV WKDW LV LQ DJJORPHUD HRVLQRSKLOLD LQ HFWRSDUDVLWLVLV LQGLYLGXDOV
KEYWORDS: Pediculus capitis 3HGLFXORVLV KHPDWRORJLFDO DOWHUD

INTRODU˙ˆO

Pediculose Ø uma doença causada por ectoparasitos hematófagos, o Pediculis capitis, tambØm conhecido popularmente como piolho da cabeça (SILVA, 2018, FREITAS, HW DO (VVD HFWRSDUDVLWRVH DSUHVHQWD GLVWU todas as idades, independente de raça, gŒnero ou classe social (URÉBÉTE, 2019, 2019;)5(,7$6 HW DO 2 FLFOR GH YLGD GR SLROKR RFRU crianças com idade e que convivem em ambientes coletivos como: creches e escolas .29$/,&=1 HW DO 1(9(6 HW DO

Os piolhos possuem metamorfose incompleta e passam por trŒs estÆgios durante o FLFOR GH YLGD OrQGHD RX RYR QLQID WUrV HVWiGLRV H hematófagos obrigatórios, desde a fase de ninfas atØ os adultos: machos e fŒmeas (LIMA; *20(6)(55(,5$ 1(9(6 HW DO (VVHV VHUHV FRQV DWp WUrV GLDV ORQJH GH VHXV KRVSHGHLURV H VHP VH transmissªo por Pediculus capitis p IDFLOLWDGD SRU REMHWRV TXH SR entre as pessoas como: pentes, escovas, presilhas, bonØs, roupas, e pelo contato próximo GH SHVVRDV SRUWDGRUDV GHVVH HFWRSDUDVLWR %85.$5 181(6 HW DO

O primeiro sinal de infestaçªo por piolho Ø caracterizada pela intensa coceira no FRXUR FDEHOXGR SULQFLSDOPHQWH QD UHJLmR DWUiV GD piolho libera durante a picada enzimas que funcionam como anticoagulantes e anestØsicos, inibindo desta forma, o hospedeiro nªo sente dor e o sangue nªo coagula no abdome do

LQVHWR %$5%26$ 3,172

Crianças portadoras dessa ectoparasitose podem desenvolver problemas relacionados ao desempenho escolar e comportamento sociais, devido aos sintomas FDXVDGRV SHOD LQIHVWDomR GH SLROKR H SUHVHQoD GH $/%$6+7$:< +$61$

Pediculose nªo atinge somente crianças em idade escolar de classes sociais menos IDYRUHFLGDV FRPR PXLWDV SHVVRDV SHQVDP (VVD HFWRS FODVVHV LQGHSHQGHQWH GDV FRQGLo}HV HP TXH YLYHP $ físicos e tambØm problemas psicológicos, principalmente se forem crianças em idade HVFRODU SRGHQGR DOWHUDU R QtYHO GH FRQFHQWUDom QR UHVXOWDGR GD TXDOLGDGH GH DSUHQGL]DJHP R TXH sente-se psicologicamente mal pela condiçªo de estar com o ectoparasito, escondendo a LQIHVWDomR HP XP VHQWLPHQWR GH YHUJRQKD (VVD RFX da criança, da família ou de escolas e comunidades, tŒm garantido a sobrevivŒncia dos piolhos, e mantendo as infestaçoes endŒmicas por dØcadas em todo o mundo (NUNES, et DO 1(9(6 HW DO

Os pais tambØm sªo atingidos por esse estigma, que pode dar a idØia de falta de KLJLHQH HP FDVD H SHVVRDO 0$*$/+fi(6 HW DO 0285$ enfrentam o problema de evitar a transmissªo desse ectoparasito a outros alunos, isolando as crianças infestadas, o que nªo Ø aconselhÆvel devido ao constrangimento causado as FULDQoDV 1(9(6 HW DO 6$1726

Apesar de nªo serem conhecidos por esse fato, esses ectoparasitos podem causar diversas doenças, devido àalta hematofagia feita pelos piolhos somada a nutriçªo LQDGHTXDGD GRV LQGLYtGXRV DFRPHWLGRV $ DQHPLD p LQVXÀFLrQFLD GH IHUUR UHVSRQViYHO SHOR WUDQVSRUWH VXSULUHP DV QHFHVVLGDGHV ÀVLROyJLFDV GR RUJDQLVPR podendo ocorrer devido a uma diminuiçªo na quantidade de cØlulas vermelhas circulantes ou por alteraçoes na molØcula de hemoglobina, responsÆveis por essa funçªo (JANUS, 02(56&+(/ :+2 (VWXGRV GHPRQVWUDP TXH FHUF GLDJQRVWLFDGDV VmR FDXVDGDV SHOD GHÀFLrQFLD GH IHU Esse tipo de anemia pode ser observada em países desenvolvidos e em desenvolvimento, PRVWUDQGR GLIHUHQWHV SUHYDOrQFLDV :+2 :+2

Em algumas situaçoes a infestaçªo pode levar a quadros de miíases, infestaçoes SURYRFDGD SHOD SUHVHQoD GH ODUYDV GH PRVFDV QR O Outros dois quadros tambØm observados em crianças com pediculose Ø reduçªo do nœmero GH KHPiFLDV FLUFXODQWHV H D UHVSRVWD LPXQROyJLFD F HRVLQRÀOLD GHYLGR jV UHDo}HV LPXQROyJLFDV GR FRQW &$55(5$ HW DO %$5%26$ 3,172 6$1726 HW DO

Os sintomas da pediculose sªo devidas às reaçoes do hospedeiro às secreçoes

VDOLYDUHV LQMHWDGDV QD SHOH SHOR SLROKR GXUDQW
lesıes papulosas, elevadas e hiperŒmicas, acompanhada de intenso prurido (FIGUEIREDO,

$V YH]HV HVVH SUXULGR p LQWHQVR H R SRUWDGRU
SHOH 6HJXQGR DOJXQV DXWRUHV HVVHV IDWRUHV SRGHP FR
GHVHQYROYDP KLSHUVHQVLELOLGDGH j VDOLYD H jV GHMH
0285$ HW DO

$VVLP HVVD SHVTXLVD WHYH FRPR REMHWLYR GHQW
FULDQoDV H YHULÀFDU VH H[LVWH FRUUHODomR HQWUH
KHPDWRORyJLFDV H D TXHGD GD TXDOLGDGH QD DPRVWUD

METODOLOGIA

Tipo de estudo e populaçªo alvo

Foi uma pesquisa experimental e qualitativa realizada na cidade de `guas Lindas
GH *RLiV QR DQR GH 2 HVWXGR IRL UHDOL]DGR DSyV D
eWLFD HP 3HVTXLVD FRP 6HUHV +XPDQRV 'RF
GH)HYHUHLUR D 0DUoR GH

Foram examinadas 147 crianças, sendo 80 do gŒnero masculino e 67 do gŒnero feminino, na faixa etÆria entre quatro a 12 anos de idade, os quais os pais permitiram a
SDUWLFLSDomR QR HVWXGR DVVLQDQGR R 7HUPR GH FRQV

Logística para coletas das amostras

Inicialmente realizaram uma reuniªo com os pais e/ou responsÆveis legais das
FULDQoDV SDUD RULHQWi ORV VREUH REMHWLYRV GD UH
Nessa reuniªo foi entregue o TCLE, onde foi explicado o procedimento para a realizaçªo do
SURMHWR H LGHQWLÀFDUDP DV FULDQoDV TXH RV SDLV DX

Durante o exame físico, todas as crianças responderam o questionÆrio para avaliar o grau de conhecimento que elas possuíam sobre SHGLFXORVH $OpP GLVVR existia correlaçªo positiva entre as crianças com SHGLFXORVH H GpÀFLW HVFRO
GR VRQR LUULWDELOLGDGH SRU PHLR GH DQiOLVH GDV QR
entrevista com os professores de cada sØrie, por meio de um questionÆrio com questıes
REMHWLYDV VREUH DV FRQGLo}HV GH VD~GH H UHQGLPHQ
aplicaçªo do questionÆrio as crianças e a entrevista com os professores duraram de 15 a
PLQXWRV

Foi coletada uma amostra de sangue de todas as crianças participantes do estudo
SDUD YHULÀFDU VH H[LVWLD XPD FRUUHODomR HQWUH D SUHVHQ
alteraçes no nœmero das cØlulas sanguíneas: hemÆcias e leucócitos

Diagnóstico Físico

3DUD GLDJQRVWLFDU D SUHVHQoD GH SLROKRV IRL UHD
direcionadas individualmente a uma sala cedida pela direçªo das respectivas escolas, para
evitar constrangimento das crianças com SHGLFXORVH $YDOLDUDP DV VHJX
FDEHoD IURQWDO SDULHWDO RFFLSLWDO H WHPSRUDLV
D SUHVHQoD GH SLROKRV DGXOWRV H OrQGHDV RYRV D
YLVXDOL]DomR XVDUDP OXSDV FRP DXPHQWR GH [R WDPD

Diagnóstico Clínico

3DUD R GLDJQyVWLFR FOtQLFR IRUDP UHDOL]DGDV DQD
FRP RV H[DPHV GH VDQJXH 2V KHPRJUDPDV IRUDP UHDO
VDQJXH IRL REWLGR XVDQGR R VLVWHPD i YiFXR HP WXERV
GLDJQRVWLFDGRV DQHPLD H D SUHVHQoD GH HRVLQRÀOLD
realizado manualmente contando leucócitos totais, hemÆcias e plaquetas usando câmara
GH 1HXEDXHU $ FRQWDJHP GLIHUHQFLDO GDV FpOXODV IR
FDPDGD GHOJDGD H FRUDGDV FRP FRUDQWH 3DQyWLFR 1(

AnÆlises estatísticas

2V UHVXOWDGRV H[SHULPHQWDLV IRUDP RUJDQL]DGRV
Programa Excel, versªo 2003, e analisados pelos mØtodos estatísticos Chi-quadrado (c†),
H)LVKHU XWLOL]DQGR R SURJUDPD ,QVWDW $V GLIHUHQ
FRQVLGHUDGDV HVWDWLVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYDV TXD

5HWRUQR j FRPXQLGDGH

Após o diagnóstico hematológico foi realizada uma palestra para todos os docentes,
alunos, pais e/ou responsÆveis das respectivas escolas para entregar os resultados e
D RULHQWDomR GHOHV VREUH D SUHYHQomR H HQVLQR G
SHGLFXORVH

RESULTADOS

Do total de 467 estudantes matriculados na Escola de Ensino Fundamental, GHODV SDUWLFLSDUDP GR HVWXGR $V FULDQoDV WLQ GR JrQHUR IHPLQLQR H GR JrQHUR PDVF foram submetidos ao exame físico individual para detecção de lŒndeas e piolhos, sendo que 26 (17,70%) delas eram portadores de SHGLFXORVH 7DEHOD

Das 26 crianças com pediculose, 22 casos eram meninas e quatro casos meninos, PRVWUDQGR GLIHUHQoD VLJQLÀFDWLYD HQWUH JrQHURV SD VHQGR DV PHQLQDV PXLWR PDLV VXVFHSWtYHO D LQ

A faixa etÆria que apresentou maior nœmero de casos de pediculose foi a de seis D RLWR DQRV &RP UHODomR DR JrQHUR R PDLRU Q- VHLV D RLWR DQRV 3DUD R JrQHUR PDVFXOLQR R tQ oito a dez anos (1,36%), sendo que a faixa de quatro a seis anos nªo houve nenhum caso GH LQIHVWDomR 7DEHOD $V DQDOLVHV IRUDP IHLWD X VLJQLÀFDWLYDV FRP UHODomR D LGDGH H DTXLVLomR GH S

GŒnero	Pediculose				Total	
	Nº	%	P	%	N”	%
Masculino	76	51,70	4	2,73	80	54,42
Feminino	45	30,60	22**	14,97	67	45,58
Total	121	82,30	26	17,70	147	100,0

Idade (anos)	GŒnero								Total	
	Meninos				Meninas					
	N	%	P	%	N	%	P	%	N”	%
4 ‹ 6	23	15,64	01	0,68	14	9,52	05	3,40	43	
6 ‹ 8	22		00	0,00	12	8,16	09	6,12	43	
8 ‹10	18	12,24	02	1,36	10	6,80	04	2,72	34	23,19
10‹12	13	8,84	01	0,68	10	6,80	03	2,04	27	18,41
Total	76	51,70	03	2,72	47	31,28	22	14,28	147	100

Em relação ao hemograma, foi realizado em cada criança para observação de

SRVVtYHLV DOWHUDo}HV GH KHPiFLDV H OHXFyFLWRV)LJX
31 apresentaram concentraçªo de hemÆcias diminuída e 33 estavam com o nœmero de
HRVLQyÀORV DXPHQWDGRV)LJXUD % 'RHQoDV &UyQLFDV S
HVWDYDP FRP R Q~PHUR GH KHPiFLDV GLPLQXtGDV H FLQFR
IRUDP DQDOLVDGRV SHOR WHVWH GH)LVKHU•V H PRVWUD
HP LQGX]LU QR SDFLHQWH UHGXomR GH Q~PHUR GH KHPiFL

Os escolares que participaram do estudo, atenderam àsolicitaçªo de preenchimento

de um questionÆrio sobre o conhecimento deles sobre pediculose e os sintomas advindos GHVVD HFWRSDUDVLWRVH 2V VLQWRPDV PDLV UHODWDGR GLÀFXOGDGH SDUD GRUPLU FRQFHQWUDomR QDV DXODV DOJXP PRPHQWR QD YLGD 7DEHOD $OpP GLVVR IRUDP a aquisição de pediculose e 37,41% relataram usar ou emprestar roupas, bonØs, pentes e HWF SDUD RXWUDV SHVVRDV

Sinais, Sintomas e HÆbitos	Respostas	
	N”	%
Teve piolho pelo menos uma vez	96	65,30
’LÀFXOGDGH SDUD GRUPLU	64	43,53
Coceira na cabeça	75	51,02
Usam e emprestam: roupas, bonØ, pentes, escovas de cabelo	55	37,41
’LÀFXOGDGH HP FRQFHQWUDU QDV7DXODV		51,70

Com relação a pediculose ser considerada bullying, dos 147 escolares, 22 deles DÀUPDUDP TXH VRIUHUDP EXOO\LQJ (VVH IDWR IRL FRQÀUP presenciaram crianças se afastarem uma das outras por conta da infestação por piolhos e HP DOJXQV FDVRV KRXYH RIHQVDV YHUEDLV H ItVLFDV 2XWUD YDULiYHO TXHVWLRQDGD jV FULDQoDV IRL VRE 34 delas disseram que a eliminação do piolho se dÆ pelo uso de shampoo para piolhos, 89 GLVVHUDP TXH HUD SRU XVR GH SHQWH ÀQR FDWDomR FL a melhor forma de eliminação, e nove responderam que a eliminação se dÆ por shampoo/ SHQWH ÀQR FDWDomR 4XDQWR j YDULiYHO VREUH TXHP G com piolho, 99 relataram que a descoberta veio pelos pais, dois foram descobertos pelos professores, dois pelos amigos, 11 por outras pessoas como tios e avós e 33 nªo souberam UHVSRQGHU

De acordo com o questionÆrio aplicado aos professores foi relatado que os pais eram FRPXQLFDGRV LQGLYLGXDOPHQWH VREUH D LQIHVWDomR SDLV OHYDU RX QmR RV ÀOKRV j HVFROD GXUDQWH R WUDW da criança portadora de SHGLFXORVH RV SURIHVVRUHV UHODWDUDP irritadas, inquietas e notava-se alteração de humor e em relação ao desempenho escolar, REVHUYRX VH TXH KRXYH XPD EDL[D QDV QRWDV GXUDQWH

DISCUSSÃO

Pediculus capitis, popularmente conhecido como piolho, desenvolve o seu ciclo de vida na cabeça do ser humano e alimentando-se de sangue (BERENJI, MARVI-02*+$'$0 0(,%2', (VVHV HFWRSDUDVLWRV WrP GHVHQ pediculose, uma doença DV P D TXH DFRPHWH FRP PDLRU IUHTXrQFLD FULDQoDV (VVD GRH em saúde pública, pois além dos desconfortos gerados no hospedeiro, podem causar lesões pelas mordidas, podendo ser porta de entrada para bactérias e fungos, e causar GLYHUVDV GRHQoDV GH RULJHP VHFXQGiULDV 6$1726 HW DOpP GH VHU FRQVLGHUDGR SUREOHPD VRFLDO RX EXOO\L

De acordo com o histórico sobre a doença causada pelo piolho, nossos dados apontam para 17,70% de positividade entre 147 crianças na faixa de quatro a 12 anos de idade matriculadas em duas escolas cidade de `guas Lindas de GoiÁs, no entorno GR 'LVWULWR)HGHUDO QR DQR GH 8P HVWXGR UHL colaboradores (2011), na cidade de Manaus AM, também constatou uma prevalência de 18,5% para pediculose positivo em alunos de creches e escolas públicas, corroborando DVVLP RV UHVXOWDGRV HQFRQWUDGRV QHVWH HVWXGR

Existe um grande número de crianças em idade escolar e, às vezes, adultos de WRGDV DV FODVVHV VRFLDLV FRP DOWDV GHQVLGDGHV G 2V SULQFLSDLV IDWRUHV GH ULVFRV UHODFLRQDGRV resistência do P. capitis aos inseticidas usuais, aglomerados de crianças em sala de aula, KiELWR FXOWXUDO GH DEUDoRV HQWUH FULDQoDV H XVR G

6HJXQGR GDGRV GD OLWHUDWXUD /,1$5', HW DO MEIBODI, 2014) crianças do gênero feminino sã o mais suscetíveis a infestação, por terem R FRPSULPHQWR GRV FDEHORV PDLRUHV (VWXGRV VHPHOH mostraram que de 293 crianças de uma escola em Sã o Leopoldo, 24% dos alunos que HVWDYDP FRQWDPLQDGRV VHQGR PHQLQDV H PHQLQ RV GDGRV GR HVWXGR &RP UHODomR DR JrQHUR IRL YH GRV PHQLQRV HVWDYDP FRP SLROKRV VHQGR D LQI HQWUH DV PHQLQDV GD IDL[D HWiULD GH VHLV D RLWR D por Borges-Moroni (2011) diferem dos encontrados nesta pesquisa, pois mostraram maior SUHYDOrQFLD HP PHQLQDV PDV QD IDL[D HWiULD HQWUH

Nos resultados encontrados no estudo com relação aos sintomas clínicos foi REVHUYDGR TXH UHODWDUDP FRFHLUD QD FDEHoD GRUPLU H GLÀFXOGDGH GH FRQFHQWUDomR GXUDQWH D GHVFULomR GH 'RPLQJXHV HW DO TXH UHDOL]RX SDLV GH FULDQoDV IRUDP HQWUHYLVWDGRV H DÀUPD afetado quando estava com SHGLFXORVH /LQDUGL HW DO pediculose FRP

Ø um problema recorrente na populaçªo mundial, acometendo, sobretudo crianças em
LGDGH HVFRODU H TXH LQ`XHQFLD QR UHQGLPHQWR HVFR
SHOR SUXULGR FRQWLQXR QD FDEHoD H GLVW~UELRV QR V
GLÀFXOGDGH GH FRQFHQWUDomR

Outros problemas relacionados com a pediculose Ø que esses insetos podem ser origem de outras doenças como: tifo exantemÆtico causado pela Rickettsia prowazeki, febre das trincheiras causado pela Bartonella quintana (Rachalimaea quintana), e a febre recorrente induzida pela Borrelia recurrentis 2 WLIR H[DQWHPiWLFR H WUDQVP
HVPDJDPHQWR GRV SLROKRV $ IHEUH UHFRUUHQWH p WUD
HQWUH RV GHGRV H GHQWHV $ IHEUH GDV WULQFKHLUDV p
QR FRUSR $ SLFDGD GRV LQVHWRV SURYRFD XPD GHUPDW
GR KRVSHGHLUR j VDOLYD LQMHWDGD DR LQtFLR GD KHPDW
a arranhar a pele, abrindo a porta de entrada para outros microorganismos patogŒnicos
:,/.(HW DO +(8.(/%$&+ HW DO 1Ô1&,2 $/9(6

Sªo caracterizadas por prurido, irritaçªo da pele ou do couro cabeludo e infestações
HVWDÀORFyFLFDV VHFXQGiULDV LPSHWLJR SRGHQGR WDO
VDWpOLWH H DORSpFLD (P FDVRV PDLV JUDYHV TXDQGR L
associadas a mÆs condições sociais e dietas inadequadas, as crianças ectoparasitados
SRGHP DSUHVHQWDU VH TXDGUR GH DQHPLD GHYLGR GHÀFL
GH VDQJXH GXUDQWH D KHPDWRIDJLD /,1$5', HW DO

Relatos da literatura sugerem que em casos mais graves de pediculose, as crianças podem desenvolver anemia, devido à alta taxa de hematofagia realizada pelo piolho, porØm, dentro do grupo de crianças positivas para pediculose (26 casos) encontrada nesta pesquisa, somente trŒs crianças apresentavam o nœmero de hemÆcias diminuídos, ou
VHMD HVWDYDP FRP XP JUDX OHYH GH DQHPLD /,1$5', H
As demais crianças portadoras de anemia mas negativas para pediculose, pode serem portadoras de outras doenças que tambØm induzem anemia como infecções por parasitos
:$/&+(5 3('5262)5,==2 RX GHYLGR D FDUrQFLDV QXW

Em uma pesquisa realizada durante quatro anos consecutivos em Marseille na
)UDQoD SRU XP JUXSR GH SURÀVVLRQDLV GD VD~GH FRP
estavam tinham SHGLFXORVH 2EVHUYDUDP QHVVHV pediculose
FRP HRVLQRÀOLD %52848, HW DO (VVHV UHVXOW
encontrados em nossa pesquisa, quando constatamos que dentre os alunos positivos para
SHGLFXORVH FLQFR WDPEpP DSUHVHQWDYDP HRVLQRÀOLD
'DV FULDQoDV DYDOLDGDV GHODV DÀUPDUDP WHU
LQIHVWDGRV SRU SLROKRV (VVHV UHVXOWDGRV FRUURERU
'RPLQJXHV H FRODERUDGRUHV TXH DÀUPDP TXH PXLW
pelos colegas e isso afeta a autoestima delas, podendo portanto, ser a causa do baixo
DSUHQGL]DGR H DEDQGRQR GD HVFROD 1(9(6

&RP UHODomR DR WUDWDPHQWR QD SHVTXLVD GH)UD
infestadas relataram que 73% delas utilizaram a cataçªo como modo de eliminar os piolhos
H RXWURV GL]HP XWLOL]DU SURGXWRV OtTXLGRV FRPP
sendo que, do total geral da pesquisa 80% disseram utilizarem os dois meios ao mesmo
WHPSR (VVHV UHVXOWDGRV FRUURERUDP FRP RV QRVVRV
a utilizaçªo de shampoo e outras 89 disseram que a melhor forma de se livrarem do piolhos
VHULD XVDU RV GRLV PpWRGRV HP FRQMXQWR

2V UHVXOWDGRV GR QRVVR HVWXGR FRQÀUPDP RV GDG
entre alteraçes hematológicas, baixo rendimento escolar e pediculose em crianças em
LGDGH HVFRODU 'H SRVVH GHVVHV GDGRV VDOLHQWDPR
GH PHGLGDV GH SUHYHQomR SURÀOD[LD H HGXFDomR VDG
pedículos, usando mØtodos extremamente simples e de baixo custo, porØm frequentemente
QHJOLJHQFLDGR SHORV SDLV RX UHVSRQViYHLV QR %UDVL

CONCLUSÕES

3HGLFXORVH p LQ`XHQFLDGD SRU IDWRUHV FRPR Jr
DPELHQWHV FROHWLYRV RX VHMD HP DJORPHUDo}HV TXH
segundo os resultados encontrados a faixa etÆria mais acometida foi entre seis e oito anos
e em meninas, sendo portanto o gŒnero feminino mais suscetível a SHGLFXORVH

No estudo encontramos uma correlaçªo positiva entre pediculose e alteraçes
hematológicas como: baixa nos níveis de hemÆcias circulantes e aumento na contagem de
HRVLQyÀORV HRVLQRÀOLD

Os sintomas da pediculose apresentados pelas crianças sugerem que o baixo
UHQGLPHQWR HVFRODU SDUHFHP HVWDU GLUHWDPHQWH UH

Nota-se que as crianças participantes do estudo tinham conhecimento sobre as
formas de precauçªo e tratamento para a pediculose, ectoparasitose que atinge milhıes de
SHVVRDV QR PXQGR (VVH IDWR PRVWUD D QHFHVVLGDGH G
para a populaçªo como um todos, visando àdiminuiçªo das infestaçes por mudanças de
KiELWRV HQWUH DV SHVVRDV H UHWLUDGD GRV SLROKRV

REFERÊNCIAS

$/%$6+7$:< 0 +$61$) 3HGLFXORVLV FDSLWLV DPRQJ SULPDU\ VFK
*RYHUQRUDWH -RUGDQ 0 (0+- Y Q

%$5%26$ 9 - 3,172 = 7 3HGLFXORVH QR %UDVLO ,Q (QFXHQWUR 1
9HWHULQDULD ,, 5LR GH -DQHLUR 5HY (QWRPRO 9HFW Y

%(5(1-,) 0$59, 02*+$'$0 1 0(,%2', 3 1 $ 5HWURVSHFWLYH VWXG
SDWLHQWV UHIHUUHG WR LPDP UH]D KRVSLWDO RI 0DVKKDG ,UDQ

%25*(6 02521, 5 0(1'(6 - -867,1,$12 6 & % %,1'É $ * / +HDG /L
FKLOGUHQ LQ GD\ FDUH FHQWHUV DQG VFKRROV RI 0DQDXV $PD]RQ
6D~GH 3~EOLFD Y Q S

%52848, 3 HW DO (FWRSDUDVLWLVP DQG 9HFWRU %RUQH 'LVHDVH
0DUVHLOOHV 0HGLFLQH 0DUVHLOOHV)UDQFH Y Q S

%85.+$57 & 1)RPLWH WUDQVPLVVLRQ ZLWK KHDG OLFH D FRQWLQ

&$03/, (' HW DO $FWLYLW\ RI WHD WUHH RLO DQG Pediculus humanus capitis KHDG OLFH DQG LWV HJJV 3DUDVLWRO 5HV Y S †

&$55(5$ 0 ,QVHWRV GH LQWHUHVVH PpGLFR H YHWHULQiULR &XUL

'20,1*8(6 (* HW DO 2 SLROKO QD VDOD GH DXOD 'HSDUWDPHQWR
%RWXFDWX 63

)5$1&(6&+, $ 7 HW DO 'HVHQYROYHQGR HVWUDWpJLDV SDUD R FR
5HY $36 3RUWR $OHJUH 56 Y Q S †

),*8(,5('2 7, & 3HGLFXORVH 7UDEDOKR DSUHVHQWDGR j 8QLYHUVL
GRV UHTXLVLWRV SDUD D REWHQomR GR JUDX GH 0HVWUH HP &LrQF
3HVVRD /LVERD 3RUWXJDO

)5(,7$6 ' 5 - HW DO 3HGLFXORVH XP SUREOHPD VD~GH S~EOLFD
JHUDomR GH FRQKHFLPHQWR QDV FLrQFLDV PpGLFDV (G $WHQDV

*$%$1,) / HW DO Pediculose nos centros de educação infantil: conhecimentos e práticas dos
WUDEDOKDGRUHV (VF $QD 1HU\ 5HY (QIHUP Y Q S

+(8.(/%$&+ - HW DO (FWRSDUDVLWRVHV H VD~GH S~EOLFD QR %U
3~EOLFD 5LR GH -DQHLUR Y Q

+XPDQ 6NXOO &OLSDUW 3LFWXUH -XOKR 'LVSQtYHO HP KWWS
VNXOO FOLSDUW SLFWXUH JLI SQJ LPDJH $FHVVR HP $JRVWR

-$186 - 02(56&+(/ 6 . (YDOXDWLRQ RI DQHPLD LQ FKLOGUHQ $P

.29$/,&=1 5 $ HW DO $YDOLDomR GD $WLYLGDGH Pediculus humanus capitis DE Cerambycidae
cutânea aguda de soluções hidroglicólicas contendo Ruta graveolens L. Revista Brasileira de FarmÁcia,
3RQWD *URVVD 35 Y Q S

.29$/,&=1 5 $ HW DO 6REUHYLYrQFLD GR 3HGLFXORV FDSLWLV VR
3DWRORJLD 7URSLFDO DQDLV GR ;; &RQJUHVVR %UDVLOHLUR GH 3

/,1$5', 3 0 HW DO $OJXQV IDWRUHV HSLGHPLRORJLFRV UHODWLYR
FDSLWLV $QRSOXUD 3HGLFXOLGDH HP %HORHRUL]RQWH H UHJLmR 0HWU
S

/,0$ 1 5 : *20(6 6 $ 2)(55(,5$ 3 0 3LROKR 5HY &LrQFLD (OHP

0$*$/+fi(6 . 3 3 6,/9$ - % $ LQIHVWDomR SRU SHGLFXORVH H R HQ
6D~GH H 3HVTXLVD Y Q S

0285$ 0 (6 &267$ 6 0 %$6726 6 1 ' (SRU IODU HP SLROKR R
da educação infantil de capitão poço-parÆ? In: Encontro nacional de ensino de ciŒncias da saœde e do
DPELHQWH ,9 1LWHUyL 5-

1(9(6 ' 3 HW DO 3DUDVLWROORJLD KXPDQD HGLomR %HOR +RU

1Ô1&,2 0 6 $/9(6 0 - 'RHQoDV DVVRFLDGDV D DUWUySRGHV YHWRU
6D~GH 'RXWRU 5LFDUGR -RUJH ,3 /LVERD

181(6 6 & % HW DO %LROORJLD H HSLGHPLROORJLD GD SHGLFXORVH
$0 Y Q S

5(< / 3DUDVLWROORJLD HG (G *XDQDEDUD .RRJDQ 5LR GH -DQ

5,%(,52 1 5 5 HW DO ,GHQWLÀFDQGR D SUHVHQoD GH SHGLFXORVH
&RQJUHVVR %UDVLOHLUR GH (QIHUPDJHP (QIHUPDJHP KRMH FRUDJ
VHU *UDPDGR † 56

58,= (& 'HWHUPLQDFLyQ DQHPLD \ SDUDVLWRVLV HQ QLxRV HVFRO
SRPSH\D GHO &DQWyQ 5LREDPED 7HVLV SUHVHQWDGD FRPR UH
GH PDJtVWHU HQ %LRTXtPLFD &OtQLFD 8QLYHUVLGDG GH *XD\DTXLO
'HVDUURROOR *XD\DTXLO (FXDGRU

6$1726 / 2 *21d$/9(6 5 * 2V SLROKRV GD FDEHoD 3KWKLUDSWHUD
PmHV H ÀOKRV XVXiULRV GH SRVWRV GH DVVLVWrQFLD QR 'LVWULWR F

6$1726 6 0)RUPDomR GH SURIHVVRUHV UH`H[mR HP UHODomR DRV
pela SHGLFXORVH H HQWHURELRVH DRV HVFRODUHV GR HQVLQR IXQG
,QVWLWXWR 2VZDOGR &UX] FRPR SDUWH GRV UHTXLVLWRV SDUD RE
GH -DQHLUR

6,/9$ * 6 (FXUVR GLGiWLFR VREUH D SHGLFXORVH KXPDQD QD SHUV
apresentado ao Curso de CiŒncias Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco, Centro
$FDGrPLFR GH 9LWyULD FRPR UHTXLVLWR SDUD D REWHQomR GR W
9LWyULD GH 6DQWR $QWmR

7$33(+ . + HW DO Pediculosis capitis among Primary School Children and Related Risk Factors in
8UPLD WKH 0DLQ &LW\ RI :HVW $]DUEDLMDQ ,UDQ - $UWKURSRG %

85e%e7e - 1 0 $ SHGLFXORVH HQWUH RV ;DYDQWH HSLGHPLRORJLD
(Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal do Mato Grosso, Campus UniversitÆrio do
$UDJXDLD ,QVWLWXWR GH &LrQFLDV %LROyJLFDV H GD 6D~GH %DU

:$/&+(5 ' / 3('5262 ')5,==2 0 1 $VVRFLDomR HQWUH SDUDVLWRV
GR KHPRJUDPD 5HY 0LUDQWH †)RFRV &(1&2 Y Q S

:,/.(7 HW DO 6FDELHV SHGLFXORVLV WXQJLDVLV DQG FXWDQHR
QRUWKHDVW %UD]LO $FWD 7URS Y VXSO S 6

:25/' +($/7+ 25*$1,=$7,21 +HPRJORELQ FRQFHQWUDWLRQV IRU WKH C
DVVHVVPHQW RI VHYHULW\ 9LWDPLQ DQG PLQHUDO QXWULWLRQ LQ
2UJDQL]DWLRQ

:25/' +($/7+ 25*$1,=$7,21 ,URQ 'HÀFLHQF\ $QHPLD DVVHVVPHQW SU
JXLGH IRU SURJUDP PDQDJHUV *HQHYH :+2

:25/' +($/7+ 25*$1,=$7,21 :+2 $QWKUR VRIWZDUH DQG PDFURV

CAP´´TULO 11

BANHO DE SOL PARA PACIENTES INTERNADOS: UMA ESTRATÉGIA DE HUMANIZA˙ˆO

Data de submisªo: 10/01/2022

Viviane da Conceiçªo Carius Comym
Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Janaína Mengal Gomes Fabri
Universidade Federal Fluminense
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Eliane Ramos Pereira
Universidade Federal Fluminense
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva
Universidade Federal Fluminense
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Adriana Matos Pereira
Universidade Federal Fluminense
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Regina da Cruz Garofalo
Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Joice Cesar de Aguiar Barbosa
Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Daniele de Amorim Pires Moreth
Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Anna Cristina de Freitas
Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

Paula de Rezende Galino Alves do Amaral
Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
Rio de Janeiro-RJ
K W W S O D W W H V F Q S T E U

RESUMO: O ambiente físico pode ser responsÆvel pelo desenvolvimento de distœrbios psicológicos, pela desorientaçªo e privaçªo G H V R Q R 6 R P D P V H D L V V R decorrentes da internaçªo hospitalar, entre as quais se destacam o afastamento do doente do convívio do lar, das atividades cotidianas de lazer e laboral e a introduçªo de novos K i E L W R V L Q ` X H Q F L D Q G R G L U H P H Q W D O $ W H U D S L D G H E D Q K R pela exposiçªo a luz solar, alØm de aliviar os efeitos emocionais decorrentes do processo de internaçªo hospitalar, contribui para manutençªo

dos níveis sØricos de vitamina D, responsÆvel pelo metabolismo da insulina; regulaçªo do metabolismo de minerais e do sistema imunológico, cardiovascular e musculoesquelØtico e nos níveis sØricos melatonina e serotonina, contribuindo assim com a melhora do estado
GH KXPRU 1HVWD Objetivo Geral LQWHUYHQ WLU VREUH RV EHQHItFLRV SDUD SDFLHQWHV WUDXPDWL]DGRV GHVFULWLYR Resultados: WDWLYR Estratégias de Humanizaçªo em Saœde sªo essenciais para reabilitaçªo e recuperaçªo dos SDFLHQWHV LQWHUQDGRV $ OLWHUDWXUD UDWLÀFD UHSHU atravØs da prÆtica regular do banho de sol A exposiçªo solar reduz os efeitos psíquicos da LQWHUQDomR SURORQJDGD H Conclusão: Evidencia-se a necessidade GR FRQKHFLPHQWR DFHUFD GHVWD HVWUDWpJLD GH KXPDQ
PALAVRAS-CHAVE: Banho de Sol; Humanizaçªo da AssistŒncia; Hospitalizaçªo; 'HÀFLrQFLD GH 9LWDPLQD '

SUNBATHING FOR HOSPITALIZED PATIENTS: A HUMANIZED STRATEGY

ABSTRACT: The physical environment can be responsible for the development of SV\FKRORJLFDO GLVRUGHUV GLVRULHQWDWLRQ DQG VOH LPSOLFDWLRQV DULVLQJ IURP KRVSLWDOL]DWLRQ DPRQJ Z IURP OLYLQJ DW KRPH IURP GDLO\ OHLVXUH DQG ZRUN DFW GLUHFWO\ LQ`XHQFLQJ PHQWDO KHDOWK 6XQEDWKLQJ WKHU in addition to alleviating the emotional effects resulting from the hospitalization process, contributes to the maintenance of serum levels of vitamin D, responsible for the metabolism of insulin; regulation of the metabolism of minerals and the immune, cardiovascular and musculoskeletal system and in the serum levels of melatonin and serotonin, thus contributing WR DQ LPSURYHPHQW LQ WKH PHQWDO Purpose: RQG Generally, objective LV HW WR UHF WLFW RQ EHQHÀWV RI VXQEDWKLQJ IRU Methods: SHUFXOLQJ GDWDEDVHV DQG WLXHDQWL W DV VWXGLHV Results: Health Humanization Strategies are essential for the rehabilitation and UHFRYHU\ RI KRVSLWDOL]HG SDWLHQWV 7KH OLWHUDWXUH DQG PHQWDO KHDOWK WKURXJK WKH UHJXODU SUDFWLFH R SV\FKRORJLFDO HIIHFWV RI SURORQJHG KRVSLWDOL]DWLRQ Conclusion: 7KH GLVVHPLQDWLRQ RI NQRZOHGJH DERXW WKLV SURPRWLRQ RI ZHOO EHLQJ LV UHOHYDQW
KEYWORDS: Sunbathing; Humanizaçªo of Assistance; Hospitalization; Vitamin D 'HÀFLHQF\

INTRODUˆO

Este capítulo traz um olhar sobre a terapia do %DQKR GH 6RO RX VHMD a luz solar como estratØgia de humanizaçªo para pacientes internados na Ortopedia, apontando os aspectos que envolvem a internaçªo prolongada assim como os benefícios UHODFLRQDGRV j VD~GH ItVLFD H PHQWDO

A organizaçªo foi pensada em trŒs partes, sendo a primeira o reconhecimento das consequŒncias da internaçªo prolongada e os fatores geradores de sofrimento, a segunda a abordagem da Humanizaçªo em instituiçes de saœde e a terceira as questões

relacionadas àpromoçªo da saœde física e mental a partir do %DQKR GH VROAspectos da Internaçªo Prolongada

O ambiente físico pode ser respons Ævel pelo desenvolvimento de distœrbios psicológicos, desorientaçªo no tempo e no espaço e privaçªo de sono causado por UXtGRV H LQWHUUXSo}HV FRQVWDQWHV 1HVWH DSHFWR que promovam o bem-estar durante a internaçªo, como a criaçªo de espaços saud Æveis, DFROKHGRUHV H FRQIRUWiYHLV

A literatura aponta que os serviços de qualidade preocupam-se com a excelŒncia no DWHQGLPHQWR H D KXPDQL]DomR GR FXLGDGR ·+XPDQL]DomR FRPSURPLVVR HQWUH HTXLSHV H XVXiULRV GRV VLVWHPDV $FUHGLWD VH TXH QR KRVSLWDO R DFROKLPHQWR DGT reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saœde (BRASIL, \$hospitalizaçªo ocorre quando o usu Ærio do sistema de saœde necessita de terapŒutica e cuidados mais complexos, o que o torna vulner Ævel tanto no nível físico TXDQWR HPRFLRQDO 6RPDP VH D LVVR DV LPSOLFDo}HV G entre as quais se destacam o afastamento do doente do convívio do lar, dos amigos, das VXDV DWLYLGDGHV FRWLGLDQDV GH OD]HU H ODERUDLV 0 Novos hÆbitos e esquemas de vida s ªo incorporados em sua vida e algumas vezes GH IRUPD DEUXSWD (VVDV GLÀFXOGDGHV VXUJHP WDQWR S TXH DWXDP FRPR DFRPSDQKDQWHV GXUDQWH HVVH SURFH internado sozinho sem a presença de acompanhantes, dividindo o espaço com pessoas HVWUDQKDV R HVWUHVVH p DJUDYDGR 'XUDQWH D LQWH procedimentos muitas vezes invasivos e constrangedores e às vezes sem a perspectiva de FRQFOXVmR GR WUDWDPHQWR 0\$5,1+2 HW DO

Em nosso cotidiano, podemos acompanhar os efeitos psíquicos da hospitalizaçªo por tempo prolongado decorrente da fragilidade e dos aspectos estressores de quem est Æ IRUD GH VHX DPELHQWH 1D RUWRSHGLD XP JUDQGH SHU tratamento para osteomielite crônica, condiçªo que impıe, via de regra, uma internaçªo de longa permanŒncia, sem a garantia de resoluçªo plena do quadro, e com a possibilidade GD SHUGD GR PHPEUR LQIHFWDGR

1RV FDVRV GH SURFHGrQFLD FRQWDWR R FRQÀQDPH VROLGmR H DEDQGRQR SRLV HVVHV SDFLHQWHV VmR LPSH GH HYLWDU D SURSDJDomR GRV JHUPHV PXOWLUUHVLVWHQ Muitas vezes, a hospitalizaçªo n ªo representa benefícios na percepçªo do paciente H SRGH VHU VHQWLGD FRPR XPD H[SHULrQFLD QmR GHVHJ perceber que o tratamento de uma doença implica em ameaças à integridade física, acarretando angœstia, ansiedade, reduzindo a aderŒncia ao tratamento e propiciando FRQ`LWRV LQWHUSHVVRDLV 2XWUR DVSHFWR D VHU FRQ

momentos da internaçªo tanto em razªo da própria doença quanto relacionada a algum
SURFHGLPHQWR RX QR SyV FLU~UJLFR 2 PDQHMR FRUUHW
p LPSUHVFLQGtYHO SDUD GLPLQXLU D FDUJD HPRFLRQDO Q
1R SHUtRGR GD 3DQGHPLD GD &29,' D VHQVDomR G
com o distanciamento social proposto atravØs de XP FRQMXQWR DPSOR GH P
evitar a propagaçªo do vírus, o que incluiu impedimento de qualquer tipo de aglomeraçªo;
manutençªo da distância, nos espaços pœblicos; uso preventivo de mÆscaras de proteçªo;
H UHVWULomR D YLVLWDV D SDFLHQWHV LQWHUQDGRV QD

EstratØgias de Humanizaçªo

Humanizar Ø atribuir carÆter humano a; conceder ou possuir condiçªo humana;
WRUQDU VH EHQpÀFR ID]HU FRP TXH VHMD WRGR VLVWHPD ,V
j VD~GH HP DPELHQWH KRVSLWDODU VLJQLÀFD RIHUWDU D
avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das
FRQGLo}HV GH WUDEDOKR GRV SURÀVVLRQDLV

AlØm de promover a integraçªo entre mente e corpo, e criar a concepçªo de
um novo paradigma, devemos ter prÆticas que considerem a pessoa de forma integral,
YDORUL]DQGR RV DVSHFWRV KLVWyULFRV VXEMHWLYRV
H FRUUHVSRQVDELOL]DomR GRV VXMHLWRV HQYROYLGRV
VD~GH GHYHP VHU LQFHQWLYDGRV 6,/9$ HW DO 4XDO
mente e corpo, estamos cuidando do todo que Ø o ser humano considerando-se que corpo
expressa a si, ao expressar sua percepçªo do mundo, pois o corpo tem sentido conforme
VXD SHUFHSomR GR PXQGR WHP VHQWLGR RX VHMD RV
LPEULFDGRV 5(,6

Para o MS, um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadª de
GLUHLWRV H YDORUL]D H LQFHQWLYD VXD DWXDomR QD SU

A Política Nacional de Humanizaçªo, apresentou como proposta o fortalecimento
de medidas e estratØgias de acolhimento visando a efetivaçªo dos princípios do Sistema
ÔQLFR GH 6D~GH 686 5HDÀUPDU H DVVHJXUDU RV SULQFtS
e equidade na assistŒncia, torna-se cada vez mais atual, a medida que este conceito
SHUSDVVD D VD~GH H VH ID] SUHVHQWH QRV SURFHVVRV
HVWUDWpJLDV GH KXPDQL]DomR FRPR SURPRWRUDV GH DGH
na obtençªo de resultados positivos, assim como melhor adesªo ao regime terapŒutico
SURSRVWR QR kPELWR GD VD~GH '25,&&, /25(1=,

Assim, ressaltamos a Humanizaçªo como um meio de fortalecimento da relaçªo
HQWUH SURÀVVLRQDO GH VD~GH H SDFLHQWH $ UHODomR
KXPDQL]DomR UDWLÀFD R YtQFXOR WHUDSrXWLFR QR TXD
H D DXWRQRPLD QR SURFHVVR VD~GH GRHQoD 1$&,0(172

sªo fundamentais para o processo terapŒutico, reiterando a importância da abordagem holística e integralizada, ressaltando a pessoa na sua dimensªo física, mental, emocional H HVSLULWXDO $6681dfi2)(55(,5$ HW DO

EstratØgias de Humanizaçªo em Saœde sªo essenciais para reabilitaçªo e UHFXSHUDomR GRV SDFLHQWHV LQWHUQDGRV 2 DPELHQW desencadear sentimentos negativos, como estresse, medo e angœstia, visto que, na maioria das vezes, o motivo da internaçªo se dÆ por situaçes complicadas relacionadas à PRUELGDGH)(55(,5$ HW DO 5Ô2 HW DO

Tomando como base essas assertivas, Ø possível dizer que ao cuidarmos do todo que Ø o ser humano, estamos cuidando de uma unidade indivisa do corpo e das coisas, que GHVFRQKHFH D UXSWXUD UH`H[LYD HQWUH VXMHLWR H REM

e VHQVR FRPXP TXH DV XQLGDGHV KRVSLWDODUHV VI medo, angustias e incertezas, por estar em geral associadas a debilidade na saœde, a limitaçªo de mobilidade e autocuidado e consequente diminuiçªo da autonomia para GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GH YLGD GLiULD estruturas organizacionais, associada aos mœltiplos processos assistenciais e mœltiplos DWRUHV HQYROYLGRV QHVVHV SURFHVVRV KXPDQL]DU WRU prÆtica complexa, Ø algo que precisa ser inserido no contexto hospitalar de forma gradual, DEVRUYLGR SHORV SURÀVVLRQDLV FRPR XPD FXOWXUD DVVI GH QRYRV SDUDGLJPDV H SUHIHUHQFLDOPHQWH FRP SDUWI SDFLHQWHV QD EXVFD GH VROXo}HV SUiWLFDV H DGHTXDG

$ KXPDQL]DomR SRVVLELOLWD TXH R SDFLHQWH QmR V de um tratamento mØdico, mas como aquele que necessita participar de um processo de FXUD 'HVWH PRGR DWHQXD DV FRQVHTXrQFLDV GR HVWUHVVH, SURFH ansiedade, medo, alØm do sofrimento físico resultantes dos procedimentos mØdicos e da URWLQD KRVSLWDODU GHVJDVWDQWH

1D KXPDQL]DomR p SRVVtYHO DGHQWUDU HP XPD HVWp estØtico Ø, sobretudo espaço de transcendŒncia, espaço de incompossibilidades, de HFORVmR GH GHLVFrQFLDV H QmR XP HVSDoR REMHWLYR mundo estØtico e nªo da razªo ou da consciŒncia que se funda ou institui o universo da H[SUHVVmR FRPR R SULPHLUR HVWDEHOHFLPHQWR GD UDFI

Considera-se a humanizaçªo como uma prÆtica capaz de auxiliar na gestªo dos serviços e na qualidade da assistŒncia prestada em todas as instâncias do Sistema Único GH 6D~GH 686 3DUD DOpP GD DVVLVWrQFLD KRVSLWDODU doenças, as unidades hospitalares devem estar atentas àpromoçªo de saœde, ao cuidado espiritual e mental do indivíduo e tambØm àgarantia de seus direitos e a manutençªo de sua GLJQLGDGH e SUHFLVR FRQVLGHUDU TXH QD PHGLDomR FR D LQWHUVXEMHWLYLGDGH FRPR LQWHUFRUSRUHLGDGHQR F

A observância destes fatores pode impactar na reduçªo do tempo de hospitalizaçªo

e consequentemente na redução de custos, além de proporcionar uma experiência
FRQIRUWiYHO H PHQRV WUDXPiWLFD SDUD R SDFLHQWH H V

Énesse sentido que a rotina do Banho de Sol ganha relevância, uma vez que propicia ao paciente de longa permanência a possibilidade de atenuar os efeitos negativos inerentes da KRVSLWDOL]DomR 3RU PHLR GR %DQKR GH 6RO Ø SRVVtYHO DWHQXDU GR
EHQHItFLRV VXEMHWLYRV JHUDGRV SHOD TXHEUD GD URWL
RXWURV HVSDoRV

Benefícios do Banho de Sol

3HVTXLVDV DFHUFD GRV EHQHItFLRV GD H[SRVLomR V
ORQJR SHUtRGR 2 GHEDWH FLHQWtÀFR DERUGDYD RV ULV
SHOH HP GHFRUUrQFLD GD H[SRVLomR VRODU (QWUHWDQ
necessário a exposição solar excessiva e frequente ao longo da vida, em contrapartida para se obter todos os benefícios bastam 15 minutos 2 a 3x na semana de banho de sol
.(11('< .52// <281*

1RV ~OWLPRV DQRV D FRPXQLGDGH FLHQWtÀFD YHP D
EDQKR GH VRO UHJXODU &8< *(/'(1+8<6 9$1 '(5
A luz solar, além de aliviar os efeitos emocionais decorrentes do processo de internação hospitalar por longa permanência, agravada durante a pandemia da COVID 19, contribui
SDUD PDQXWHQomR GRV QtYHLV VpULFRV GH YLWDPLQD ' A vitamina D Ø responsável por diversas funções exercidas no organismo humano, dentre os quais se destacam o metabolismo da insulina, minerais, em especial o cálcio;
UHJXODomR GR VLVWHPD LPXQROyJLFR FDUGLRYDVFXODU
9$1 '(5 5+((

Pessoas com baixos níveis de vitamina D apresentam maior risco de apresentar
VLQWRPDV GHSUHVVLYRV $ GHSUHVVmR HVWi HQWUH RV
H WHP XP LPSDFWR QHJDWLYR QD VD~GH H QD TXDOLGDG
DXPHQWD R QtYHO SODVPiWLFR GH FLWRFLQDV LQ`DPDWyU
pode neutralizar a depressão &8, HW DO 9$1 '(5 5+((

$WXDOPHQWH VXD GHÀFLrQFLD p YLVWD FRPR XP SUR
R PXQGR H p SUHYDOHQWH HP LGRVRV .8/,(HW DO
se que a proporção de idosos está aumentando e com isso com o nœmero de fraturas de quadril, sobrecarregando economicamente os sistemas de saœde, pois requer internação
KRVSLWDODU H HP DOJXQV FDVRV SURORQJDGD 6$0%5 22.
6HJXQGR 6$5$,9$ HW DO SDFLHQWHV LQVWLWXF
YH]HV PDLRU GH TXHGDV FRP IUDWXUDV $ H[SRVLomR DR
FRPR XP LPSRUWDQWH IDWRU GH SURWHomR SDUD IUDWX
a prevenção de doenças de pele - psoríase, eczema, vitiligo, acne; redução do risco de câncer - colorretal, mama, próstata, linfoma não Hodgkin; aumento dos níveis séricos de

YLWDPLQD ’ SUHYHQomR GR $O]KHLPHU GHPrQFLD H GHS
5+((

(P XP HVWXGR FRP XQLYHUVLWiULRV FKLQHVHV IR
H[SRVLomR VRODU D XP HVFRUH GH GHSUHVVmR PDLV EDL[R
DWLYLGDGHV DR DU OLYUH FRP H[SRVLomR j OX] VRODU Vm
SDUD SDFLHQWHV FRP GHSUHVVmR OHYH D PRGHUDGD ;8
vitamina D sªo extremamente necessÆrios para o bom funcionamento do organismo, considerando que a melhor fonte de Ø o sol (MARQUES, 2010), a Rotina de Banho de Sol
p GH JUDQGH UHOHYkQFLD SDUD RV SDFLHQWHV LQWHUQDG

Os benefícios da exposiçªo solar vªo muito alØm da vitamina D, auxilia a
LPXQRPRGXODomR D IRUPDomR GH y[LGR QtWULFR PHODWR
RV UHOyJLRV FLUFDGLDQRV H VXSULPH VLJQLÀFDWLYDPHQ

*(/’(1+8<6 $ PHODWRQLQD p SURGX]LGD D SDUWL
SLQHDO $ OX] QRUPDOPHQWH LQLEH D VHFUHomR GH PHOD
GLD H DWLQJH R SLFR W DQRLWH Hospitalização, Banho de Sol e Ritmo Circadiano
DSUHVHQWDP QtYHLV EDL[RV GH PHODWRQLQD 6+1+$1

Outro hormônio regulador circadiano bem conhecido, o cortisol, Ø relatado como elevado em resposta a estímulos externos, como internaçªo hospitalar e cirurgia O cortisol alto Ø responsÆvel pela sintomatologia do estresse, depressªo, fadiga e cansaço (SCHEER,
:(67

Deste modo, hospitalizaçªo e a interrupçªo do ritmo circadiano apresentam
FRQVHTXrQFLDV QHJDWLYDV DR SDFLHQWH (VVD FRPELQD
GR VRO VXMHLWD RV D PXLWDV KRUDV GH OX] DUWLÀFLDO
GH KRVSLWDLV :(67

Para reduzir os efeitos negativos da internaçªo, considera-se a proposta do banho
GH VRO FRPR SURPRWRUD GH EHP HVWDU 6XJHUH VH TXH
livre preferencialmente antes das 10 horas e após as 16 horas (YOUNG, 2009; XU, et al,

2 EDQKR GH VRO HVWLPXOD D OLEHUDomR GH HQGRU
relaxamento, prazer e melhora do humor semelhante ao que ocorre após a realizaçªo
GH DWLYLGDGH ItVLFD *2/’)$5% (VWHV DVSHFWRV
LQWHUSHVVRDO FRP D HTXLSH GH VD~GH TXDOLÀFDQGR R
WHUDSrXWLFR HVVHQFLDO QR DFRPSDQKDPHQWR GH SHVV
Cabe ressaltar que a interrupçªo na rotina hospitalar para a vivŒncia de um período contemplativo e de quietude, proporcionado pelo banho de sol, Ø um cuidado de saœde que
UHGX] D DQVLHGDGH HVWUHVVH H GHVSHUWD D HVSLULWX
$ (VSLULWXDOLGDGH WHP XP FRQFHLWR PDLV DPSOR G
pessoal do entendimento das questıes existenciais humanas, o sentido da vida, e da morte, as relaçes com o transcendente (sagrado), podendo ser relacionado ou nªo a

SUiWLFDV UHOLJLRVDV /8&&+(77, HW DO

Neste aspecto, a vivŒncia espiritual modula a percepªo acerca dos agravos a saœde FRQIHULQGR VHQWLGR H VLJQLÀFDGR D H[SHULrQFLD GH D RX VHMD D FDSDFLGDGH GH WUDQVFHQGHU jV VLWXDo}H limites físicos e psíquicos impostos pela dor e doença (MIRANDA et al, 2020; YILMAZ, .5 52&+$ HW DO)5$1./

Nas adversidades da vida aquele que encontra sentido para a sua vida, pode HQFRQWUDU VDWLVIDomR DWp QR PRPHQWR TXH DV FLUF DÀUPDYD TXH D YLGD KXPDQD ID] VHQWLGR DWp PHVPR QDV sobre este assunto baseado em experiŒncias próprias após perder familiares e passar pelos horrores dos campos de concentraçªo no período de 1942 a 1945 (FRANKL, 2019; 52&+$ HW DO /(fi2

$SRQWD TXH R VRIULPHQWR VH WRUQD LQVXSRUWiYHO QHOH R VRIULPHQWR VHP VHQWLGR RFDVLRQD R GHVHVSH (QFRQWUDU XP VHQWLGR QD FLUFXQVWkQFLD GLItFLO SRV

Ao vivenciar a dor, a impotŒncia diante de uma questªo inevitÆvel, Ø possível enfrentÆ-OD FRP GLJQLGDGH)5$1./ 7UDQVIRUPD VH R VRIULP realizaçªo pessoal a partir de uma visªo para alØm do sofrimento que busca sentido em WRGRV RV IDWRV H FRPSUHHQGH R SRUTXr H SDUD TXH YL vida, hÆ tambØm no adoecimento, no sofrimento, pois tanto a dor como os limites impostos SHOR DGRHFLPHQWR WDPEpP ID]HP SDUWH GD YLGD

A vida tem doses de alegria e sofrimento, Ø da responsabilidade da equipe de saœde promover cuidados destinado ao bem-estar do paciente e assim auxiliÆ-lo a encontrar o SURSyVLWR HP FDGD PRPHQWR GD VXD H[LVWrQFLD

CONCLUSˆO

Uma melhor compreensªo acerca das estratØgias de humanizaçªo, em especial, R EDQKR GH VRO p HVVHQFLDO SDUD R SODQHMDPHQWR G LQWHUQDGD

Diante dos benefícios associados ao banho de sol Ø relevante a disseminaçªo deste FRQKHFLPHQWR D ÀP GH IRPHQWDU D LPSOHPHQWDomR GH HVWDU GRV SDFLHQWHV LQWHUQDGRV YLVDQGR PDLRU HQ DR WUDWDPHQWR H SRU FRQVHJXLQWH PHQRU WHPSR GH L

AlØm disso, este estudo sugere que pesquisas futuras avaliem o efeito da prÆtica de banho de sol na reduçªo do tempo de internaçªo e dos agravos a saœde bem como a GLVFXVVmR GD WHPiWLFD QR FXUVR GH JUDGXDomR HP VD

REFERÊNCIAS

$6681dfi2)(55(,5$ 0 HW DO)XQGDPHQWRV 1LJKWLQJDOHDQRV FXL
QR 6pFXOR ;;, Revista EnfermagemYUERJ, S

%5$6,/ Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS

&$6752 / & * GH 2 VLVWHPD HQGRFULQROyJLFR YL2011;55(3)D ' $UT %

&8, < HW DO $ UHODomR HQWUH D GXUDomR GD H[SRVLomR DR VRO
WUDQVYHUVDO HP PXOKHUHVPushmeFKLQHVDQV LGHSVJDVH

'25,&&, * & *8$1$(6 /25(1=, & 5HYLVmR LQWHJUDWLYD VREUH FR
1DFLRQDO GH +XPDQL]DomR Coletiva Y S

)(55(,5$ - ' 2 HW DO (VWUDWpJLDV GH Enfermagem no ambiente hospitalar: revisão
LQWHJUDWLYD Rev. SiC Enc. Plur

)5$1./ 9 (26RIULPHQWR KXPDQR)XQGDPHQWRV $QWURSROyJLFR
%RFDUUR H 5HQDWR %LWWHQFRXUW HG 6mR 3DXOR d e 5HDOL]D

)5,6. 8 2/6621 - 1</e1 3 +$+1 5 * %DL[D H[FUHomR GH PHODW
PHFkQLFD QD XQLGDGH GH Hemodiálise UDSLD LQWHQVLYD

*$/9$1 & HW DO $ HIHWLYLGDGH GR WUDWDPHQWR GD GRU QR SyV
Revista Eletrônica Acervo Saúde H KWWSV GRL RUJ UHDV H

*(/'(1+<6 6 HW DO $ UDGLDomR XOWUDYLROHWD VXSULPH D REHV
metabólica, independentemente da vitamina D, em camundongos alimentados com uma dieta rica em
JRUGXUD Diabetes Y Q SiJ

*2/')$5% $ + -$0857$6 $ = 5HVSRVWD GD EHWD HQGRUÀQD DR H[
Sports Med 30,' KWWS G[GRL RUJ

-81,25 (3 6)(51$1'(6 ' & $/0(,'$ $ 7) %25*(6) $ 129$(6 -$
Epidemiologia da GHÀFLrQFLD GH RevLVeDtPEAQD ' 3XE

-Ô1,25 - * HW DO $ FULVLV ZLWKLQ WKH FULVLV 7KH PHQWDO KHD
WKH FRURQDYLUXV Psychiatry Research, EUYHDN S

.(11('< & %$-',. & ' :,//(0=(5 '(*58,-/) 5 %$9,1&. - 1 % $
queimaduras solares dolorosas e exposição ao sol ao longo da vida no risco de ceratoses actínicas,
YHUUXJDV VHERUUpLFDV QHYRV PHODQRFtWLFRV Journal Dermatol 2003, WtSLFRV
30,' KWWS G[GRL RUJ M

.52// 0 + HW DO 5HODomR WHPSRUDO HQWUH R VWDWXV GD YLWD
(VWDGRV 8QLGRV H 30,' KWWS G[GRL RUJ
MRXUQDO SRQH

.8/,(7 *52)) $ 5('0(5 - +2816+(// - 6&+5$*(5 6 9LWDPLQ ' DQ
UHYLHZ J Am Board Fam Med

/(fi2 ' & 0 5 3(5(,5$ (5 *$5&,$ &$52 0 3 6,/9$ 5 0 & 5 $ 6
(PROWLRQDO ([SHULHQFH :LWK D 'LDJQRVLV RI %UHDVW &DQFHU Cance
>FLWHG $JR @ '2, KWWSV GRL RUJ H] SHULRGLFR
1&&

/8&&+(77, * /8&&+(77, $ / * $9(=80 $ - 5HOLJLRVLGDGH (VSLU
&DUGLRYDVFXODU Rev Bras Cardiol 2011; 24(1):55-57

0$5,1+2 - / &$55,fi2 * $ 0$548(6 - 5 $WHQomR KRVSLWDODU L
FRQVWLWXLomR KLVWyULFR VRFLDO Revista Mineira de Enfermagem; 15(3): 308-EUH R FX
Saœde RGSS 6mR 3DXOR Y Q S PDL DJR

0$548(6 & ' / '$17$6 $ 7)5$*262 7 6 '8$57($ / % 3 $ LPSR
GH YLWDPLQD ' QDV GRHQoDV RespCirc Rehabil 2011; 24(1):55-57

0,5$1'$ 5 & 1 $ HW DO 6HQWLGR GD YLGD QR HQYHOKHFLPHQWR
9LWRU)UDQNO Revista Família, Ciclos de Vida e Saœde no Contexto Social Q S

5(,6 1 % 2 FRUSR FRPR H[SUHVVmR VHJXQGR .LHUNHJDDUG ,QW 0HUOHO
'H]HPEUR S

52&+$ 5 & 1 3 3(5(,5$ (5 6,/9$ 5 & 5 $ 7KH VSLULWXDO GL
LQ QXUVLQJ FDUH SKHQRPHQRORJLFDO Revista Mineira de Enfermagem; 15(3): 308-EUH R FX >I
$JR @ '2, KWWS G[GRL RUJ

6$0%522. 3 &223(5 & 2VWHRSRURVLV Q S

6$9$,5$ * / &(1'252*/2 0 6 5$026 / 5 5Ô2 / 0 4 9,(,5$ -
6 6 HW DO 3UHYDOrQFLD GD GHÀFLrQFLD LQVXÀFLrQFLD GH YLWDP
HP LGRVRV LQVWLWXFLRQDOL]DGRV H PRUDGRUHV QD UHJLmR PHWURSROLWDQD GH
Endocrinol Metab

6&+((5) $ - / 9$1 3$$66(1 % 9$1 0217)5$16 *)/,(56 (9$1 62
- : 9$1 +((5,.+8,=(- - HW DO 2V QtYHLV GH FRUWLVRO EDVDO K
FRPSDUDomR FRP R DPEXODWRULDO Cad Saude Publica 2011; 27(2):308-EUH R FX

6+1+$1 7 / .521$8(5 5 (’8))< -) :,//,$06 * + &=(,6/(5 &
PHODWRQLQD REVHUYDGR DR ORQJR GH XP HVWtPXOR GH OX] EULO
PDUFDSDVVR FLUFDGLDQR Rev Saude Publica 2011; 45(2):308-EUH R FX

6+, 7 HW DO 0HWHRURORJLFDO YDULDEOHV DQG WKH ULVN RI IUD
Science of The Total Environment, Y S

6,/9$) ' &+(51,&+$52 , 0)(55(,5$ 0 $ +XPDQL]DomR H GHVXPD
H[SHULrQFLD QR GLVFXUVR GH GRFHQWHV Rev Saude Publica 2011; 45(2):308-EUH R FX

6,/9$ 5 0 & 5 $ $ H[SHULrQFLD GR OyJRV GR PXQGR HVWpWLFR H
FRUSR SHUFHSomR PXQGR I 7HVH, QVXLWRU GH P L) 0 RVÀ
CiŒncias Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 5LR GH -DQHLUR

9$1 '(5 5+((+ - '(95,(6 (O &2(%(5*+ - : $ H[SRVLomR UHJXODU
VD~GH Hipóteses mØdicas Y S

:(67 $ 6 HW DO 2V HIHLWRV GD OX] QDWXUDOtVWLFD QD PHODWRQ
cortisol sØrico em pacientes com AVC durante a admissªo para reabilitaçªo: um ensaio clínico
UDQGRPL]DGR Revista Internacional de CiŒncias MØdicas Y Q SiJ

;8 < 4, - <$1* < :(1 ; 7KH FRQWULEXWLRQ RI OLIHVW\OH IDFW
sectional study in Chinese college students, Psychiatry Research Y S '2,
KWWSV GRL RUJ M SV\FKUHV

<,/0$= & < .$5$) 6 7KH HIIHFW RI VSLULWXDO ZHOO EHLQJ RQ D
SHRSOH ZLWK FK Perspectives in Psychiatric Health >,QWHUQHW@ >FLWHG
'2, KWWSV GRL RUJ H] SHULRGLFRV FDSHV JRY EU

<281* & 5DGLDomR XOWUDYLROHWD VRODU H FkQFHU GH SHOH 0H

CAPÍTULO 12

AGROTÓXICOS INIBIDORES DA ACETILCOLINESTERASE: UMA ABORDAGEM ASSISTENCIAL À SAÚDE

Jaciara Pinheiro de Souza
Universidade do Estado da Bahia, Brasil
ORCID: https://orcid.org/

Murilo de Jesus Porto
Universidade do Estado da Bahia, Brasil
ORCID: https://orcid.org/

Andrá Lacerda Braga Teles
Universidade do Estado da Bahia, Brasil
ORCID:0000-0001-7884-2177

Ana Flávia Souto Figueiredo Nepomuceno
Universidade Federal da Bahia
ORCID: https://orcid.org/

Liz Oliveira dos Santos
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
ORCID: https://orcid.org/

Allan Jhony Almeida dos Santos
Universidade Católica, Brasil
ORCID: https://orcid.org/

Maria de Fátima Santana de Souza Guerra
Centro Universitário UniAges, Brasil
ORCID: https://orcid.org/

RESUMO: Os agrotóxicos das classes inibidores da acetilcolinesterase estão envolvidos em inúmeras intoxicações acidentais e/ou [illegible] a abordagem assistencial desenvolvidas durante o atendimento dos casos de intoxicação desse gênero, bem como aspectos relacionado à sua [illegible] que existem várias publicações literárias com abordagem sobre toxicidade, diagnósticos, tratamentos, sinais e sintomas envolvendo as intoxicações por [illegible] Entretanto, nota-se que essas informações, no geral, encontram-se fragmentadas, em outras palavras, raramente uma única publicação faz um levantamento de dados que sirva de suporte [illegible] Dessarte, a produção deste capítulo tem como escopo reunir informações de artigos, livros e [illegible] público aos conteúdos essenciais e elementares à assistência e a sacede de pacientes vítimas de intoxicações por [illegible]
PALAVRAS-CHAVE: Agrotóxicos; Inibidores da [illegible]

PESTICIDES ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORS: A HEALTHCARE APPROACH TO HEALTH

ABSTRACT: Pesticides from the acetylcholinesterase inhibitor classes are involved in numerous accidental and/or provoked [illegible] professionals to fully understand the care approach developed during the care of cases [illegible] Importantly, there are several literary publications addressing toxicity, diagnoses, treatments, signs and symptoms involving intoxication

E\ DFHW\OFKROLQHVWHUDVH LQKLELWRUV +RZHYHU LW LV
IUDJPHQWHG LQ RWKHU ZRUGV UDUHO\ D VLQJOH SXEOLF
QHFHVVDU\ DQG DSSURSULDWH VXSSRUW WR KHDOWK SURIH
Thus, the production of this chapter aims to gather information from articles, books and the
OLNH UHODWHG WR WKH VXEMHFW DLPLQJ WR IDFLOLWDWH
WR HVVHQWLDO DQG HOHPHQWDU\ FRQWHQWV WR WKH FDU
SRLVRQLQJ E\ DFHW\OFKROLQHVWHUDVH LQKLELWRUV
KEYWORDS: 3HVWLFLGHV $FHW\OFKROLQHVWHUDVH ,QKLELWRU

INTRODU˙ˆO

Agrotóxicos sªo substâncias químicas destinadas, principalmente, a utilizaçªo na
DJULFXOWXUD WHQGR FRPR ÀQDOLGDGH FRPEDWHU DV SU
D SURGXWLYLGDGH GDV SODQWDo}HV $1781(6 $WU
prometidos, o modelo do setor agropecuÆrio cresceu consideravelmente nos œltimos anos,
fato que tornou o Brasil o maior consumidor mundial de DJURWy[LFRV %5$6,/

Atrelado a isso, segundo dados do Sistema de Informaçes Tóxico Farmacológicas
† 6,1$1 HQWUH RV DQRV D IRUDP QRWLÀFDGRV
causados por agrotóxicos, dos quais 52,34% nªo estariam vinculados à exposiçªo
RFXSDFLRQDO (PERUD WDLV GDGRV VLVWHPiWLFRV QmR F
SUREOHPD PHQFLRQDGR TXH p GHFRUUHQWH GDV VXEQR
unidades e outros empecilhos, nota-se uma alta incidŒncia de casos se comparados a
RXWURV SDtVHV 0$,$ HW DO 06 6,/9$ HW DO

Cabe ressaltar que a intoxicaçªo aguda por agrotóxicos inibidores da
acetilcolinesterase tem sido um problema frequente nos serviços emergenciais de saœde
HP JUDQGHV KRVSLWDLV VHMD SRU WHQWDWLYD GH VXLF
FULDQoDV (VVH FRQWH[WR GHPDQGD XPD DGHTXDGD SUH
PRGR D WRUQD ODV FDSD]HV GH LGHQWLÀFDU R WLSR HVS
DGRWDGR SDUD WUDWDPHQWR GD LQWR[LFDomR '$ 6,/9$

(P YLVWD GLVVR R LQWXLWR GHVWH FDStWXOR p MXV
aspectos relacionados a intoxicaçªo por essa classe de agrotóxicos, abordando aspectos
GHVGH D ÀVLRORJLD GR VLVWHPD FROLQpUJLFR ÀVLRSDWR
manifestaçes clínicas das intoxicaçes aguda e crônica, condutas para diagnóstico e
WUDWDPHQWR DWp H[DPHV ODERUDWRULDLV FRPSOHPHQ
H RWLPL]DU R DFHVVR GRV SURÀVLRQDLV GH VD~GH DRV
que possibilitem uma melhor assistŒncia àsaœde de pacientes vítimas de intoxicaçes por
agrotóxicos LQLELGRUHV GD DFHWLOFROLQHVWHUDVH

FISIOLOGIA DAS ENZIMAS COLINESTERASES

A acetilcolinesterase (AChE) Ø uma enzima respons Æ vel pelo processo de degradaçªo do neurotransmissor acetilcolina (Ach), presente nas sinapses nervosas, permitindo que o neurônio retome àsua condiçªo de repouso após ser ativado (COLOVIC et al. %(51(/(9< $5$8-2 6$1726 *216$/9(6

A acetilcolina Ø um neurotransmissor respons Æ vel por ativar as sinapses colinØrgicas que estªo amplamente distribuídas no sistema nervoso central (SNC) e perifØrico (SNP), sendo importante para o funcionamento de diversas funçes do nosso corpo (HALL; GUYTON, 2017; NERILO et al., (VVH QHXURWUDQVPLVVRU p V GD DVVRFLDomR HQWUH D DFHWLOFRH]LPD H D FROLQD I citoplasm Æ ticas atØ que ocorra a sua liberaçªo na fenda sin Æ ptica e posterior ligaçªo com os UHFHSWRUHV GR QHXU{QLR VHJXLQWH SDUD IRUQHFHU D U +$// *8<721

A liberaçªo da acetilcolina nas fendas sin Æ pticas permitir Æ sua ligaçªo aos receptores SUp H SyV VLQiSWLFRV FODVVLÀFDGRV FRPR QLFRWtQLFRV HW DO)216(&$ &DEH UHDOoDU TXH D $&K DSUHVH GH `H[LELOLGDGH XPD YH] TXH SRGH GLYHUVLÀFDU VXD HV R VtWLR GH LQWHUDomR GR UHFHSWRU ;,$:$1*

Os receptores colinØrgicos nicotínicos, a exemplo dos ionotrópicos, tŒm como DJRQLVWD D QLFRWLQD H VmR FRQVWLWXtGRV SRU FLQFR V UHFHSWRUHV HVWmR SUHVHQWHV HP JkQJOLRV DXWRQ{PLF et al 0,//$5 *277,

JÆ os receptores muscarínicos, como os metabotrópicos, sªo acoplados a proteínas G, tŒm como agonista a muscarina e encontram-se no mœsculo liso, coraçªo e glândulas H[yFULQDV $OpP GLVVR SRVVXHP FLQFR WLSRV GH VXE (SANABRIA-CASTRO; ALVARADO-ECHEVERR´A; MONGE- BONILLA, 2017; BERNE; LEVY, 2018; ALTENHOFEN et al

A homeostase das vias colinØrgicas Ø realizada atravØs da atuaçªo da enzima acetilcolinesterase (AChE), respons Æ vel por hidrolisar o neurotransmissor acetilcolina (ACh) em Æcido acØtico e colina na fenda sin Æ ptica colinØrgica, cessando, dessa forma, o HVWtPXOR 'HQRPLQDGD GH FROLQHVWHUDVH YHUGDGHLUD p SURGX]LGD QDV KHPiFLDV WHFLGRV QHUYRVRV H P~VFX sua vez, Ø feito pelos glóbulos vermelhos, possui uma meia-vida de cerca de trŒs meses e desempenha maior papel na clivagem da acetilcolina nas fendas sin Æ pticas (C´MARA et al

A AChE, quando bloqueada, Ø incapaz de catalisar a ACh, deixando-a disponível por um maior período na fenda sin Æ ptica, circunstância essa que potencializa a transmissªo FROLQpUJLFD 7$</25 $ DWLYLGDGH GD $&K(SRGHU

QRYHQWD GLDV DSyV R ~OWLPR FRQWDWR FRP XP LQLELG
menor taxa de renovaçªo sanguínea, sendo considerada um biomarcador para exposiçes
WDUGLDV 5,%(,52 0(//$

Vale pôr em evidŒncia que existe outra enzima colinesterase, trata-se da
SVHXGRFROLQHVWHUDVH WDPEpP FKDPDGD GH EXWLULC
Ø responsÆvel por hidrolisar diversos Østeres de colina, desde a acetilcolina atØ a
KHSWDQRLOFROLQD WRGDYLD FRP PDLRU HÀFLrQFLD QD H
C´MARA et al. $ %X&K(HVWi SUHVHQWH HP YiULRV VtWL
pâncreas, intestino delgado e em menor concentraçªo no SNC e SNP, circulando no plasma
GR VDQJXH $R FRQWUiULR GD $&K(SRVVXL XPD WD[D GH
essa razªo, a atividade da BuChE Ø utilizada como marcador biológico de exposiçªo aguda
por agrotóxicos com açªo sobre a enzima (C´MARA et al.

Essas duas enzimas modulam importantes funçes do sistema colinØrgico na
neurotransmissªo de impulsos nervosos com açªo central e perifØrica (MESULAM et
DO (QWUHWDQWR XP GRV agrotóxicos respectivamente GH DO
classes dos carbamatos e organofosforados, Ø inibir a açªo dessas enzimas, o que resulta
na elevaçªo dos níveis de acetilcolina e butirilcolina no organismo e, consequentemente,
desencadeia disfunçes nervosas (HALL; GUYTON, 2017; NERILO et al.,

Os organofosforados e os carbamatos sªo utilizados na agricultura e pecuÆria,
FRP D ÀQDOLGDGH GH FRQWURODU H FRPEDWHU DV SUDJD
e nematicidas), e se estendem para o uso domiciliar como inseticida (AMARAL, 1998;
*22'0$1 (VVD IDFLOLGDGH H GLYHUVLGDGH GH DSOL
agentes frequentemente envolvidos em intoxicaçes colinØrgicas (FILHO; CAMPOLINA;
',$6 '$ 6,/9$

FISIOPATOLOGIA DA INTOXICA˙ˆO POR AGROTÓXICOS INIBIDORES DA COLINESTERASE

Os agrotóxicos inibidores da acetilcolinesterase (IAChE) sªo substâncias que inibem
a açªo da enzima colinesterase no sistema nervoso central (SNC) e perifØrico (SNP), sendo
esta a causa da alta toxicidade destes compostos (GEORGIADIS et al , 1 É& , 2
52%(576 5(,*$57 ',1'$5 HW DO

Essa inativaçªo converge na elevaçªo dos níveis de acetilcolina das fendas
VLQiSWLFDV ÀJXUD H FRQVHTXHQWHPHQWH KLSHUHVW
H PXVFDUtQLFRV FDUDFWHUtVWLFRV GD VtQGURPH FROLQ
diante de um quadro de intoxicaçªo colinØrgica, os sinais e sintomas sªo sugestivos de
excitaçªo dos receptores nicotínicos, muscarínicos e do sistema nervoso central (SILVA,